## บทคัดย่อ

รหัสโครงการ: TRI/UTLGM-52007

ชื่อโครงการ: การศึกษาผลกระทบจากการท่องเที่ยวและแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในเขต

ห้ามล่าสัตว์ปาทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง

ชื่อนักวิจัย : ดร. ทัศนาวลัย อุฑารสกุล, นางสาวจิราภรณ์ นวลทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

E- mail Address: pubasten@gmail.com, njeejie1980@hotmai.com

ระยะเวลาโครงการ : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2552 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2553

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลกระทบจากการท่องเที่ยวและการใช้ ประโยชน์พื้นที่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย 2) ศึกษาองค์ประกอบและปริมาณของขยะมูลฝอย ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย และ 3 )วางแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตห้ามล่าสัตว์ ป่าทะเลน้อย โดยเก็บข้อมูลจากการสำรวจในภาคสนามและการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ระหว่างเดือนธันวาคม 2552 – พฤษภาคม 2553 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า

ในและนอกเทศกาลท่องเที่ยวค่าออกซิเจนละลายน้ำ เฉลี่ย 4.39 และ 7.11 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ และค่าไขมัน น้ำมันและไขข้น เฉลี่ย 67.71 และ 245.91 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ ระดับเสียงพื้นฐานในและนอกเทศกาลท่องเที่ยว เฉลี่ย 58.20 และ 58.86 เดซิเบลเอ ตามลำดับ พบประชากรนก จำนวน 2,047 ตัว มี 24 ชนิดพันธุ์ ทั้งนี้ มีสถานภาพเป็นนกประจำถิ่นจำนวน 16 ชนิดพันธุ์ และนกที่มีสถานภาพเป็นนกอพยพจำนวน 8 ชนิดพันธุ์ พบประชากรนกประจำถิ่น ในเทศกาลท่องเที่ยว จำนวน 1,103 ตัว และนอกเทศกาลท่องเที่ยว จำนวน 886 ตัว และพบ ประชากรนกอพยพในเทศกาลท่องเที่ยว จำนวน 40 ตัว และนอกเทศกาลท่องเที่ยว จำนวน 18 ตัว พบว่า ระดับเสียงจากเรือนำเที่ยวไม่มีความสัมพันธ์กับจำนวนประชากรนกประจำถิ่นในเทศกาล ท่องเที่ยว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (Sig = 0.417) และระดับเสียงจากเรือนำเที่ยวไม่มี ความสัมพันธ์กับจำนวนประชากรนกประจำถิ่นนอกเทศกาลท่องเที่ยว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (Sig = 0.504) นกที่มีระยะหลบหนี น้อยที่สุดมีระยะทาง 5 เมตร ทั้งนี้มีเปิดคับแค (Nettapus Coromandelianus) ที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคามและนกกระสาแดง (Ardea purpurea) อยู่ใน สถานภาพใกล้สูญพันธ์

ๆ

ๆ

ผลจากการสนทนากลุ่มประกอบด้วย 3 ประเด็นได้แก่ ผลกระทบจาการท่องเที่ยวต่อ ทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อสิ่งแวดล้อม และผลกระทบจากการท่องเที่ยว ต่อวิถีชีวิตชุมชน

ผลการศึกษาขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดทั้ง 3 พื้นที่ศึกษา ได้แก่ ศาลานางเรียม สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลน้อย และที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย มีปริมาณ 87.30, 202.58 และ 544.10 กิโลกรัม ตามลำดับ ประเภทของขยะมูลฝอยที่พบมาก ที่สุดคือ พลาสติก และกล่องโฟม และปริมาณขยะมูลฝอยไม่มีความสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติ (Sig = 0.336)

แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยได้จัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยไว้สำหรับขยะมูลฝอย แต่ละประเภทที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งมีป้ายประชาสัมพันธ์แยกทิ้งขยะให้ถูกประเภท

คำหลัก: ผลกระทบจากการท่องเที่ยว/การจัดการขยะมูลฝอย/เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย

## **Abstract**

Research Code: TRI/UTLGM-52007

Research Title: Impact of Tourism and waste management in Talae Noi Non - Hunting

Area, Phattalung Province

Researcher's Name: Dr. Tatsanawalai Utarasakul, Miss Jiraporn Nualthong

Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok, Thailand

E- mail Address : <a href="mailto:pubasten@qmail.com">pubasten@qmail.com</a>, <a href="mailto:njeeije1980@hotmai.com">njeeije1980@hotmai.com</a>

Project Period: August 1,2009 – July 31,2010

The objectives of this research are 1) To investigate impact of tourism and land use 2) To investigate composition and quantity of solid waste and 3) To establish guideline of waste management in Talae Noi Non-hunting Area The field study and lab analysis were conducted monthly from December 2009 - May 2010.

The results revealed that, during low and high tourist season average oxygen dissolve (DO) were 4.39 and 7.11 mg/L respectively. Averages of Fat Oil and Grease were 67.71 and 245.91mg/L respectively. During low and high tourist season average sound level (LAeq) were 58.20 and 58.86 Decibel A, respectively. The results found that there are 2,039 birds, 24 species have been recorded. Among this, 16 species were resident whereas 8 species were migratory birds. In high and low tourist season, there are found 1,103 and 886 resident birds respectively. The results found that birds in high and low tourist season there are 40 and 18 migratory birds respectively. The correlation between average sound level from tourist boat and the number of resident birds in high tourist season was not correlated statistical significantly (sig = 0.417). In low tourist season, the correlation between average sound level from tourist boat and the number of resident birds was not correlated statistical significantly (sig = 0.504). Minimum escape distance was 5 meters for 7 species, among these Cotton Pygmy-goose (*Nettapus Coromandelianus*) is near threatened species, and Purple Heron (*Ardea purpurea*) is endangered species

ฌ

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ល្ង

The impact of tourism on Talae Noi community in which affected on natural resources, environment, and local community's way of life was conducted by focus group. The quantities of solid waste in Sala Nang Riam; The Station of Research and Development for Promotion of Talae Noi Wildlife Conservation; and the office of Talae Noi Non-hunting Area were found that 87.30, 202.58 and 544.10 kg., respectively. Plastics and Foam were found in the highest number. The correlation between the quantity of waste and the amount of tourists was not correlated statistical significantly (Sig = 0.336).

Specific waste containers and promote public awareness of waste separation should be established for waste management in Talae Noi Non-hunting Area.

Key word :: Impact of Tourism / Waste Management / Talae Noi Non – Hunting Area