

บทคัดย่อ

รหัสโครงการ: BGJ44-8-0032
ชื่อโครงการ: ความรุนแรงทางเพศคืออะไร: มุมมองจากวัยรุ่นไทย
ชื่อนักวิจัย : รำไพ ศรีนวล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
กฤษฎา อาชาวนิจกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
Email Address: prkac@mucc.mahidol.ac.th
ระยะเวลาโครงการ: ตุลาคม 2544 ถึง มิถุนายน 2546

งานวิจัยนี้ มุ่งศึกษาการให้ความหมายของความรุนแรงทางเพศ ในทัศนะของกลุ่มวัยรุ่นไทยทั้งเพศชายและเพศหญิงที่กำลังศึกษาอยู่ในระบบโรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา จากกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดหนึ่งของภาคกลาง โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์ระดับลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก จำนวน 27 คน และการสนทนากลุ่มวัยรุ่นแยกตามเพศและระดับการศึกษา รวม 6 กลุ่ม ผลการศึกษาให้ข้อสรุปว่าวัยรุ่นไทยให้ความหมายของ “ความรุนแรงทางเพศ” ครอบคลุมเพียงความรุนแรงทางร่างกาย (physical violence) และมีมายาคติว่า ถ้าผู้หญิงไม่ยินยอมหรือไม่ต้องการในเรื่องเพศ ต้องมีการตะโกน หรือต่อสู้ดิ้นรนฯ ซึ่งในความเป็นจริง นั้น ผู้หญิงอาจไม่มีโอกาสได้ต่อสู้ เพราะถูกวางยาหรือถูกมอมเหล้า ขณะที่ วัยรุ่นชายมักใช้กรรมแทนการใช้กำลังถ้าจะมีเพศสัมพันธ์ นอกจากนี้ ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการให้ความหมายเช่นนี้ ได้แก่ การยอมรับวาทกรรมเพศสภาพ (gender discourse) ซึ่งปรากฏชัดเจนระหว่างสัมพันธ์ภาพของสามีและภรรยา การเชื่อวาทกรรมการแพทย์ว่าผู้ชายที่กระทำมีความเจ็บป่วยทางจิตใจ การไม่ได้ตอบของผู้หญิงอันเป็นการตอกย้ำการผลิตซ้ำ (reproduce) อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน และการยอมรับในมายาคติหรือมีความเชื่อที่ผิด (myths) ได้แก่ ผู้หญิงเป็นเหตุให้กระทำ เช่น แต่งตัวยั่วยวน แสดงกิริยาให้ทำ และการที่เข้าไปอยู่ในห้องด้วยกันตามลำพัง หมายถึง ความต้องการมีเพศสัมพันธ์ เป็นต้น งานวิจัยต่อไป ควรศึกษากระบวนการของการให้ความหมายตามเหตุปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมดังกล่าว ว่ามีขั้นตอน การเรียนรู้ และแตกต่างอย่างไร หรือไม่ ระหว่างชายและหญิง

คำหลัก: ความรุนแรงทางเพศ การให้ความหมาย วัยรุ่นในโรงเรียน

Abstract

Project code : BGJ44-8-0025
Project Title : Biodiversity of Riparian Insects and Their Conservation in Montane,
Chiang Mai, Thailand
Investigator : Thapanya D, Chantaramongkol P,
Biology Department, Chiang Mai University
E-mail Address : tapunya@yahoo.com, scboi021@chiangmai.ac.th
Project Period : 2 years (28 September 2001 – 28 September 2003)

The monitoring was applied in 3 riparian sites at the elevations of 600, 1,000 and 1,200 m a.m.s.l. on Doi Suthep-Pui and Doi Inthanon National Park, Thailand. The insect specimens were captured using Dry UV-light trapping, pitfall trap, Malaise trap, beating method and sweeping nets. They were identified, enumerated and preserved in 70% alcohol. Only Trichoptera and Geometridae moths (Family Lepidoptera) were identified in species level. There were totally 72 species of Trichoptera and 24 species of Geometridae on Doi Suthep-Pui and Doi Inthanon. Both regions provide the unique species of Trichoptera and Geometridae which was hypothesized that Doi Suthep-Pui and Doi Inthanon as Himalayan-outlier and Himalayan-inlier, respectively. There were the first record of family Ecnomidae (Trichoptera) on Doi Inthanon and 15 species of the Geometridae in Northern Thailand. There were unknown specimens of Trichoptera and Geometridae for 13 and 21 samples, respectively. These specimens were expected as the new species.

Keywords: Trichoptera, Geometridae, Riparian forest, Himalayan-outlier, Himalayan-inlier