



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

โครงการ การประยุกต์ใช้ปฏิกิริยาของ vicinal dianions ของ succinic ester derivatives ในการเตรียมสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจำพวก γ -butyrolactones และ lignans และการ ค้นหา lignans ที่มี cytotoxic activity จากพืชสมุนไพรในสกุล *Phyllanthus*

โดย ศาสตราจารย์ ดร.มนัส พรหมโคตร และคณะ

15 มิถุนายน 2547

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

โครงการ การประยุกต์ใช้ปฏิกิริยาของ vicinal dianions ของ succinic ester derivatives ในการเตรียมสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจำพวก γ -butyrolactones และ lignans และการค้นหา lignans ที่มี cytotoxic activity จากพืชสมุนไพรในสกุล *Phyllanthus*

คณะผู้วิจัย

- ศาสตราจารย์ ดร.มนัส พรหมโคตร
- รองศาสตราจารย์ ดร.ปทุมรัตน์ ตูจินดา

สังกัด

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(ความเห็นในรายงานนี้เป็นของผู้วิจัย สกว. ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป)

กิตติกรรมประกาศ

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ที่กรุณาอนุเคราะห์ให้ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา สนับสนุนการวิจัยตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2544-15 มิถุนายน 2547

ขอขอบคุณบุคคลที่ให้ความอนุเคราะห์ในด้านต่าง ๆ ดังมีรายนามต่อไปนี้

ศ.ดร. วิชัย รวีตระกูล	ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.ดร. ธวัชชัย สันติสุข	หอพรรณไม้ กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รศ.ดร. สมัยศึก โสภาสรรค์	ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ. ดร. พลังพล คงเสรี	ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นายณรงค์ นันทะแสน	หอพรรณไม้ กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางสาววัชรีย์ หาญยิ่ง	นักศึกษาปริญญาโท สาขาเคมีอินทรีย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวดารณี สุริรัมย์	นักศึกษาปริญญาโท สาขาเคมีอินทรีย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาว ลัดดาวัลย์ สำเภาเงิน	นักศึกษาปริญญาโท สาขาเคมีอินทรีย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาว อริสสรา อีสสระรี่	นักศึกษาปริญญาโท สาขาเคมีอินทรีย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นายอนรรฆ คำขาว	นักศึกษาปริญญาโทสาขาเคมีอินทรีย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ช่วยวิจัย
นางสาวจิตรา กรสกุลกาญจน์	นักศึกษาปริญญาโทสาขาเคมีอินทรีย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวเสาวรีย์ ทูทุมมา	นักศึกษาปริญญาโทสาขาเคมีอินทรีย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ช่วยวิจัย
นางสาววันเพ็ญ ธิญญเจริญ	ผู้ช่วยวิจัย

ขอขอบคุณนักวิทยาศาสตร์ที่ให้การอนุเคราะห์ในการเก็บและบันทึกข้อมูลทาง IR UV NMR MS และ elemental analysis

นางพัชรินทร์ ภูชัยพัฒนานนท์	นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวอัมพร ศรีสุทธิพฤทธิ	นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสุทธิพร พิกุลทอง	นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวกิ่งแก้ว เสรีกุล	นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวอรนัตร์ วัฒนพงษ์	นักวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนานักศึกษาด้านเคมีและการวิจัยทาง เคมี

ขอขอบคุณ คุณ พัชรี ดั่งเงิน ที่ให้การอนุเคราะห์ในการดูแลด้านการเงินและบัญชี

ขอขอบคุณโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยทางเคมีสำหรับทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ร่วมโครงการ ตลอดจนให้การสนับสนุนในด้านวัสดุ และอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ

สุดท้ายนี้คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับการให้ใช้สถานที่และอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ในการวิจัย

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	i
สารบัญ	iii
บทคัดย่อ/Abstract	1
Executive Summary	7
เนื้อหาทางานวิจัย	
งานวิจัยด้านการสังเคราะห์	12
1. การเตรียมสารเริ่มต้น dimethyl α -(methyldiphenylsilyl)succinate (1) และ diethyl α -(dimethoxyphosphono)succinate (2)	12
2. การศึกษาวิธีการเตรียม และ ปฏิกิริยาของ vicinal dianion 3	13
3. การศึกษาปฏิกิริยาของ vicinal dianion 4	16
4. การศึกษาการเตรียม vicinal dianion 18 จาก triethyl ethanetricarboxylate และการศึกษาปฏิกิริยากับ carbonyl compounds	17
4.1 ปฏิกิริยาของ dianion 18 กับ aldehydes	17
4.2 การศึกษาการ isomerization ของ γ -lactone 21	20
4.3 ปฏิกิริยาของ dianion 18 กับ ketones	22
5. การศึกษาวิธีการเตรียม ($\pm$)-Methylenolactocin (25) และ ($\pm$)-Protolichesterinic acid (26)	23
6. การเตรียม paraconic acid 34a	25
7. การศึกษาวิธีการเตรียม Methylenolactocin (25)	26
8. การเตรียมสาร ($\pm$)-Lichesterinic acid (27), ($\pm$)-Phaseolinic acid (28), ($\pm$)-Nephromop-sinic acid (29), ($\pm$)-Rocellaric acid (30), และ ($\pm$)-Dihydroprotolichesterinic acid (31)	27
8.1 การเตรียม ($\pm$)-Lichesterinic acid (27)	27
8.2 การเตรียมสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 28, 29, 30 และ 31	29
9. การศึกษาวิธีการเตรียมและปฏิกิริยาของ vicinal dianion 42	32
9.1 การเตรียม α -aroylsuccinic ester 41	33
10. การเตรียม vicinal dianions 42a-c และ การศึกษาปฏิกิริยากับ carbonyl compounds	33
11. การเตรียม α -arylidene- γ -butyrolactones 45 จาก α -aroyl- γ -butyrolactone 43	35
12. การเตรียมสารประกอบ dihydrofuran 49	37
13. การเตรียม tetrasubstituted furan 50	39
14. การเตรียมสารประกอบ 2,5-diaryl-3,7-dioxabicyclo[3.3.0]octanes 54	39
15. การเตรียม thuriferic acid ethyl ester and analogues (56) และ การเตรียม picropodophyllone (57)	40
16. การเตรียมสารประกอบ furofurans 68 จากสารประกอบ TC- α -aroyl- γ -lactones 43	42
17. การศึกษาปฏิกิริยาของ vicinal dianions ของ chiral succinic acid derivatives	46
17.1 การเตรียมสารประกอบ (+)- β -arylmethyl- γ -butyrolactones 75	48

	หน้า
งานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	50
1. การสำรวจและเก็บพืชสกุล <i>Phyllanthus</i>	50
2. การสกัดด้วยการแช่ในเมทานอลเพื่อ screen หา cytotoxic activity ในขั้นต้น	51
3. การทดสอบ cytotoxic activity ของส่วนสกัดต่าง ๆ ที่ได้จากการแช่ในเมทานอลอย่างเดี่ยว	52
4. การ partition เพื่อให้ได้ส่วนสกัดที่มีขั้วแตกต่างกัน และการทดสอบ cytotoxic activity	54
5. การสกัดตามลำดับความมีขั้วของตัวทำละลาย (sequential extraction)	58
6. การแยกสารองค์ประกอบ และการศึกษาหาโครงสร้างของสารองค์ประกอบของพืชในสกุล <i>Phyllanthus</i>	63
7. การแยกสารองค์ประกอบจากส่วนสกัดของ <i>Phyllanthus taxodiifolius</i>	64
7.1 การแยกสารจากส่วนเหนือดิน (aerial part, PX) ของตัวอย่างที่ 1 ของ <i>Phyllanthus taxodiifolius</i>	64
- การแยกสารองค์ประกอบจากส่วนสกัด hexane ของ <i>Phyllanthus taxodiifolius</i> (ตัวอย่างที่ 1)	64
- การแยกสารองค์ประกอบจากส่วนสกัด ethyl acetate ของ <i>Phyllanthus taxodiifolius</i> (ตัวอย่างที่ 1)	66
- การแยกสารองค์ประกอบจากส่วนสกัด <i>n</i> -butanol ของ <i>Phyllanthus taxodiifolius</i> (ตัวอย่างที่ 1)	68
7.2 การแยกสารจากส่วนเหนือดิน (aerial part, PX) ของตัวอย่างที่ 2 ของ <i>Phyllanthus taxodiifolius</i>	69
- การแยกสารองค์ประกอบจากส่วนสกัด hexane ของ <i>Phyllanthus taxodiifolius</i> (ตัวอย่างที่ 2)	69
- การแยกสารองค์ประกอบจากส่วนสกัด EtOAc ของ <i>Phyllanthus taxodiifolius</i> (ตัวอย่างที่ 2)	71
- การแยกสารองค์ประกอบจากส่วนสกัด <i>n</i> -butanol ของ <i>Phyllanthus taxodiifolius</i> (ตัวอย่างที่ 2)	72
8. การพิสูจน์โครงสร้างของสารองค์ประกอบที่บริสุทธิ์จาก <i>Phyllanthus taxodiifolius</i>	73
8.1 Physical data ของสารที่บริสุทธิ์จาก <i>Phyllanthus taxodiifolius</i>	73
- Compound 1 (Glochidone)	73
- Compound 2 (Glochidonol)	74
- Compound 3 (Cleistanthin A methyl ether)	76
- Compound 4 (Cleistanthin A)	77
- Compound 5 (Cleistanthoside A)	79
- Compound 5a (Cleistanthoside A tetraacetate)	80
- Compound 9 (Taxodiifoloside, New compound)	81
- Compound 7 (<i>N</i> -Benzoylphenylalaninyl- <i>N</i> -benzoylphenylalaninate)	84
- Compound 8 (<i>N</i> -Benzoylphenylalaninoylphenylalaninol acetate)	85
- Compound 10 (4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid)	86

	หน้า
9. การทดสอบฤทธิ์ cytotoxic activity ของสารบริสุทธิ์ที่แยกได้จาก <i>Phyllanthus taxodiifolius</i>	86
10. การแยกสารองค์ประกอบจาก <i>Phyllanthus acutissima</i> และการทดสอบ cytotoxic activity ของส่วนแยกย่อยต่างๆ	86
11. การพิสูจน์โครงสร้างของสาร 11-15	88
11.1 Physical properties และ spectroscopic data ของสาร 11-15	88
- Compound 11 (Canthin-6-one)	88
- Compound 12 (9-Methoxycanthin-6-one)	89
- Compound 13 (1-Hydroxycanthin-6-one)	89
- Compound 14 (9,10-Dimethoxycanthin-6-one)	90
- Compound 15 (Scopoletin)	91
สรุปผลงานวิจัยในรอบ 3 ปี	92
- ด้านการสังเคราะห์	92
- ด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	93
เอกสารอ้างอิง	97
- ด้านการสังเคราะห์	97
- ด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	98
Output ที่ได้จากโครงการ	100
- ผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์แล้ว	100
- ผลงานวิจัยที่กำลังจะตีพิมพ์	100
- Abstract ในการประชุมวิชาการนอกประเทศ	100
- Abstract ในการประชุมวิชาการในประเทศของนักศึกษา	100
- แบบปากเปล่า	100
- แบบโปสเตอร์	101
ภาคผนวก	


บทคัดย่อ/ABSTRACT

การสร้างพันธะ carbon-carbon โดยใช้ปฏิกิริยาของ vicinal dianion มีความสำคัญและเป็นที่น่าสนใจมาก เนื่องจากปฏิกิริยากับ electrophiles จะเป็นแบบ regioselective และ stereoselective

Vicinal dianion ของอนุพันธ์ของ succinic acid ก็เป็น vicinal dianion ที่มีผู้ศึกษาปฏิกิริยากันมาก และใช้ประโยชน์ในการเตรียมสารประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญ คณะวิจัยของเราที่สนใจที่จะพัฒนาวิธีการสังเคราะห์โดยใช้อนุพันธ์ของ succinic acid เป็น "4-carbon building block" ในการสังเคราะห์สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มี γ -butyrolactone เป็น nucleus ตลอดจนสารจำพวก lignans จึงทำให้ศึกษาปฏิกิริยาของ vicinal dianion 1, 2 และ 3 ซึ่งสามารถเตรียมขึ้นมาได้ง่ายโดยให้ triethyl ethanetricarboxylate, diethyl α -aroylsuccinates และ (4*S*, 5*R*)-3,4-(dimethyl-2-oxo-5-phenylimidazolidin-1-yl)butane-1,4-dione ทำปฏิกิริยากับ lithium diisopropylamide (2 equiv) ใน THF ที่ -78°C เป็นเวลา 1 ชม.


Vicinal dianions ของ 1 และ 2 ทำปฏิกิริยากับ carbonyl compounds แบบ regioselective ที่ β -carbon จะได้ γ -butyrolactones 4 และ 5 ตามลำดับ ภายใต้ conditions ที่เหมาะสม vicinal dianion 2 จะทำปฏิกิริยากับ aromatic aldehydes จะได้ dihydrofurans 7 สารประเภท 4 สามารถใช้เป็นสารเริ่มต้นในการเตรียม ($\pm$)-lichesteric acid, ($\pm$)-phaseolinic acid, ($\pm$)-nephromopsinic acid และ ($\pm$)-dihydroprotolichesterinic acid ส่วนสารประเภท 5 สามารถใช้เป็นสารเริ่มต้นในการเตรียมสารประกอบ α -arylidene- γ -butyrolactones 6, 2,6-diaryl-3,7-dioxabicyclo[3.3.0]octane-4,8-diones 7, thuriferic ethyl ester และ อนุพันธ์ 8 และ picropodophyllone 9 สาร bislactone ประเภท 7 สามารถใช้เป็นสารเริ่มต้นสำหรับการเตรียม gmelinol (10) ซึ่งมี anti-malarial activity

ส่วน vicinal dianion 3 ก็ทำปฏิกิริยากับ arylmethyl bromides แบบ high diastereoselective ได้ product ที่สามารถใช้เตรียม (*R*)- β -arylmethyl- γ -butyrolactones 11 ได้ ซึ่งสารชนิดนี้ใช้เป็นสารเริ่มต้นที่สำคัญในการเตรียม lignan natural products ต่าง ๆ




กลุ่มวิจัยของเราได้ทำการค้นหาสารประเภท cytotoxic lignans และ ประเภทอื่น ๆ จากพืชด้วย ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะได้สารต้นแบบที่จะนำมาพัฒนาเป็นยารักษามะเร็ง ได้ทำการเก็บตัวอย่างพืชในสกุล *Phyllanthus* จากส่วนต่าง ๆ ของประเทศไทยมาได้ทั้งหมด 18 สปีชีส์ แต่ได้ตัดสินใจทำการศึกษาแบบลึกในพืชเพียง 2 สปีชีส์เท่านั้น ทั้งนี้เพราะว่า ส่วนสกัดเมทานอลของพืชทั้งสอง และส่วนสกัดจากการ partition นั้นแสดง cytotoxic activity ในเกณฑ์ดีมาก


ได้ทำการแยกสารองค์ประกอบของ *Phyllanthus taxodiifolius* และวิเคราะห์หาโครงสร้างของสารที่แยกได้ ปรากฏว่าได้สาร triterpenes 1 และ 2, lignans glycosides 3-5 และ 9, และ amides 7 และ 8 และพบว่า 9 เป็น lignan glycoside ใหม่ ซึ่งยังไม่มีผู้รายงานมาก่อน ได้ทดสอบ cytotoxic activity ของสาร 1-6 แล้ว แต่ของสาร 7-9 ยังไม่ได้ผลการทดสอบ สาร 3 and 4 แสดง cytotoxic activity ใน cancer cell lines ของมนุษย์ และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม




1




2




3




4




5




9 (New)



7




8




10


จากการศึกษาทางเคมีของ *Phyllanthus acutissima* ทำให้สามารถแยกสารได้ทั้งหมด 7 ตัว ได้วิเคราะห์หาโครงสร้างของ known canthin-6 one alkaloids **11-14** และ coumarin **15** ได้แล้ว แต่โครงสร้างของ triterpenes **16 and 17** ซึ่งคาดว่าจะป็นสารใหม่ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ สำหรับการทดสอบ cytotoxicity ของสารที่แยกได้จาก *Phyllanthus acutissima* ยังอยู่ระหว่างการรอผล




11




12



13




14









15


Carbon-carbon bond formations based on the reactions of dianions are of interest, because high regio- and stereoselectivities towards electrophiles have been achieved. Among these dianions, the vicinal dianions of succinic acid derivatives have been extensively demonstrated to be useful reagents for the preparation of various classes of compounds. In the course of our study on using succinic acid derivatives as versatile 4-carbon building blocks for synthesis of some natural products containing the γ -butyrolactone nucleus, including lignans; we investigated the reactions of the vicinal dianions **1**, **2** and **3**, which could be obtained by treatment of triethyl ethanetricarboxylate, diethyl α -aroylsuccinates and (4*S*,5*R*)-3,4-(dimethyl-2-oxo-5-phenyl-imidazolidin-1-yl)butane-1,4-dione with 2 equivalents of lithium diisopropylamide in tetrahydrofuran at -78°C for 1h. The vicinal dianions **1** and **2** reacted with carbonyl compounds regioselectively at β -carbon to furnish the corresponding β -hydroxy adducts which underwent lactonisation to provide γ -butyrolactones **4** and **5**, respectively, upon acidic work-up. These γ -butyrolactones were found to be versatile inter-mediate for preparation of various types of compounds. Thus, γ -butyrolactones of type **4** were converted into ($\pm$)-lichesterinic acid, ($\pm$)-phaseolinic acid, ($\pm$)-nephromopsinic acid and ($\pm$)-dihydrotolichesterinic acid. Furthermore, α -aroyl- γ -butyrolactones **5** were used as starting materials for syntheses of α -arylidene- γ -butyrolactones **6**, 2,6-diaryl-3,7-dioxabicyclo[3.3.0]octane-4,8-diones **7**, thuriferic acid ethyl ester and analogues **8**, and picrodophyllone (**9**). The bis-lactone of type **7** was used as an important precursor for the preparation of gmelinol (**10**), which exhibited anti-malarial activity. Highly diastereoselective alkylation of chiral vicinal dianion **3** was also investigated. The method provided a new general strategy to (*R*)- β -arylmethyl- γ -butyrolactones **11**, which are important precursors for syntheses of some lignan natural products.




Our research group has also searched for cytotoxic lignans or other types from plants with the aim of obtaining lead compounds for the development to anti-cancer drugs. Eighteen species of *Phyllanthus* were collected from all parts of Thailand. Only two species, *Phyllanthus taxodiifolius* and *Phyllanthus acutissima* were chosen for detailed investigation as the potent cytotoxic activities were found in their crude MeOH extracts and the fractions from the partitions.

Ten compounds have been so far isolated from *Phyllanthus taxodiifolius*. The structures of triterpenes **1** and **2**, lignans glycosides **3**–**5** and **9**, and amides **7** and **8** have been characterized. Compound **9** is a new lignan glycoside. Cytotoxic activity evaluation of compound **1**–**6** have been carried out, but the evaluation of compounds **7**–**9** is in progress. Compounds **3** and **4** showed potent cytotoxic activity in several human and mammalian cancer cell lines.


**1****2****3****4****5****9 (New)**



7




8




10


The investigation of *Phyllanthus acutissima* has resulted in the isolation of seven compounds. The structures of four known canthin-6 one alkaloids **11**–**14** and known coumarin **15** have been identified. The structure elucidation of two isolated new triterpenes **16** and **17** have not been fully characterized. Cytotoxicity evaluation of all isolated compounds against a panel of human and mammalian cancer cell lines is in progress.




11




12



13



14




15

EXECUTIVE SUMMARY


งานวิจัยในโครงการนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การวิจัยด้านการสังเคราะห์ และการวิจัยด้านผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ

ด้านการสังเคราะห์


ได้ศึกษาปฏิกิริยาของ vicinal dianions **3**, **4**, **18**, **42** และ **70** โดยพบว่า vicinal dianion ทุกตัวทำปฏิกิริยากับ electrophiles เช่น carbonyl compounds เป็นแบบ regioselective ที่ β -carbon




ได้แสดงให้เห็นประโยชน์ของ vicinal dianion **18** ว่าเป็น reagent ที่สามารถใช้เตรียม α, β, γ -trisubstituted γ -butyrolactone natural products ได้เช่น ($\pm$)-lichesterinic acid (**27**), ($\pm$)-phaseolinic acid (**28**), ($\pm$)-nephromopsinic acid (**29**), ($\pm$)-rocellaric acid (**30**) และ ($\pm$)-dihydroprotolichesterinic acid (**31**) ได้



นอกจากนี้ยังพบว่าสามารถใช้ vicinal dianion **42** สำหรับเตรียมสารประกอบ α -arylidene paraconic ester **45**, tetrasubstituted furans **50**, furofurans **54**, thuriferic acid ethyl esters **57**, picropodophyllone (**57**), bislactones **66**, และ furofurans **68** รวมทั้ง gmelinol (**68f**) ซึ่งมี anti-malarial activity



ส่วน vicinal dianion **70b** ใช้เป็น reagent สำหรับการเตรียม (R)-arylmethyl- γ -butyrolactones **75b** ได้ ซึ่งเป็นสารเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับการเตรียม lignan natural products ต่าง ๆ ได้ตามที่ผู้รายงานไว้ใน literature










ด้านการผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

กลุ่มวิจัยของเราได้เล็งเห็นความสำคัญของสารจำพวก lignans จากธรรมชาติ อีกทั้งได้เห็นตัวอย่าง การพัฒนารักษาโรคเรื้อรังจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ Podophyllotoxin และอนุพันธ์ จึงสนใจที่จะวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติควบคู่ไปกับการงานด้านการสังเคราะห์ด้วย โดยที่มุ่งเป้าหมายว่า จะค้นหาพืชสมุนไพรไทยที่มีสารองค์

ประกอบจำพวก lignans ใหม่ ๆ ที่อาจมี cytotoxic activity และมีแนวโน้มว่าจะพัฒนาเป็นยารักษามะเร็งได้ ได้เก็บและทำการทดสอบ cytotoxic activity ของพืชในสกุล *Phyllanthus* (วงศ์ Euphorbiaceae) รวมทั้งหมด 18 สปีชีส์ ในจำนวนนี้พบว่า *Phyllanthus taxodiifolius* และ *Phyllanthus acutissima* นั้นแสดง potent cytotoxic activity และได้ทำการศึกษาทางเคมีของพืชทั้ง 2 สปีชีส์นี้อย่างละเอียด

จาก *Phyllanthus taxodiifolius* พบสาร triterpenes 2 ตัว ได้แก่ glochidone (1) และ glochidonol (2) พบสารจำพวก lignan glycosides 4 ตัว ได้แก่ cleistanthin A methyl ether (3), cleistanthin A (4), cleistanthoside A (5) และสาร lignan glycoside ใหม่ คือ taxodiifolioside (9) ซึ่งมีโครงสร้างเป็น monoacetate ของ cleistanthoside A พบสารจำพวก amides 2 ตัว ได้แก่ *N*-benzoylphenylalaninyl-*N*-benzoylphenylalaninate (7) และ *N*-benzoylphenylalaninoylphenylalaninol acetate (8) นอกจากนี้ยังพบสารอนุพันธ์ของกรดเบนโซอิก คือ 4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid (10)










ได้ทำการวิเคราะห์หาโครงสร้างโดยวิธีทาง spectroscopy และการเปรียบเทียบกับใน literature แต่เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ได้จาก literature ไม่ค่อยสมบูรณ์นัก ซึ่งข้อมูลสำหรับสารบางตัวได้มีรายงานแต่เฉพาะ ^1H NMR และบางตัวก็มี ^{13}C NMR ด้วย แต่ไม่มีการทำ 2D-NMR experiments เพื่อการ assign ตำแหน่ง chemical shifts ต่าง ๆ ดังนั้นกลุ่มวิจัยของเราจึงน่าจะมีการ assign chemical shifts ได้ถูกต้องมากกว่า เนื่องจากได้ทำ 2D-NMR experiments ของสาร lignans ที่แยกได้ สำหรับสาร 5 นั้นการละลายไม่ดีขึ้นจึงได้เตรียมเป็นอนุพันธ์ tetraacetate คือ cleistanthoside A tetraacetate (5a) โดยปฏิกิริยากับ acetic anhydride และ *N,N*-dimethylaminopyridine (DMAP) ที่อุณหภูมิห้อง แล้วได้ทำการวิเคราะห์โครงสร้างของ cleistanthoside A tetraacetate (5a) แทน cleistanthoside A (5) แม้ว่าได้ทำ 2D-NMR experiment ของ 5 แล้วก็ตาม แต่การวิเคราะห์ทำได้ไม่ดีเนื่องจากสัญญาณขึ้นซ้อนกันและ broad มาก

ได้ทำ methylation ของ cleistanthin A (4) โดยปฏิกิริยากับ methyl iodide/NaH/DMSO ปรากฏว่าได้ product ที่มี ^1H NMR เหมือน cleistanthin A methyl ether (3) ทุกประการ จึงสรุปได้ว่า สาร 3 เป็น analogue ของสาร 4 ขณะนี้ได้พยายามทำ monoacetylation ของสาร 5 ด้วย เพื่อพิสูจน์ว่า สาร 9 เป็น analogue ของสาร 5 แต่ยังไม่ได้นำสาร 9 ไปทำ fully acetylation ทั้งนี้เพราะมีอยู่ปริมาณน้อย ต้องทำการวัด physical properties ต่าง ๆ ก่อน และยังต้องทดสอบ cytotoxic activity อีกด้วย ส่วนสาร 6 มีปริมาณน้อยมากไม่สามารถหาโครงสร้างได้ และยังไม่พบในตัวอย่างพืชที่เก็บครั้งที่ 2 ด้วย

ในแต่ละขั้นตอนของงานวิจัยด้านนี้ได้ทำการทดสอบ cytotoxic activity โดยตลอด ทั้งในส่วนสกัด ใน fractions และในสารบริสุทธิ์ ได้ผลการทดสอบ cytotoxic activity ของสารที่แยกได้ ซึ่งพบว่าสาร 3 และ 4 มีผลการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (สาร 3: ED_{50} ใน P-388 cell line 0.112 $\mu\text{g/mL}$ ใน KB cell line 0.016 $\mu\text{g/mL}$ ใน Col-2 cell line 0.076 $\mu\text{g/mL}$ ใน BCA-1 cell line 0.028 $\mu\text{g/mL}$ ใน Lu-1 cell line 0.021 $\mu\text{g/mL}$ และใน ASK cell line 0.275 $\mu\text{g/mL}$; สาร 4 ED_{50} ใน P-388 cell line 0.053 $\mu\text{g/mL}$ ใน KB cell line 0.003 $\mu\text{g/mL}$ ใน Col-2 cell line 0.029 $\mu\text{g/mL}$ ใน BCA-1 0.014 $\mu\text{g/mL}$ ใน Lu-1 cell line 0.008 $\mu\text{g/mL}$ และใน ASK cell line 0.128 $\mu\text{g/mL}$) สำหรับ สาร 5 และ สาร 6 นั้นไม่ active ขณะนี้ยังรอผลการทดสอบสาร 7-9 อยู่

การศึกษาสารองค์ประกอบจาก *Phyllanthus acutissima* ตัวอย่างที่ 1 นั้น พบสารจำพวก alkaloids 4 ตัว และ coumarin อีก 1 ตัว alkaloids ทั้ง 4 ตัวเป็นชนิด canthin-6-one alkaloid ได้แก่ canthin-6-one (11), 9-methoxycanthin-6-one (12), 1-hydroxycanthin-6-one (13), 9,10-dimethoxycanthin-6-one (14) ส่วน coumarin ที่แยกได้คือ scopoletin (15)




ได้ทำการแยกสารจาก *Phyllanthus acutissima* ตัวอย่างที่ 2 ซึ่งมีปริมาณมากกว่า ปรากฏว่าแยกสาร triterpenes ได้อีก 2 ตัว คือสาร 16 และ 17 สารทั้งสองต่างมี cyclopropane ring อยู่ที่ตำแหน่ง 13, 14 มี olefinic protons 2 protons และ aromatic protons อยู่ในโครงสร้างด้วย คาดว่าเป็นสารใหม่ทั้ง 2 ตัว แต่เนื่องจาก เพิ่งแยกสาร 2 ตัวนี้ได้ และสารทั้งสองเป็นสารที่โมเลกุลใหญ่มาก ($M^+ = 614$ และ $= 658$) จึงยังคงต้องศึกษา โครงสร้างด้วยเทคนิคทางสเปกโทรสโกปีเพิ่มเติมต่อไปอีก ส่วน cytotoxic activity ของสารที่แยกได้นั้นยังรอผล อยู่

เนื้อหางานวิจัย


งานวิจัยด้านการสังเคราะห์

ในระยะแรกของงานวิจัย ได้พยายามมุ่งเน้นไปยังการเตรียมสาร 5 และ 6 ซึ่งจะใช้เป็นตัวกลางในการเตรียมสารประกอบ α -methylene- γ -lactones 7 เช่น ($\pm$)-methylenolactocin¹ และ ($\pm$)-protolichesterinic acid² โดยหาวิธีเตรียม vicinal dianions 3 และ 4 จากสารประกอบ succinic esters 1 และ 2 โดยให้ทำปฏิกิริยากับ base ที่เหมาะสม และศึกษาปฏิกิริยาของมันเป็นกับ carbonyl compounds โดยหวังว่าจะได้สารประกอบ 5 และ 6 ตามต้องการ (แผนผังที่ 1)




1. การเตรียมสารเริ่มต้น dimethyl α -(methyldiphenylsilyl)succinate (1) และ diethyl α -(dimethoxyphosphono)succinate (2)

สามารถเตรียมสาร 1 ได้ 88% yield โดยทำปฏิกิริยา conjugate addition ระหว่าง $(\text{Ph}_2\text{MeSi})_2\text{CuLi}$ (1 equiv) กับ dimethyl fumarate (1 equiv)³ ใน tetrahydrofuran (THF) ที่ -78°C เป็นเวลา 2 ชม. การเตรียม $(\text{Ph}_2\text{MeSi})_2\text{CuLi}$ สามารถเตรียมได้โดยง่ายจากปฏิกิริยาระหว่าง lithium กับ Ph_2MeSiCl (methyldiphenylchlorosilane) ใน THF ที่ 0°C ประมาณ 3 ชม. หลังจากนั้นค่อยเติมลงไปยัง copper(I) cyanide (0.5 equiv) ที่ suspend ใน THF ที่ 0°C จะได้สารละลายสีดำของ $(\text{Ph}_2\text{MeSi})_2\text{CuLi/LiCN}$




ส่วนสาร 2 ก็ได้มาจากปฏิกิริยาระหว่าง trimethyl phosphite กับ dimethyl fumarate โดยมี phenol รวมอยู่ด้วยที่อุณหภูมิ $150-160^\circ\text{C}$ ประมาณ 5 ชม.⁴ หลังจากกลั่นภายใต้ความดัน จะได้สาร 2 66% yield






2. การศึกษาวิธีการเตรียม และ ปฏิกิริยาของ vicinal dianion 3

ในการศึกษาขั้นต้น ได้ทดลองเตรียม vicinal dianion **3** โดยให้สารประกอบ **1** (1 equiv) ทำปฏิกิริยากับ lithium diisopropylamide (LDA, 2.2 equiv) ใน THF ที่ -78°C 1 ชม. แล้วเติม acetone (1.2 equiv) ลงไปยัง reaction mixture ปล่อยให้ที่ -78°C 2 ชม. เสร็จแล้ว workup ด้วย dil. HCl พบว่า สามารถแยกสาร **8a** ได้ถึง 57% yield ไม่พบที่เกิดสารที่ต้องการ **5a** ($R_1 = R_2 = \text{Me}$) เลย ในทำนองเดียวกันเมื่อให้ dianion **3** ทำปฏิกิริยากับ carbonyl compounds ตัวอื่น ๆ (ดังสรุปไว้ในตารางที่ 1) ก็ได้สารประกอบ **8b–8e** เช่นเดียวกัน โดยไม่พบที่เกิดสารประกอบประเภท **5** ที่ต้องการ

สามารถอธิบายการเกิดสารประกอบประเภท 8 ได้คือ ปฏิกริยา regioselective addition ของ dianion 3 กับ carbonyl compounds เกิดขึ้นที่ β -carbon ของ dianion 3 จะได้ alkoxide intermediate 9 ซึ่งจะถูก acidified ด้วย dil. HCl จะได้สาร 10 สาร 10 เกิด acid-catalyzed 1,4-silyl group migration จาก carbon ไปยัง oxygen atom ซึ่งคาดว่าจะเกิดได้ไวกว่า lactonisation ดังแสดงไว้ในแผนผังที่ 2



ตารางที่ 1 การเตรียมสารประกอบ 8a-e

สาร 8	R ^S	R ^L	% Yield ^a	Syn : Anti ^b
8a	CH ₃	CH ₃	57	-
8b		-(CH ₂) ₅ -	42	-
8c	H		61	24 : 76
8d	H		45	17 : 83
8e	H		55	30 : 70

^a Isolated yield; ^b วัดโดย¹H-NMR ของ H-4

สารประกอบ 8a-e ที่เตรียมได้นี้ ได้ characterized โดยใช้ spectroscopic methods รวมทั้ง elemental analysis ด้วย IR spectra ของสาร 8 แสดง carbonyl absorption peak ของ carbomethoxy group ที่ 1739-1740 cm⁻¹ การหาสัดส่วนของ syn- และ anti-diastereomers หาได้โดยวัด coupling constant ของ proton ของ OCHAr ดังนี้คือ


syn-isomer δ 5.06-5.52 ppm (d, *J* = 3.3-4.7 Hz)

anti-isomer δ 4.75-5.17 ppm (d, *J* = 8.0-8.5 Hz)


การที่สามารถสังเคราะห์สาร 8 ได้ ทำให้มั่นใจได้ว่า dianion 3 ได้เกิดขึ้นจริง ๆ เมื่อให้สารเริ่มต้น 1 ทำปฏิกิริยากับ LDA (2 equiv) ใน THF ที่ -78 °C ได้พยายามพิสูจน์การเกิด dianion 3 โดยการ trap ด้วย D₂O หรือ CH₃CO₂D โดย quench สารละลาย THF ของ “dianion” พบว่า ไม่มี “deuterium incorporation” เข้าไปที่ α- และ β-carbon ของสารเริ่มต้น 1 จะได้เพียงสาร 1 กลับคืนมา เมื่อลอง trap ด้วย acetic acid ก็ได้สาร 1 กลับคืนเช่นกัน แสดงว่า “dianion 3” มีความเสถียร แต่เมื่อให้สารละลาย “dianion 3” ทำปฏิกิริยากับ methyl iodide (3-4 equiv) โดยมี hexamethylphosphoramide (HMPA) อยู่ด้วย ที่อุณหภูมิ -78 °C ถึงอุณหภูมิห้อง ทำให้สามารถแยกสาร β-methylated product 11 ได้ 17% yield และสาร α,β-dimethylated product 12 ได้ 16% yield จากผลการทดลองนี้ ทำให้เชื่อได้ว่าเกิด dianion 3 จริง ๆ ซึ่งทำปฏิกิริยากับ methyl iodide แบบ regioselective ที่ β-carbon จะได้สาร 11 และ enolate 13 ซึ่งจะทำปฏิกิริยาไม่สมบูรณ์หลังจาก workup จะได้สาร 11

ได้ลองใช้ electrophile สองตัวที่ต่างกันทำปฏิกิริยากับ dianion 3 คือ acetone เป็นตัวแรก และ methyl iodide เป็น electrophile ตัวที่สอง เพื่อจะแสดงให้เห็น regioselectivity ของ dianion 3 เวลาทำปฏิกิริยากับ electrophile ดังนั้นเมื่อให้ dianion 3 ทำปฏิกิริยากับ acetone (1 equiv) ที่ -78 °C 2 ชม. เสร็จแล้ว เติมน methyl iodide (1.5 equiv) และ HMPA ลงไป และทิ้งไว้ โดยค่อย ๆ ปล่อยให้ถึงอุณหภูมิห้องค้างคืน ทำให้สามารถแยกสาร 8a ได้ 33% yield และสาร 14 21 % yield (ดูแผนผังที่ 3) การเกิดสาร 14 อธิบายได้ตามแผนผังที่ 4

แผนผังที่ 3



แผนผังที่ 4



ได้ทดลองทำปฏิกิริยาโดยให้สารเริ่มต้น 1 (1 equiv) ทำปฏิกิริยากับ LDA (1 equiv)/THF ที่ -78°C แล้วเติม piperonal (1 equiv) ลงไปที่ -78°C แล้วปล่อยให้ทำปฏิกิริยา 2 ชม. หลังจาก workup ด้วย dil. HCl พบว่าจะไม่สามารถแยกสารประกอบประเภท 8 หรือ 9 ได้เลย แต่จะได้สารเริ่มต้น 1 กลับคืนเกือบทั้งหมด จากผลการทดลองเหล่านี้ทำให้เชื่อว่า dianion 3 เกิดขึ้นแน่นอนจากการให้สาร 1 ทำปฏิกิริยากับ LDA (2 equiv) ใน THF ที่ -78°C 1 ชม.


จากการศึกษาข้างต้นถึงแม้ว่าปฏิกิริยาของ dianion 3 กับ carbonyl compounds จะไม่นำไปสู่สารประเภท 5 ที่ต้องการได้ แต่ regioselectivity ของ dianion 3 เวลาทำปฏิกิริยากับ electrophile จะเป็นไปตามที่คาดไว้ คือจะใช้ anion ที่ β -carbon ทำปฏิกิริยากับ electrophile ก่อน เนื่องจากจะเป็นจุดที่ reactive กว่าที่ α -carbon นอกจากนี้ acid-catalyzed 1,4-carbon to oxygen silyl migration ที่เกิดขึ้นก็เป็น reaction ที่น่าสนใจ ซึ่งอาจนำไปประยุกต์ในการศึกษาเกี่ยวกับสารประเภทอื่น ๆ ได้

การที่ไม่สามารถเตรียมสารประเภท 5 ซึ่งเป็นสาร key intermediate สำหรับการเตรียมสารประกอบ α -methylene- γ -lactone ประเภท 7 ได้ จึงพยายามศึกษาปฏิกิริยาของ dianion 4 แทน ดังปรากฏรายละเอียดในหัวข้อที่ 3

3. การศึกษาปฏิกิริยาของ vicinal dianion 4

เมื่อให้สาร 2 ทำปฏิกิริยากับ LDA (2 equiv) ใน THF ที่ -78°C นาน 1 ชม. คาดว่าเกิด dianion 4 โดยขั้นแรกจะเกิด anion 15 ก่อน ซึ่งจะทำปฏิกิริยากับ equivalent ที่สองของ LDA นำไปสู่ dianion 4 เมื่อให้ทำปฏิกิริยากับ acetone (1 equiv) ที่ -78°C นาน 2 ชม. แล้ว workup โดยเติม dil. HCl ลงไป สามารถแยกสารประกอบ 16 ได้ถึง 37% yield โดยที่ไม่สามารถแยกสารประกอบประเภท 6 ที่ต้องการได้ เมื่อทำปฏิกิริยาเดียวกันนี้แต่มี HMPA อยู่ด้วยก็ได้ผลเช่นเดียวกัน แยกสาร 16 ได้ 31% yield ทดลองทำปฏิกิริยากับ cyclohexanone ก็พบว่าจะได้ complex mixture ของ products ซึ่งแยกออกจากกันยากมาก

เป็นที่น่าแปลกใจมากก็คือ การที่สามารถแยกสาร 16 ได้ ซึ่งการเกิดสาร 16 ก็อธิบายได้คล้าย ๆ กับกรณีของปฏิกิริยาของ dianion 3 กับ carbonyl compound (ตามที่ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อที่ 2) คือปฏิกิริยาของ dianion 4 กับ acetone หลังจาก acidify ด้วย dil. HCl แล้วจะได้สาร 17 ซึ่งเกิด 1,4-carbon to oxygen phosphoryl migration ซึ่งปฏิกิริยาแบบนี้จะพบน้อยมากใน Literature⁵ เนื่องจากปฏิกิริยาของ dianion 4 กับ carbonyl compound ค่อนข้าง complex จึงคิดว่าจะชะลอการวิจัยส่วนนี้ไว้ก่อน



4. การศึกษาการเตรียม vicinal dianion **18** จาก triethyl ethanetricarboxylate และการศึกษาปฏิกิริยากับ carbonyl compounds

จากการศึกษาปฏิกิริยาของ dianions **3** และ **4** ที่เตรียมมาจากสารเริ่มต้น dimethyl α -(methyldi-phenylsilyl)succinate (**1**) และ diethyl α -(dimethoxyphosphono)succinate (**2**) โดยให้ทำปฏิกิริยากับ lithium diisopropylamide (LDA, 2 equiv) ใน THF ที่อุณหภูมิ -78°C พบว่า regioselectivity ของ dianion **3** เมื่อทำปฏิกิริยากับ carbonyl compound สูง คือจะทำปฏิกิริยาที่ β -carbon ก่อน จะได้สาร **8** หลัง work-up เป็นที่น่าเสียดายว่า จะไม่ได้ expected product **5** ซึ่งคาดว่าจะใช้สารนี้เป็นตัวที่สำคัญในการเตรียม α -methylene- γ -lactone ประเภท **7** ทั้งนี้ก็เนื่องจากเกิด 1,4-silyl migration ระหว่าง workup ตามที่ได้กล่าวไว้แล้ว ดังนั้นจึงได้ศึกษาปฏิกิริยาของ dianion **18** กับ carbonyl compound ต่าง ๆ ดังผลการทดลองดังนี้


4.1 ปฏิกิริยาของ dianion **18** กับ aldehydes

Vicinal dianion **18** สามารถเตรียมขึ้นมาได้โดยง่าย โดยให้ triethyl ethanetricarboxylate ที่สามารถซื้อได้ ทำปฏิกิริยากับ LDA (2 equiv) ใน THF ที่ -78°C 1 ชม. เมื่อเติมสาร piperonal (1.2 equiv) แล้วปล่อยให้ทำปฏิกิริยานาน 2 ชม. หลังจากนั้น quenched ด้วย 1.5 N HCl แล้วค่อย ๆ ปล่อยให้อุณหภูมิของปฏิกิริยาลงถึงอุณหภูมิห้อง เสร็จแล้ว work-up พบว่า จะได้สารประกอบ **20** เป็นส่วนมาก จะให้สาร γ -lactone **21a** จำนวนเล็กน้อยเท่านั้น ตามที่ได้วิเคราะห์จาก $^1\text{H-NMR}$ ของ crude product แต่เนื่องจากงานวิจัยของเราต้องการให้ได้สารประกอบ γ -lactone ประเภท **21a** จึงได้พยายามหาวิธีการ quench ปฏิกิริยาดังกล่าวด้วยวิธีการอื่น และได้พบว่าเมื่อ

quench ปฏิกริยาด้วย glacial acetic acid ที่ -78°C แล้ว warm มาที่อุณหภูมิห้อง แล้วเติม *p*-toluenesulfonic acid (*p*-TsOH) จำนวนเล็กน้อยลงไป แล้ว stir ทั้งค้างคืน หลังจากนั้น work-up ตามปกติโดยสกัดด้วย ethyl acetate พบว่าจะได้สาร γ -lactone **21a** ถึง 78% yield หลังจาก chromatography เป็นส่วนผสมของ diastereomer 4 ตัว เป็นสัดส่วน 71:11:16:2 เมื่อนำ crude product **20** มาทำปฏิกิริยากับ *p*-TsOH ใน CH_2Cl_2 ที่อุณหภูมิห้องค้างคืน ก็จะได้สาร γ -lactone **21a** เช่นเดียวกัน (แผนผังที่ 5)


การที่สามารถเตรียมสาร γ -lactone **21a** ได้แสดงว่า dianion **18** ทำปฏิกิริยากับ piperonal เป็นแบบ regioselective ที่ β -carbon ของ dianion **18** นำไปสู่ intermediate **19** ก่อนที่จะได้ **21a** หลังจาก quench ด้วย AcOH/*p*-TsOH

แผนผังที่ 5



หลังจากที่ได้พบความสำเร็จในการเตรียมสาร γ -lactone **21a** แล้ว เราได้ศึกษาปฏิกิริยาของ dianion **18** กับ aldehyde ตัวอื่น พบว่าจะได้ γ -lactones **21b-21c** ผลการทดลองได้รวบรวมไว้ในตารางที่ 2 จะเห็นว่า % yield ที่ได้ค่อนข้างดี และได้เป็นส่วนผสมของ diastereomers (แผนผังที่ 6) major diastereomer ที่ได้คือ TC-isomer (ตารางที่ 2)


แผนผังที่ 6

ตารางที่ 2 การเตรียมสาร γ -lactones 21a-f

Entry	γ -Lactone	R	% Yield ^a	TC/CC/TT/CT (or A/B/C/D)
1	21a		78	71:11:16:2 ^b
2	21b		81	79:4:14:3 ^b
3	21c	Ph-	78	71:6:19:4 ^c
4	21d	<i>t</i> -Bu	53	(80:20) ^d
5	21e	<i>n</i> -C ₅ H ₁₁ -	55	79:6:15:trace ^c
6	21f	<i>n</i> -C ₁₃ H ₂₇ -	62	86:3:11:trace ^c

^aIsolated yield.^bDetermined by ¹H-NMR at H-5 of the isolated product.^cDetermined by ¹H-NMR at H-5 of the crude product.^dThe relative stereochemistry could not be assigned and the ratio was determined by ¹H-NMR at H-3 of the crude product.^eDetermined by ¹H-NMR at H-3 and H-5 of the crude product.

ตารางที่ 3 ^1H -NMR data ของ lactones 21a-c, e, f.



21	Assignment	H-3 (d)		H-4 (dd)		H-5 (d)	
		δ (ppm)	$J_{3,4}$ (Hz)	δ (ppm)	$J_{3,4}$ and $J_{4,5}$ (Hz)	δ (ppm)	$J_{4,5}$ (Hz)
21a	A = TC	4.11	7.3	4.07	7.5 (app.t)	5.73	7.5
	B = CC	-	-	-	-	5.47	5.7
	C = TT	3.98	10.7	3.76	10.7, 8.9	5.37	8.9
	D = CT	3.92	9.4	3.45	9.4 (app.t)	5.79	9.3
21b	A = TC	4.20	7.6	4.15	7.7 (app.t)	5.84	8.0
	B = CC	-	-	-	-	5.58	5.7
	C = TT	4.06	10.8	-	-	5.47	9.1
	D = CT	3.99	9.3	3.53	9.3 (app.t)	5.90	9.3
21c	A = TC	-	-	-	-	5.91	7.0
	B = CC	3.95	7.2	-	-	5.65	5.7
	C = TT	4.09	10.6	-	-	5.56	8.9
	D = CT	4.02	9.3	3.57	9.1 (app.t)	5.97	8.9
21e	A = TC	3.88	8.0	3.81	8.0 (app.t)	-	-
	B = CC	3.67	7.3	-	-	-	-
	C = TT	3.89	10.3	-	10.2, 8.6	-	-
	D = CT	-	9.4	-	9.2 (app.t)	-	-
21f	A = TC	3.99	8.0	3.92	7.9 (app.t)	-	-
	B = CC	3.76	7.3	-	-	4.46	5.2
	C = TT	3.98	10.2	3.54	10.2, 8.7	-	-
	D = CT	3.84	9.5	3.22	9.4 (app.t)	-	-


cis และ *trans*-stereochemistry ที่คาร์บอนตำแหน่งที่ 4 และ 5 ของ γ -lactone 21 สามารถหาได้โดยวัดค่า coupling constant (^1H -NMR) ของ proton ที่คาร์บอน 5 ซึ่งปรากฏที่ δ 5.37-5.97 ppm เป็น doublet ซึ่งค่า J_{cis} จะประมาณ 5.7-8.0 Hz ส่วนค่า J_{trans} จะประมาณ 8.9-9.3 Hz ส่วน stereochemistry ที่คาร์บอน 3 และ คาร์บอน 4 หาได้โดยค่า coupling constant ของ proton ที่คาร์บอน 3 ซึ่งปรากฏที่ δ 3.67 ถึง 4.11 ppm เป็น doublet (ดูตารางที่ 3)

4.2 การศึกษาการ isomerization ของ γ -lactone 21

จากการที่ได้ γ -lactone 21 เป็นส่วนผสมของ diastereomer โดยมี TC-isomer เป็น major isomer นั้น จึงคิดว่าเราควรจะสามารถที่จะ isomerise ส่วนผสมของ γ -lactone เพื่อให้ได้ TT-isomer เป็น major diastereomer ได้ เนื่องจากว่าเป็น isomer ที่ควรจะ stable มากที่สุด ดังนั้นจึงได้ศึกษาการ isomerization โดยใช้ DBU

(diazabicycloundecane) เป็น catalyst และทำปฏิกิริยาภายใต้ conditions ต่าง ๆ กัน (ตามที่ได้แสดงไว้ในตารางที่ 4)

จากผลการทดลองพบว่า ไม่ว่าเริ่มต้นจาก γ -lactone **21b** ที่เป็นส่วนผสมของ isomers (entry 1 ตารางที่ 4) หรือเริ่มจาก pure isomer TC-**21b** (ตารางที่ 4, entries 2-5) จะได้ TT-isomer เป็น major isomer และ CC-isomer เป็น minor isomer เนื่องจาก stable น้อยที่สุด conditions ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ isomerise γ -lactone **21b** ควรจะเป็นการใช้ DBU (0.25 equiv)/THF/อุณหภูมิห้อง/2วัน ซึ่งจะได้ product กลับคืนมา 91% yield และมีสัดส่วนของ TT-**21b** ถึง 79 ส่วน (ตารางที่ 4, entry 4) เป็นที่น่าสังเกตว่าให้ทำการ isomerisation ที่อุณหภูมิ 40 °C หรือตั้งปฏิกิริยาไว้นาน 7 วัน จะทำให้สาร α,β -unsaturated ester **22** ประมาณ 12-22% yield การเกิดสาร **22** อธิบายได้โดย mechanism ที่แสดงไว้ในสมการ ส่วน paraconic ester **23** อาจเกิดมาจาก DBU catalyzed deethoxycarboxylation ของสาร **21b** ที่ถูก isomerized ถึง equilibrium แล้ว ดังแสดงจะเห็นว่า สาร **23** เป็น pure *trans*-isomer



ตารางที่ 4 Isomerisation ของสาร **21b**

Entry	Starting lactone (TC/CC/TT/CT)	Conditions	Results:
			Lactone 21 (% yield ^a , TC/CC/TT/CT ^b) and other products
1	21b (86:trace:14:trace)	DBU (1 equiv) in CH ₂ Cl ₂ at 40 °C for 4.5 h	21b (58%, 12:0:76:12) and 22 (22%, E/Z = 36:64)
2	TC- 21b	DBU (0.5 equiv) in THF at 40 °C for 6 h	21b (72%, 12:0:78:10) and 22 (15%) ^d
3	TC- 21b	DBU (0.5 equiv) in THF at RT, overnight	21b (77%, 10:0:80:10) and 22 (3%) ^d
4	TC- 21b	DBU (0.25 equiv) in THF at RT, 2 days	21b (91%, 8:0:78:14) and 22 (3%) ^d
5	TC- 21b	DBU (0.25 equiv) in THF at RT, 7 days	21b (32%, 9:0:79:12) and 22 (12%) ^d and 23 (35%)

^aIsolated yield.

^bDetermined by ¹H-NMR at H-5.


^cNot isolated.

^dRatio of E/Z isomer was not determined.

4.3 ปฏิกิริยาของ dianion 18 กับ ketones

หลังจากได้พบว่า dianion 18 ทำปฏิกิริยากับ aldehyde ได้ γ -lactone แล้ว ได้ศึกษาปฏิกิริยาของ dianion 18 กับ ketone ว่าจะได้ γ -lactone 24 ใน % yield ที่ดีหรือไม่ พบว่า dianion 18 ทำปฏิกิริยากับ ketones ได้ดี ภายใต้ standard conditions ที่ใช้กับ aldehydes ทำให้ได้สาร γ -lactone 24 ที่ต้องการ ดังรวบรวมไว้ในตารางที่ 5 พบว่า *trans*-isomers ของสาร 24a, 24b และ 24c เป็น major isomers (แผนผังที่ 7)

แผนผังที่ 7



ตารางที่ 5 การเตรียมสาร 24a-e

สาร	R ^S	R ^L	% Yield ^a	3,4-position <i>cis/trans</i> ^b
24a	CH ₃	CH ₃	45	0:100
24b	-(CH ₂) ₅ -		58	0:100
24c	Ph	Ph	41	14:86
24d	CH ₃	Ph	39	- ^c
24e	CH ₃	Et	37	- ^c

^a Isolated yield.


^b Determined by ¹H-NMR at H-3.

^c Not determined.


โครงสร้างของสาร γ -lactone 24 พิสูจน์ได้โดยใช้ IR, NMR และ MS IR spectra ของสารเหล่านี้จะแสดง carbonyl absorption ที่ 1737-1747 cm⁻¹ และ 1784-1800 cm⁻¹ ส่วน *cis*- และ *trans*-stereochemistry ที่ carbon-3 และ carbon-4 หาได้โดยวัดค่า coupling constant ระหว่าง protons ที่เกาะที่ carbon-3 และ carbon-4 คือ $J_{cis} \sim 6.6$ Hz และ $J_{trans} = 9-11$ Hz

5. การศึกษาวิธีการเตรียม (±)-Methylenolactocin (25) และ (±)-Protolichesterinic acid (26)


หลังจากประสบความสำเร็จในการเตรียมสาร γ -lactone ประเภท 21 ซึ่งควรจะใช้เป็นสารเริ่มต้นได้ในการเตรียมสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เช่น สาร 25-31 ตามที่เสนอไว้ในข้อเสนอโครงการ




25

Methylenolactocin¹


26

Protolichesterinic acid²


27

Lichesterinic acid⁶


28

Phaseolinic acid⁷

29

Nephromopsinic acid⁸

30


Roccellaric acid⁹

31


Dihydroprotolichesterinic acid¹⁰

ในขั้นนี้จะเป็นการศึกษาหาวิธีเตรียม (±)-methylenolactocin (25) และ (±)-protolichesterinic acid (26) โดยเริ่มต้นจากสาร γ -lactones 21e และ 21f

แผนผังที่ 8




ได้เตรียมสาร 33a, 33b, 34a และ 34b ขึ้นมา เนื่องจากสารเหล่านี้ควรจะใช้เป็น intermediate ในการเตรียม methylenolactocin (25) และ protolichesterinic acid (26) ดังนั้นเมื่อนำ 21e ที่เป็นส่วนผสมของ diastereomer (ดูตารางที่ 6) มาทำปฏิกิริยากับ chloromethyl phenyl sulfide (PhSCH_2Cl เตรียมได้โดยให้ thioanisole ทำปฏิกิริยากับ sulfonyl chloride ใน dichloromethane) โดยใช้ NaH เป็นเบส ที่ 0°C ถึงอุณหภูมิห้อง คำนึง พบว่าจะไม่ได้ product 32a ตามที่ต้องการ จะได้สาร 21e กลับคืนมาทั้งหมด ดังนั้นจึงใช้ NaI ใส่ลงไปปฏิกิริยาด้วย จะทำให้ได้สาร 32a ที่ต้องการถึง 96% yield และได้ CC-isomer ถึง 92% (ดูตารางที่ 6) การที่เราคาดว่าได้ CC-isomer ของสาร 32a เป็น major isomer เนื่องจากว่าเราเริ่มจาก สาร 21e ที่มี TC-isomer เป็นส่วนผสมมากที่สุด ดังนั้นเมื่อเกิดเป็น enolate anion 36 แล้ว PhSCH_2Cl ควรจะเข้าทำปฏิกิริยาในทิศทางตรงกันข้ามกับ $-\text{CO}_2\text{Et}$ group ที่เกาะอยู่ที่ carbon-4 จึงทำให้ได้ CC-32a เป็น major isomer แต่อย่างไรก็ตาม การพิสูจน์ relative stereochemistry นี้จะต้องใช้เทคนิคทาง X-ray crystallography



ดังแสดงในตารางที่ 6 สาร 32b ก็สามารถเตรียมได้ใน % yield ที่สูง โดยทำปฏิกิริยาแบบเดียวกัน

ตารางที่ 6 การเตรียมสาร 32




Entry	21 (TC/CC/TT/CT)	R	Product 32	% Yield ^a	
				(CC/TC) ^b	(CT/TT) ^b
1	21e (85:10:5:trace)	C ₅ H ₁₁ -	32a	92% (CC only)	4% (70:30)
2	21f (trace:0:69:31)	C ₁₃ H ₂₇ -	32b	6% (CC only)	84% (74:26)

^aIsolated yield.^bDetermined by ¹H-NMR at H-5.

เนื่องจากสามารถเตรียมสาร 32 ได้ใน % yield ที่สูงจากสาร 21 จึงได้เตรียมสาร 33 โดยการทำปฏิกิริยา oxidation สาร 32 ต่อเลย โดยไม่ต้องทำการ purify ดังแสดงในตารางที่ 7 เราสามารถเตรียมสาร sulfone 33 ได้ใน % yield ที่สูง

ตารางที่ 7 การเตรียมสาร 33a และ 33b




Entry	21 (TC/CC/TT/CT)	R	Product 33	% Yield ^a (diastereomers)
1	21e (82:6:11:trace)	n-C ₅ H ₁₁ -	33a	92% (TC and small amount of the other isomers)
2	21f (TC and small amount of the other isomers)	n-C ₁₃ H ₂₇ -	33b	88% (CC) and 5% (CT:TT = 73:27) ^b

^aIsolated yield based on compound 21.^bDetermined by ¹H-NMR from ArH of the isolated product.

6. การเตรียม paraconic acid 34a

เตรียมได้ใน % yield ปานกลาง โดยทำปฏิกิริยา hydrolysis ของสาร 33a โดยให้ทำปฏิกิริยากับ 48% HBr ที่ 120-130 °C (3 ชม.) ผลการทดลองสรุปไว้ในตารางที่ 8

ตารางที่ 8 การเตรียมสาร 34a




Entry	33a (CC:CT:TT)	R	Results
1	33a (CC and a small amount of the other diastereomers)	<i>n</i> -C ₅ H ₁₁ -	34a (48%, TC:CC:TT = 32:64:4)
2	33a (0:59:41)	<i>n</i> -C ₅ H ₁₁ -	34a (16%, TT isomer) and 34a (65%, CT:TT = 85:15)

7. การศึกษาวิธีการเตรียม Methyleneolactocin (25)

ได้พยายามทำปฏิกิริยา elimination ของหมู่ PhSO₂- โดยใช้ base เช่น LDA หรือ DBU ภายใต้ conditions ต่าง ๆ กัน พบว่าปฏิกิริยาค่อนข้าง complex ถึงแม้ว่า ¹H-NMR spectrum ของ crude product ที่ได้แสดงให้เห็นว่าเกิดปฏิกิริยา elimination ได้สาร 25 ที่ต้องการเช่นเดียวกัน (δ 5.96 และ 6.38 ppm, each doublet due to methylene protons) แต่บางส่วนได้เกิดการ double bond isomerise ให้ได้สาร 27 ซึ่งเสถียรกว่า ดังปรากฏใน ¹H-NMR spectrum (δ 2.17 ppm, *J* = 1.9 Hz, d, CH₃C=C และ δ 2.15 ppm, d, *J* = 1.8 Hz) และนอกจากนี้จะเห็นว่า มี signal ของสารอื่นอีกด้วยนอกเหนือจากสารเริ่มต้น 34a ได้พยายามแยกให้ได้สาร 25 และ 37 ที่บริสุทธิ์ แต่ไม่สำเร็จ

ตารางที่ 9 การศึกษาการเตรียมสาร Methyleneolactocin 25



Entry	34a	Conditions ^a	Results ^b
1	34a	LDA (2 equiv) in THF at -78 °C for 30 min and -20 °C for 3h	34a and 25 containing a small amount of 37
2	34a	LDA (2 equiv) in THF at -78 °C for 30 min and 0 °C for 3h	34a as the major product containing a small amount of 25
3	34a	DBU (1.6 equiv) in THF at 0 °C for 3h	34a as the major product containing a small amount of 37
4	34a	DBU (2 equiv) in THF at rt, overnight	37 as the major product containing a small amount of 34a
5	34a	DBU (2 equiv) in CH ₂ Cl ₂ at 0 °C for 3h	34a, 25 and 37


^aWhen using DBU, the reaction mixture was quenched with 0.5N HCl, whereas using LDA, it was quenched with glacial acetic acid and acidified with 1N HCl.

^bObserved by the ¹H-NMR spectra of the crude product.

^cA 32:64:4 mixture of TC:CC:TT isomers was used.

8. การเตรียมสาร (±)-Lichesterinic acid (27), (±)-Phaseolinic acid (28), (±)-Nephromopsinic acid (29), (±)-Rocellaric acid (30), และ (±)-Dihydroprotolichesterinic acid (31).


สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 27-31 มี basic skeleton เหมือนกัน คือ เป็นอนุพันธ์ของ paraconic acid บางตัวจะมีฤทธิ์ทางชีวภาพ เช่น lichesterinic acid (27) และ dihydroprotolichesterinic acid (31) มีคุณสมบัติเป็น antibacteria ถึงแม้ว่านักวิจัยได้สังเคราะห์สารต่างๆ เหล่านี้โดยวิธีต่างๆ กันแล้วก็ตาม กลุ่มวิจัยของเราก็สนใจที่จะเตรียมสาร 27 ถึง 31 ได้โดยประยุกต์ใช้ปฏิกิริยาของ vicinal dianion 18 โดยใช้ γ -lactone ประเภท 21 เป็นสารเริ่มต้น ซึ่งเตรียมได้จาก vicinal dianion 18 ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว



8.1 การเตรียม (±)-Lichesterinic acid (27)

ได้ศึกษาวิธีการเตรียม α -phenylsulfonylmethylated γ -lactone 33 เพิ่มเติมจากที่ได้รายงานไว้ในรายงานครั้งที่แล้ว ดังแสดงไว้ในแผนผังที่ 9 และตารางที่ 10

แผนผังที่ 9 การเตรียม α -Phenylsulfonylmethylated γ -Lactone 33




ตารางที่ 10 การเตรียมสาร 33

Entry	21 (TC/CC/TT/CT)	R	Product	33 % Yield ^a (diastereomers)
1	TC-21b	<i>p</i> -MeOC ₆ H ₄ -	33a	95% (CC:TC = 85:15) ^b
2	21c (TC as the major isomer)	Ph-	33b	92% (CC:CT:TT = 76:14:10) ^c
3	21e (82:6:11:trace)	<i>n</i> -H ₁₁ C ₅ -	33c	97% (CC and small amount of the others)
4	21f (TC and small amount of the others)	<i>n</i> -H ₂₇ C ₁₃ -	33d	88% (CC) and 5% (CT:TT = 73:27) ^d

^a Isolated yield based on compound 21.^b Determined by ¹H NMR from ArH of the crude product.^c Determined by ¹H NMR at H-5 of the isolated product.^d Determined by ¹H NMR from ArH of the isolated product.


สามารถพิสูจน์ relative configuration ของ major diastereomer (CC-isomer) ของสาร 32b ได้โดยทำ single crystal X-ray diffraction ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1



จากการที่ได้ศึกษาปฏิกิริยา ester hydrolysis ของสาร 33c (mixture of diastereomer) โดยใช้ LiOH (4 equiv) ใน tetrahydrofuran/H₂O (reflux, 3 ชม.) จะได้สาร butenolide 37 69% yield การที่สามารถแยกสาร 37 ได้นั้นแสดงว่า ปฏิกิริยา ester hydrolysis ของสาร 33c เกิดผ่านปฏิกิริยา decarboxylative desulfonation นำไปสู่ methylenolactocin (25) หลังจาก acidic work-up ซึ่งเกิดปฏิกิริยา isomerization ต่อทำให้ได้ butenolide 37 จากการทำปฏิกิริยา hydrolysis แบบเดียวกันนี้ทำให้สามารถเตรียม (±)-lichesterinic acid (27) ได้ 26% yield จากสาร 33d ดังแสดงในแผนผังที่ 10


แผนผังที่ 10 การเตรียม (±)-Lichesterinic acid (27)



8.2 การเตรียมสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 28, 29, 30 และ 31

ในขั้นแรกได้ศึกษาปฏิกิริยา base-catalyzed methylation ของสาร γ -lactone 21 โดยพบว่าเมื่อให้สาร γ -lactone 21 ทั้งที่เป็น pure diastereomer หรือเป็นของผสมของ diastereomer ทำปฏิกิริยา methylation โดยใช้ NaH/MeI/THF จะได้ CC-isomer ของสาร 38 เป็น major diastereomer ซึ่งสามารถแยกออกจาก diastereomer อื่นได้ (แผนผังที่ 11) ดังแสดงผลการทดลองไว้ในตารางที่ 11 สามารถพิสูจน์ relative stereochemistry ของ CC-isomer ของ 38a ได้โดย single crystal X-ray diffraction ดังแสดงในรูปที่ 2

แผนผังที่ 11 Base-catalyzed Methylation of γ -Lactone 21




ตารางที่ 11 Methylation ของสาร 21b, e, f

Entry	21 TC:(TT+CC):CT	R	Product	%Yield ^a	
				CC-isomer	CT/TT isomers ^b
1	TC-21b	<i>p</i> -MeOC ₆ H ₄ -	38a	94%	-
2	21e (70:27:3)	H ₁₁ C ₅ -	38b	67%	23% (63:37)
3	21f (66:34:trace)	H ₂₇ C ₁₃ -	38c	67%	28% (51:49)


^a Isolated yield.^b Determined by ¹H NMR at H-5.

รูปที่ 2




เมื่อนำ CC-38b มาทำ ester hydrolysis โดย reflux กับ 48% HBr นาน 5 ชม. จะได้ของผสมระหว่างสาร 39 และ (±)-phaseolinic acid (28) เป็นสัดส่วน 62:38 และได้ 89% yield ในทำนองเดียวกันเมื่อ CC-38c ทำปฏิกิริยา hydrolysis โดยใช้ 48% HBr (reflux, 5 ชม.) ก็จะได้ส่วนผสมของสาร 40 และ (±)-nephromopsinic acid (29) (62:38, 87% yield) เป็นที่น่าสังเกตว่าไม่เกิดการ isomerization ที่ตำแหน่งที่ 4 และ 5 ระหว่างปฏิกิริยา hydrolysis (ดูแผนผังที่ 11 และ 12) ได้พยายามแยกสาร 28 และสาร 29 ออกจากสาร 39 หรือสาร 40 โดยวิธี chromatography พบว่าไม่สำเร็จ แต่สามารถแยกออกจากกันได้โดยเปลี่ยนให้เป็น methyl esters โดยให้ทำปฏิกิริยาเป็น dicyclohexylcarbodiimide (DCC) และ methanol แล้วแยกโดย chromatography

แผนผังที่ 12 Preparation of (±)-Phaseolinic Acid (28)




ได้ศึกษาปฏิกิริยา hydrolysis ของสาร CC-38c โดยใช้ LiOH/THF/H₂O ที่อุณหภูมิห้อง ปรากฏว่าปฏิกิริยา hydrolysis เกิดไม่ complete ¹H NMR ของ crude product ที่ได้แสดงให้เห็นว่ายังมี signals ของ ester group ยังเหลืออยู่ ดังนั้นจึงต้องนำ crude product ที่ได้มาทำปฏิกิริยา hydrolysis โดยใช้ 48% HBr/reflux อีกครั้งจะได้ 80% yield ของส่วนผสม 64:36 ของ (±)-roccellaric acid (30) และ (±)-dihydroprotolichesterinic acid (31) ซึ่งแยกออกจากกันได้โดยทำเป็น esters โดยใช้ DCC/MeOH (ดูแผนผังที่ 13)

แผนผังที่ 13 Preparation of 29, 30 and 31




จากผลการทดลองที่พบว่า ester hydrolysis ของ CC-38c โดยใช้ LiOH ทำให้เกิด epimerisation ที่ carbon ที่ 4 ทำให้ได้ *trans*-(4,5)-isomer ซึ่ง stable กว่า ดังแสดงในแผนผังที่ 14

แผนผังที่ 14



ได้ศึกษาปฏิกิริยา ester hydrolysis ของสารผสมของ isomers CT-38c และ TT-38c โดยใช้ 48% HBr (reflux, 3 ชม.) จะได้สารผสมของ (±)-roccellaric acid (30) และ (±)-dihydroprotolichesterinic acid (31) เป็นสัดส่วน 76:24 เพียง 29% yield พบว่าได้ % yield สูงขึ้นถึง 72% เมื่อให้สารผสมของ CT-38c และ TT-38c ทำปฏิกิริยากับ LiOH/THF/H₂O ก่อน แล้วทำการ hydrolyze crude product ที่ได้อีกครั้งด้วย 48% HBr ดังแสดงในแผนผังที่ 15


แผนผังที่ 15




9. การศึกษาวิธีการเตรียมและปฏิกิริยาของ vicinal dianion 42

ได้ศึกษาปฏิกิริยาของ vicinal dianion 42 กับ carbonyl compounds ซึ่ง vicinal dianion 42 เตรียมได้โดยให้สาร α -aroylsuccinic ester 41 ทำปฏิกิริยากับ lithium diisopropylamide (LDA, 2 equiv) ใน THF ที่ -78°C ทำให้สามารถเตรียมสารประกอบ α -aroyl- γ -butyrolactone 43 ได้ นอกจากนี้ได้ใช้ประโยชน์ของสาร 43 สำหรับเป็นสารตั้งต้นในการเตรียมสารประกอบ α -arylidene- γ -butyrolactones 45 ดังสรุปไว้ในแผนผังที่ 16

แผนผังที่ 16



สารประเภท 45 นี้มีความสำคัญ เนื่องจากมี basic skeleton เหมือนสารที่เป็นสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เช่น phellinsin A (46) ซึ่งเป็นสารที่มีคุณสมบัติเป็น antifungal agent ซึ่งแยกได้จาก *Phellinus* sp. PL3.¹¹




Phellinsin A (46)

9.1 การเตรียม α -aroylsuccinic ester 41


สามารถเตรียมสารตั้งต้น 41 ได้โดยทำปฏิกิริยา conjugate addition ของสารประกอบ aminonitrile¹² กับ diethyl fumarate แล้วนำ adduct ที่ได้ไปทำ hydrolysis โดยใช้ $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}/\text{EtOH}/\text{H}_2\text{O}$ ดังแสดงไว้ในแผนผังที่ 17 พบว่าสามารถเตรียมสาร 41a, 41b และ 41c ได้ 74, 68 และ 70% yields ตามลำดับ % yield ของสารที่แสดงไว้ได้คำนวณจากสารเริ่มต้น aromatic aldehydes วิธีนี้นับว่าเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวก เนื่องจากปฏิกิริยาเริ่มต้นจาก aromatic aldehyde ที่สามารถหาซื้อได้ จะเห็นได้ว่าสามารถที่จะเปลี่ยนหมู่ Ar^1 ของสาร 41 เป็นหมู่อะไรก็ได้

แผนผังที่ 17



10. การเตรียม vicinal dianions 42a-c และ การศึกษาปฏิกิริยากับ carbonyl compounds

ในขั้นแรกได้ศึกษาการเตรียม vicinal dianion 42a จาก α -benzoylsuccinic ester 41a โดยให้ทำปฏิกิริยากับ LDA (2 equiv) ใน THF ที่ -78°C (1 ชม.) จะได้สารละลายสีส้มของ vicinal dianion 42a เมื่อให้ทำปฏิกิริยากับ benzaldehyde (1 equiv) โดยมี ZnCl_2 (1 equiv) อยู่ด้วยที่ -78°C แล้วค่อย ๆ warm-up มาที่อุณหภูมิห้อง (~12-16 ชม.) แล้ว work-up โดย hydrolyze ด้วย 2M HCl จะได้สาร γ -lactone 43a ที่ต้องการ 74% yield เป็นส่วนผสมของ diastereomers พบว่าสามารถแยก 3,4-*trans*-4,5-*cis*-43a (TC-isomer) ซึ่งเป็น major isomer ของสาร γ -lactone 43a ได้ถึง 61% yield สำหรับ relative stereochemistry ของ TC-43a สามารถสรุปได้จาก NOE experiments ดังแสดงในรูป TC-43aA




หลังจากประสบความสำเร็จที่ได้แสดงให้เห็นว่าเราสามารถเตรียม vicinal dianion 42a ได้โดยทำ double lithiation ของสารเริ่มต้น 41a โดยใช้ LDA (2 equiv) ใน THF ที่ -78°C และ vicinal dianion ทำปฏิกิริยากับ benzaldehyde โดยมี β -regioselectivity สูงมาก จึงได้ศึกษาปฏิกิริยาของ vicinal dianion กับ piperonal และ 4-methoxybenzaldehyde ก็พบว่า ได้ γ -lactones 43b และ 43c ในปริมาณ 71 และ 65% yields ตามลำดับ นอกจากนี้ vicinal dianion 42 ยังทำปฏิกิริยาได้ดีกับ acetone cyclohexanone isobutyralde-

hyde และ benzophenone ดังแสดงผลการทดลองไว้ในตารางที่ 12 (ลำดับที่ 1-7) พบว่าจะได้ TC-43b และ TC-43c isomers เป็น major isomers 43d, 43e และ 43g จะได้ 3,4-trans isomers ($J \cong 10.0-10.5$ Hz) เป็น major isomers

ในการทำงานเดียวกัน ได้ศึกษาปฏิกิริยาของ vicinal dianions 42b และ 42c กับ carbonyl compounds ต่าง ๆ ซึ่งก็พบว่าได้ผลเช่นเดียวกัน คือสามารถเตรียมสาร γ -lactones 43h-43o และจะได้ TC-isomers เป็น major isomers สามารถแยก TC-isomer ของ γ -lactones ที่ได้จากการให้ vicinal dianions 42a-c ทำปฏิกิริยากับ aromatic aldehydes ได้โดยวิธี chromatography

ตารางที่ 12 ปฏิกิริยาของ vicinal dianions 42a-c กับ carbonyl compounds




ลำดับที่	Dianion 42	RCHO or (R) ₂ CO	γ -Lactone 43	% yield ^{a,b}
1	42a	PhCHO	43a, $\text{Ar}^1 = \text{Ph}$; $\text{R}^1 = \text{Ph}$; $\text{R}^2 = \text{H}$	74%
2	42a	Piperonal	43b, $\text{Ar}^1 = \text{Ph}$; $\text{R}^1 = \text{Piperonyl}$; $\text{R}^2 = \text{H}$	71%
3	42a	4-MeOC ₆ H ₄ CHO	43c, $\text{Ar}^1 = \text{Ph}$; $\text{R}^1 = 4\text{-MeOC}_6\text{H}_4$; $\text{R}^2 = \text{H}$	65%
4	42a	Acetone	43d, $\text{Ar}^1 = \text{Ph}$; $\text{R}^1 = \text{R}^2 = \text{Me}$	50%
5	42a	Cyclohexanone	43e, $\text{Ar}^1 = \text{Ph}$; $\text{R}^1\text{-R}^2 = \text{-(CH}_2\text{)}_5\text{-}$	70%
6	42a	Isobutyraldehyde	43f, $\text{Ar}^1 = \text{Ph}$; $\text{R}^1 = \text{Pr}^i$; $\text{R}^2 = \text{H}$	63%
7	42a	Benzophenone	43g, $\text{Ar}^1 = \text{Ph}$; $\text{R}^1 = \text{R}^2 = \text{Ph}$	28%
8	42b	PhCHO	43h, $\text{Ar}^1 = \text{Piperonyl}$; $\text{R}^1 = \text{Ph}$; $\text{R}^2 = \text{H}$	51%
9	42b	Piperonal	43i, $\text{Ar}^1 = \text{Piperonyl}$; $\text{R}^1 = \text{Piperonyl}$; $\text{R}^2 = \text{H}$	47%
10	42b	4-MeOC ₆ H ₄ CHO	43j, $\text{Ar}^1 = \text{Piperonyl}$; $\text{R}^1 = 4\text{-MeOC}_6\text{H}_4$; $\text{R}^2 = \text{H}$	51%
11	42b	Isobutyraldehyde	43k, $\text{Ar}^1 = \text{Piperonyl}$; $\text{R}^1 = \text{Pr}^i$; $\text{R}^2 = \text{H}$	60%
12	42b	Acetone	43l, $\text{Ar}^1 = \text{Piperonyl}$; $\text{R}^1 = \text{R}^2 = \text{Me}$	40%
13	42c	PhCHO	43m, $\text{Ar}^1 = 4\text{-MeOC}_6\text{H}_4$; $\text{R}^1 = \text{Ph}$; $\text{R}^2 = \text{H}$	64%
14	42c	Piperonal	43n, $\text{Ar}^1 = 4\text{-MeOC}_6\text{H}_4$; $\text{R}^1 = \text{Piperonyl}$; $\text{R}^2 = \text{H}$	65%
15	42c	4-MeOC ₆ H ₄ CHO	43o, $\text{Ar}^1 = 4\text{-MeOC}_6\text{H}_4$; $\text{R}^1 = 4\text{-MeOC}_6\text{H}_4$; $\text{R}^2 = \text{H}$	57%

^a % Yields หลังจากทำการ purify โดย preparative thin-layer chromatography

^b ได้เป็นส่วนผสมของ diastereomers


การที่ได้ TC-isomers ของ γ -lactones 43 สามารถอธิบายได้ดังแสดงไว้ในแผนผังที่ 18 ซึ่งจะเห็นได้ว่า transition state 46A จะเป็น transition state ที่มี steric interaction น้อยกว่า 46B ทำให้ได้ anti-adduct 47 และในที่สุด หลัง protonation และ lactonisation โดยกรด จะได้ TC-isomers เป็น major isomer

แผนผังที่ 18

11. การเตรียม α -arylidene- γ -butyrolactones 45 จาก α -aroyl- γ -butyrolactone 43


หลังจากที่สามารถเตรียมสารประกอบ α -aroyl- γ -butyrolactones 43 ได้แล้ว ได้พยายามแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของสาร 43 ว่า สามารถใช้เป็นสารตั้งต้นในการเตรียมสารประกอบ α -arylidene- γ -butyrolactones 45 ได้ โดยจะใช้ TC-isomers ของสาร 43 เป็นสารเริ่มต้น เนื่องจากสามารถแยกออกมาได้บริสุทธิ์ตามที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นแล้ว แผนผังการเตรียมสาร 45 ได้แสดงไว้ในแผนผังที่ 19

แผนผังที่ 19




ในขั้นแรก ได้ศึกษาปฏิกิริยา reduction ของสาร **43i** โดยได้ลองใช้ reducing agent ต่าง ๆ ภายใต้ conditions ต่าง ๆ กัน เช่น $\text{NaBH}_4/\text{MeOH}$ or EtOH , $\text{NaBH}_4/\text{CeCl}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}/\text{EtOH}$, $\text{Zn}(\text{BH}_4)_2/\text{THF}$ ที่ อุณหภูมิ และเวลาต่าง ๆ กัน พบว่าจะได้สารเริ่มต้น **43i** กลับคืนมาทั้งหมด ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจที่ปฏิกิริยา reduction ไม่เกิดเลย ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าสารประเภท **43** เกิด enolisation ได้เร็ว เนื่องจากมี α -acidic proton แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อนำสาร **43i** มาทำปฏิกิริยา catalytic hydrogenation โดยใช้ 10% Pd/C เป็น catalyst และใช้ THF หรือ EtOAc เป็นตัวทำละลาย จะได้สาร **44i** 82-83% yield เป็นส่วนผสมของ 2 diastereomers เป็นสัดส่วนประมาณ 65:35 เมื่อนำ alcohol **44i** มาทำปฏิกิริยากับ methanesulfonyl chloride (~2-3 equiv) โดยใช้ pyridine เป็น solvent ที่อุณหภูมิห้อง (3 ชม.) จะได้ (*E*)- α -benzylidene- γ -butyrolactone **45i** 83% yield หลังจาก chromatography (แผ่นผั่งที่ 20)

แผ่นผั่งที่ 20



หลังจากนั้นได้เตรียม α -aryliden- γ -butyrolactones **45a-h** จาก TC-isomers ของสาร **43a-h** โดยใช้ conditions เดียวกันกับการเตรียมสาร (*E*)-**45i** จากสาร **43i** ผลการทดลองได้รวบรวมไว้ในตารางที่ 13 ซึ่งจะ เห็นได้ว่าสามารถเตรียมสารประกอบ (*E*)- α -aryliden- γ -butyrolactones **45a-h** ได้ใน % yield ที่ดี

ตารางที่ 13 การเตรียม α -aryliden- γ -butyrolactone **45**



TC-43	Ar ¹	Ar ²	44 (%) ^{a,b}	(<i>E</i>)-45 (%)
TC-43a	Ph	Ph	44a, quant. ^c	45a, 60
TC-43b	Ph	Piperonyl	44b, 61	45b, 92
TC-43c	Ph	4-MeOPh	44c, 65	45c, 91
TC-43d	Piperonyl	Ph	44d, quant. ^c	45d, 75
TC-43e	Piperonyl	Piperonyl	44e, 93	45e, 90
TC-43f	Piperonyl	4-MeOPh	44f, quant. ^c	45f, 75
TC-43g	4-MeOPh	Ph	44g, 80	45g, 95
TC-43h	4-MeOPh	Piperonyl	44h, 87	45h, 91


^a Yield หลังจาก chromatography

^b Obtained as mixtures of diastereomers.

^c Yields of the crude products.

การที่ปฏิกิริยานำไปสู่ *E*-isomer ของ α -arylidene- γ -butyrolactones 45a-i เท่านั้น สามารถอธิบายได้ดังนี้คือ ในขั้นแรกของปฏิกิริยาจะเกิด สาร mesylate ของ alcohol 44 ซึ่งเป็นส่วนผสมของ diastereomers แล้วเกิด E_2 -elimination ตามด้วย conjugate addition-elimination ของ pyridine α -arylidene- γ -butyrolactone ซึ่งจะนำไปสู่ (*E*)-isomer ของสาร α -arylidene- γ -butyrolactone 45 ซึ่งเป็น isomer ที่ stable ที่สุด ดังแสดงไว้ในแผนผังที่ 21


แผนผังที่ 21



12. การเตรียมสารประกอบ dihydrofuran 49

ตามที่เคยรายงานมาในหัวข้อที่ 10 พบว่า vicinal dianion 42 ทำปฏิกิริยากับ aromatic aldehydes โดยมี $ZnCl_2$ อยู่ด้วย จะได้เพียง γ -butyrolactone 43 เป็น product ระหว่างการศึกษาคหา conditions ที่เหมาะสม ได้พบว่า ถ้าให้ vicinal dianion 42a ทำปฏิกิริยากับ aromatic aldehyde โดยไม่มี $ZnCl_2$ อยู่ด้วย จะได้ product เป็นส่วนผสมของ γ -butyrolactone 43a (37%) กับ dihydrofuran 49a (16%) หลังการ work-up ด้วย 1N HCl ปริมาณของ dihydrofuran 49a จะขึ้นอยู่กับการ work-up ซึ่งจะทำให้ %yield ของ 49a จะค่อนข้างเปลี่ยนแปลง แต่พบว่าเมื่อให้ vicinal dianion 42a ทำปฏิกิริยากับ benzaldehyde (1 equiv) ที่ $-78^\circ C$ (2 ชม.) แล้ว quench ปฏิกิริยาด้วย glacial acetic acid ที่ $-78^\circ C$ จะได้ adduct 51a ซึ่งจากการตรวจสอบโดย 1H NMR พบว่าจะมี γ -butyrolactone 43a เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เมื่อนำ crude adduct 51a มาทำปฏิกิริยากับ *p*-toluenesulfonic acid ใน toluene และ reflux 2 ชม. พบว่าจะได้ dihydrofuran 49a (*cis*- และ *trans*-isomers) 71% yield และได้ γ -butyrolactone 43a 13% yield นอกจากนี้พบว่า *cis*-dihydrofuran 49a เป็น major isomer (ดูแผนผังที่ 22) หลังจากที่ได้ conditions ที่ดีที่สุดของการเตรียมสาร dihydrofurans 49a แล้ว ได้ศึกษาปฏิกิริยาของ vicinal dianions 42a, 42b และ 42c กับ aldehydes ตัวอื่นๆ ตามที่ได้รวบรวมสรุปผลการ

แผนผังที่ 22



ทดลองไว้ในตารางที่ 14 ซึ่งพบว่าสามารถเตรียมสาร dihydrofurans 49a-49k ได้ตั้งแต่ 37-71% yields และได้ γ -butyrolactones 43 ตั้งแต่ร้อยละ 15% yield ซึ่งพบว่าผลการทดลองที่ได้เป็นที่น่าสนใจ นอกจากนี้ยังสามารถแยก *cis*-dihydrofurans 49a-c, 49e-g และ 49i-k ได้บริสุทธิ์ ซึ่งจะใช้เป็นสารเริ่มต้นสำหรับการเตรียม tetrasubstituted furans 50 ต่อไป

ตารางที่ 14 การเตรียม 2,3-dihydrofurans 49


Entry	41	Electrophile	Ar ¹	Ar ²	% Yields ^a				
					49	<i>cis</i> -49	<i>trans</i> -49	<i>cis</i> -49 + <i>trans</i> -49 (<i>cis</i> : <i>trans</i>)	43 ^b
1	41a	Benzaldehyde	Ph	Ph	49a	59	12	–	13
2	41a	Piperonal	Ph	Piperonyl	49b	41	10	–	5
3	41a	4-Methoxybenzaldehyde	Ph	4-MeOPh	49c	50	13	–	11
4	41a	Isobutyraldehyde	Ph	<i>i</i> -Pr	49d	–	–	63 (66 : 34)	– ^c
5	41b	Benzaldehyde	Piperonyl	Ph	49e	41	7	–	7
6	41b	Piperonal	Piperonyl	Piperonyl	49f	26	–	13 (80 : 20)	8
7	41b	4-Methoxybenzaldehyde	Piperonyl	4-MeOPh	49g	30	–	11 (74 : 26)	10
8	41b	Isobutyraldehyde	Piperonyl	<i>i</i> -Pr	49h	–	–	55 (67 : 33)	– ^c
9	41c	Benzaldehyde	4-MeOPh	Ph	49i	53	– ^c	–	15
10	41c	Piperonal	4-MeOPh	Piperonyl	49j	39	11	–	11
11	41c	4-Methoxybenzaldehyde	4-MeOPh	4-MeOPh	49k	37	– ^c	–	13

^aIsolated yields. All compounds were fully characterized by IR, MS, 300 MHz ¹H and 75 MHz ¹³C NMR spectra as well as elemental analyses or HRMS.

^bContained mainly the 3,4-*trans*-4,5-*cis*-isomer.

^cCould not be isolated.

สำหรับ relative stereochemistry ของ *cis*-49 และ *trans*-49 ดูได้จาก ^1H NMR coupling constant ระหว่าง H-2 และ H-3 โดย $J_{\text{cis}} = 10.9\text{--}11.0\text{ Hz}$ และ $J_{\text{trans}} = 6.8\text{--}7.1\text{ Hz}$ นอกจากนี้ยังได้ confirm โดยทำ NOE experiment กับสาร *cis*-49b ดังแสดงในรูปข้างล่าง



13. การเตรียม tetrasubstituted furan 50

สามารถเตรียม furan 50 จาก *cis*-49 โดยทำปฏิกิริยา dehydrogenation (oxidation) โดยใช้ dichlorodicyanoquinone (DDQ) ใน benzene และ reflux เป็นเวลา 5 ชม. สามารถเตรียมสาร 50a-f ได้ตามที่ไดรวรรวไว้ในตารางที่ 15



ตารางที่ 15 การเตรียม tetrasubstituted furans 50

<i>cis</i> -49	Ar ¹	Ar ²	% Yields ^a 50
<i>cis</i> -49a	Ph	Ph	50a, 85
<i>cis</i> -49b	Ph	Piperonyl	50b, 95
<i>cis</i> -49c	Ph	4-MeOPh	50c, 90
<i>cis</i> -49e	Piperonyl	Ph	50b, 93
<i>cis</i> -49f	Piperonyl	Piperonyl	50d, 94
<i>cis</i> -49i	4-MeOPh	Ph	50c, 96
<i>cis</i> -49j	4-MeOPh	Piperonyl	50e, 95
<i>cis</i> -49k	4-MeOPh	4-MeOPh	50f, 93

^aIsolated yields. All compounds were fully characterized by IR, MS, 300 MHz ^1H and 75 MHz ^{13}C NMR spectra as well as elemental analyses or HRMS.

^bThe reactions were not performed.


นอกจากนี้ยังพบว่า ปฏิกิริยา oxidation ของ *trans*-49 โดยใช้ DDQ/benzene/reflux (5 ชม.) จะเกิดช้ากว่า *cis*-49 มาก ดังเช่น เมื่อให้ mixture ของ *cis*-49b และ *trans*-49b ทำปฏิกิริยาภายใต้ standard conditions *cis*-49b จะถูก oxidized สมบูรณ์ให้ได้ 50b แต่ *trans*-49b ยังทำปฏิกิริยาไม่หมด แต่อย่างไรก็ตามเมื่อทำปฏิกิริยานานขึ้นเป็น 12 ชม. จะได้สาร 50b ถึง 92%

14. การเตรียมสารประกอบ 2,5-diaryl-3,7-dioxabicyclo[3.3.0]octanes 54

เนื่องจาก tetrahydrofurotetrahydrofuran เป็น nucleus ที่สำคัญของ furofuran natural products หลายตัวซึ่งมีคุณสมบัติทางชีวภาพที่น่าสนใจ เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของ dihydrofurans *cis*-49 ว่าสามารถใช้เป็น intermediate สำหรับการเตรียม tetrahydrofurotetrahydrofuran ประเภท 54 ได้ ดังแสดงในแผนผังที่ 23 เมื่อทำปฏิกิริยา catalytic hydrogenation ของสาร 49 โดยใช้ Pd-C (10 mol%) ใน EtOAc ที่อุณหภูมิห้องเป็น

เวลา 6 ชม. จะได้ all-*cis*-52 ใน % ที่ดีมาก เมื่อนำสาร all-*cis*-52 มาทำปฏิกิริยา reduction โดยใช้ LiAlH_4 ใน THF จะได้ *cis*-diol 53 ซึ่งเกิด cyclodehydration เมื่อได้ทำปฏิกิริยากับ *p*-toluenesulfonyl chloride ใน pyridine ที่อุณหภูมิห้อง จะได้ tetrahydrofurotetrahydrofurans 54 ดังได้รวบรวมผลการทดลองไว้ในตารางที่ 16

แผนผังที่ 23



ตารางที่ 16 การเตรียม tetrahydrofurotetrahydrofurans 54


<i>cis</i> -49	Ar ¹	Ar ²	% Yields ^a		
			52	53	54
<i>cis</i> -49a	Ph	Ph	52a, 85	53a, 83	54a, 70
<i>cis</i> -49b	Ph	Piperonyl	52b, 86	53b, 89	54b, 82
<i>cis</i> -49c	Ph	4-MeOPh	52c, 88	53c, 82	54c, 75
<i>cis</i> -49e	Piperonyl	Ph	– ^b	– ^b	– ^b
<i>cis</i> -49f	Piperonyl	Piperonyl	52d, 86	53d, 80	54d, 74
<i>cis</i> -49i	4-MeOPh	Ph	– ^b	– ^b	– ^b
<i>cis</i> -49j	4-MeOPh	Piperonyl	52e, 89	53e, 84	54e, 75
<i>cis</i> -49k	4-MeOPh	4-MeOPh	52f, 83	53f, 82	54f, 76

^aIsolated yields. All compounds were fully characterized by IR, MS, 300 MHz ¹H and 75 MHz ¹³C NMR spectra as well as elemental analyses or HRMS.


^bThe reactions were not performed.

15. การเตรียม thuriferic acid ethyl ester and analogues (56) และ การเตรียม picropodophyllone (57)


สาร thuriferic acid (55)¹³ เป็นสารประกอบประเภท cyclolignan แยกสารนี้ได้จากใบของ *Juniperus thurifera* มี cytotoxic activity ต่อ cancer cell lines หลายชนิด ส่วน picropodophyllone (56)¹⁴ ใช้เป็นสารเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับการเตรียม podophyllotoxin ซึ่งเป็น anti-tumor agent ที่สำคัญ



Thuriferic acid (55)




Thuriferic acid ethyl ester



56b, Ar =


56c, Ar =



picropodophyllone (57)

เนื่องจากเป็นสารที่มีความสำคัญ จึงทำให้เราพยายามเตรียมสารเหล่านี้โดยใช้สารประกอบประเภท α -aroyl- γ -lactone **43** ที่เตรียมได้จากการให้ vicinal dianion **42** ทำปฏิกิริยากับ aromatic aldehyde ตามที่กล่าวมาแล้วเป็นสารเริ่มต้น แผนผังการเตรียม thuriferic acid ethyl ester **56a** เป็นไปตามที่แสดงไว้ในแผนผังที่ 24 โดยเริ่มต้นจาก **43p** (เตรียมได้จาก vicinal dianion **42b** ทำปฏิกิริยากับ 3,4,5-trimethoxybenzaldehyde, 56% yield; เป็น 63:3:25:5 mixture ของ TC:CC:TT:CT isomers; TC-isomer แยกได้โดยการทำ crystallisation)

แผนผังที่ 24




ในขั้นตอนแรกได้ทดลองเตรียมสารประกอบ thuriferic acid ethyl ester **56a** โดยเริ่มต้นจากสาร α -aroyl γ -lactone **43p** พบว่าเมื่อให้สาร **43p** ทำปฏิกิริยากับ PhSCH₂Cl/NaI/NaH ใน THF ที่ 0 °C ถึงอุณหภูมิห้อง (ค้างคืน) จะได้สาร **58a** (60% yield) เมื่อให้ **58a** ทำปฏิกิริยา oxidation โดยใช้ H₂O₂/AcOH ที่อุณหภูมิห้อง จะได้สารประกอบ sulfone **59a** (65% yield) พิสูจน์ relative stereochemistry ของ **59a** โดย ¹H NMR

และ X-ray crystallography เมื่อนำสารประกอบ 59a มาทำปฏิกิริยากับ SnCl_4 (anh.) ใน CHCl_3 (dry) ที่อุณหภูมิห้อง (ค้างคืน) จะได้ส่วนผสมของสาร 60 ปนกับ 56a ซึ่งไม่ได้ทำการแยก แต่จะทำปฏิกิริยา elimination ของหมู่ phenylsulfonyl โดยใช้ DBU ใน THF ที่อุณหภูมิห้อง จะได้สาร thuriferic acid ethyl ester 56a (39% yield) และสารประกอบประเภท 61a (6% yield) สามารถอธิบายการเกิดสารประกอบ 56a จาก 59a ได้ คือปฏิกิริยาเกิดแบบ intramolecular Friedel-Crafts alkylation ส่วนสาร 61a เกิดจาก base-catalysed isomerization ของสาร 56a

หลังจากเตรียม thuriferic acid ethyl ester 56a สำเร็จ ได้ใช้วิธีการเดียวกันเตรียมสาร 56b และ 56c จากสาร 43i และ สาร 43j ตามลำดับดังได้แสดงผลการทดลองไว้ในแผนผังที่ 24

หลังจากที่สามารถเตรียมสาร 56a ได้แล้ว ได้พยายามที่จะทำปฏิกิริยา hydrolysis ของ ester group ของสาร 56a เพื่อให้ได้สาร thuriferic acid (55) โดยใช้ conditions ต่าง ๆ กัน เช่น $\text{LiOH}/\text{THF}/\text{H}_2\text{O}$ (อุณหภูมิห้อง), 48% HBr/reflux , 6M HCl/reflux ซึ่งส่วนมากแล้วพบว่าจะได้ complex mixture ของ unidentified products แต่พบว่าเมื่อใช้ 6M $\text{HCl}/\text{dioxane}/\text{reflux}$, 15h สามารถแยกสาร picropodophyllone (57) ได้ถึง 43% yield สาร 57 เป็นสารที่สำคัญมาก เนื่องจากมีผู้ใช้เป็นสารเริ่มต้นที่สำคัญในการเตรียม podophyllotoxin¹⁵ (แผนผังที่ 25)


แผนผังที่ 25



16. การเตรียมสารประกอบ furofurans 68 จากสารประกอบ TC- α -aroyl- γ -lactones 43


ได้ศึกษาวิธีการเตรียมสารประกอบ furofuran ประเภท 62 ซึ่งเป็น basic skeleton ที่สำคัญใน furofuran natural products หลายตัว โดยเริ่มต้นจาก TC-43 ซึ่งสามารถเตรียมได้โดยให้ vicinal dianion 42 ทำปฏิกิริยากับ aromatic aldehydes ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ดังแสดงไว้ในแผนผังที่ 26

แผนผังที่ 26



ในขั้นแรกได้ศึกษาปฏิกิริยา base-catalysed methylation ของ pure diastereomers TC-43a-d เพื่อเตรียม CC-62a-d โดยให้สาร TC-43a-d ทำปฏิกิริยากับ NaH (1.2 equiv) ใน THF ที่ 0 °C แล้วเติม MeI (2 equiv) ลงไปที่ 0 °C แล้วตั้งทิ้งไว้ค้างคืนโดยให้อุณหภูมิของปฏิกิริยาค่อย ๆ เพิ่มขึ้นจาก 0 °C ถึงอุณหภูมิห้อง โดยรวบรวมผลการทดลองไว้ในตารางที่ 17

ตารางที่ 17 การเตรียม CC-62a-d




Entry	Products	Ar ¹	Ar ²	% yield ^a of CC-62
1	CC-62a			95
2	CC-62b			77
3	CC-62c			90
4	CC-62d			42

^aisolated yield.

หลังจากนี้ได้ศึกษาปฏิกิริยา hydroxylation ของสาร TC-43a-d โดยให้ทำปฏิกิริยากับ $\text{O}_2/\text{CeCl}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ ใน $i\text{-PrOH/DMF}$ (1:3) ที่ 60 °C เป็นเวลา 16 ชม. ทำให้สามารถเตรียม CC-63a-d ได้ใน % yield ที่ไม่ค่อยดีจนถึงดี ดังได้รวบรวมไว้ในตารางที่ 18 การที่ได้ CC-63c และ CC-63d ค่อนข้างต่ำอาจจะเป็นเพราะว่าสารเริ่มต้นละลายไม่ค่อยดีใน solvent ที่ใช้ ซึ่งจำเป็นในการ optimized conditions ต่อไป

ตารางที่ 18 Hydroxylation of TC-43a-d




Entry	Products	Ar ¹	Ar ²	% yield ^a of CC-63
1	CC-63a			75
2	CC-63b			71
3	CC-63c			33
4	CC-63d			16

^aisolated yield.

เมื่อเตรียมสาร CC-62a-d และ CC-63a-d ได้แล้วก็ได้นำสารทั้งสองชนิดมาทำปฏิกิริยา reduction โดยใช้ NaBH₄/CeCl₃·7 H₂O ใน MeOH/CH₂Cl₂ ที่ 0 °C (3 ชม.) จะได้สาร 64 และ 65 ซึ่งไม่ได้ทำการแยกสารดังกล่าวออกมา แต่ได้นำไปทำปฏิกิริยา lactonisation ต่อเลย โดยใช้ *p*-TsOH/CH₂Cl₂ ที่อุณหภูมิห้อง (16 ชม.) จะได้สาร 66a-g ดังได้แสดงผลการทดลองไว้ในตารางที่ 19

ตารางที่ 19 การเตรียมสาร bislactones 66a-g



Entry	Products	R	Ar ¹	Ar ²	% yield ^a of 66
1	66a	-CH ₃			70
2	66b	-CH ₃			66
3	66c	-CH ₃			28
4	66d	-CH ₃			21
5	66e	-OH			66
6	66f	-OH			51
7	66g	-OH			43

^aisolated yield.

เมื่อนำสาร bislactone **66a-b** และ **66e-f** มาทำปฏิกิริยา reduction โดยใช้ LiAlH_4 (10 equiv) ใน THF ที่ 60°C เป็นเวลา 5 ชม. จะได้สาร **67a-b** และสาร **67e-f** ดังได้รวบรวมผลการทดลองไว้ในตารางที่ 20 สาร bislactone ที่เตรียมได้จะเป็น single diastereomer ทั้งหมด

ตารางที่ 20 การเตรียม tetraols **67a-b** และ pentaols **67e-f**




Entry	Products	R	Ar ¹	Ar ²	% yield ^a of 67
1	67a	-CH ₃			55
2	67b	-CH ₃			66
3	67e	-OH			59
4	67f	-OH			60

^aisolated yield.

ในขั้นสุดท้ายที่เตรียมสารประกอบ furofurans **68a-b** และ **68e-f** โดยให้สาร **67a-b** หรือ **67e-f** ทำปฏิกิริยากับ methanesulfonyl chloride ใน pyridine/ CH_2Cl_2 ที่ 0°C 6 ชม. และ 0°C ถึง อุณหภูมิห้อง 10 ชม. ผลการทดลองได้รวบรวมไว้ในตารางที่ 21

ตารางที่ 21 การเตรียมสาร furofurans **68a-b** และ **68e-f**



Entry	Products	R	Ar ¹	Ar ²	% yield ^a of 68
1	68a	-CH ₃			48
2	68b	-CH ₃			47
3	68e	-OH			62
4	68f	-OH			63

^aisolated yield.


สาร 68f มีชื่อเรียกว่า Gmelinol ซึ่งเป็น natural product ที่แยกได้จาก heartwood ของต้น *Gmelina arborea*¹⁶ ซึ่งมี anti-malarial activity

17. การศึกษาปฏิกิริยาของ vicinal dianions ของ chiral succinic acid derivatives

จากการที่ได้รายงานในช่วงแรกว่าเราสามารถที่จะใช้ vicinal dianions ของ succinic acid derivatives ต่าง ๆ เป็น reagents ที่สำคัญสำหรับการเตรียมสารประเภท γ -butyrolactones ชนิดต่าง ๆ ได้ รวมทั้ง dihydrofurans, tetrasubstituted furans และ furofurans เป็นต้น จึงทำให้เราสนใจที่จะศึกษาปฏิกิริยาของ chiral vicinal dianion ซึ่งเตรียมมาจาก chiral succinic acid derivatives เพื่อใช้เป็นวิธีการเตรียม chiral β -arylmethylated γ -butyrolactones ซึ่งเป็น intermediate ที่สำคัญมากในการทำ asymmetric synthesis ของสารประเภท lignan natural products

ตามที่ได้แสดงไว้ในแผนผังที่ 27 ได้เตรียมสารเริ่มต้น 69a และ 69b โดยให้ (4S,5R)-(+)-1,5-dimethyl-4-phenyl-2-imidazolidinone หรือ (4R,5S)-(-)-1,5-dimethyl-4-phenyl-2-imidazolidinone ทำปฏิกิริยากับ *n*-BuLi/THF/0 °C/30 นาที แล้วเติม succinyl chloride ลงไปที่ 0 °C แล้ว stir ต่อ 1 ชม. จะทำให้สามารถแยกสารเริ่มต้น 69a และ 69b ได้ 65% และ 57% ตามลำดับ

แผนผังที่ 27



Chiral vicinal dianion 70a เตรียมได้โดยให้ 69a ทำปฏิกิริยากับ LDA (2 equiv)/THF ที่ -78 °C เป็นเวลา 1 ชม. เมื่อให้ทำปฏิกิริยากับ benzyl bromide 1 equiv ที่ -78 °C 5 ชม. จะได้ monobenzylated product 71a 50% yield แล้วได้สารเริ่มต้น 69a คืน 41% yield แต่เมื่อใช้ benzyl bromide 2.2 equiv พบว่า จะได้สาร 71a ถึง 75% yield และพบว่าไม่ว่าจะใช้ 1 หรือ 2.2 equiv ของ benzyl bromide ภายใต้ conditions ดังกล่าวจะได้เพียง monobenzylated product 71a เท่านั้น และเป็น single diastereomer เราสามารถพิสูจน์ absolute configuration ของ stereocenter ที่เกิดขึ้นว่าเป็น (S)-configuration โดยทำปฏิกิริยา hydrolysis ด้วย LiOH/THF/H₂O/reflux จะได้ (S)- α -benzylsuccinic acid ซึ่งเป็นสารที่ known โดยเปรียบเทียบค่า optical

rotation ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกัน และมีเครื่องหมายเป็น (-) เช่นเดียวกัน vicinal dianion **70a** ทำปฏิกิริยากับ methyl iodide และ allyl bromide จะได้สาร **71b** (48%) และ **71c** (49%) ตามลำดับ

ในทำนองเดียวกัน vicinal dianion **70b** ที่เตรียมได้โดยให้สาร **69b** ทำปฏิกิริยากับ LDA (2 equiv)/THF/-78 °C/1 ชม. ก็สามารถทำปฏิกิริยากับ arylmethyl bromides ต่าง ๆ ได้ product ที่ต้องการใน % yield ที่ค่อนข้างดี และทุกตัวเป็น single diastereomer ดังได้รวบรวมผลการทดลองไว้ในตารางที่ 22

ตารางที่ 22 Alkylation of vicinal dianions **70a** and **70b**

Entry	70	RX	71 ^b or 72 ^b , R =	Yield (%) ^a
1	70a	PhCH ₂ Br	71a, PhCH ₂	75
2	70a	MeI	71b, Me	48
3	70a	CH ₂ =CHCH ₂ Br	71c, CH ₂ =CHCH ₂	49
4	70b	3,4-MeOPhCH ₂ Br	72a, 3,4-MeOPhCH ₂	53
5	70b	3-MeOPhCH ₂ Br	72b, 3-MeOPhCH ₂	67
6	70b	3,4-CH ₂ (O) ₂ PhCH ₂ Br	72c, 3,4-CH ₂ (O) ₂ PhCH ₂	67


^a Isolated yields. All compounds were fully characterized by ¹H NMR, ¹³C NMR, MS and CHN analyses or HRMS.

^b The specific rotation values, [α]_D²⁸ of **71a-c** and **72a-c** are as follows: **71a**; +127.84° (c 0.51, MeOH); **71b**, +117.45° (c 0.55, CHCl₃); **71c**, +107.50° (c 0.64, CHCl₃); **72a**, -45.02° (c 0.31, CHCl₃); **72b**, -64.57° (c 0.70, CHCl₃); **72c**, +46.85° (c 0.29, CHCl₃).

จะเห็นได้ว่า vicinal dianions **70a** และ **70b** ทำปฏิกิริยากับ alkylating agent เป็นแบบ high diastereoselectivity และ high regioselectivity การที่เป็นแบบนี้สามารถอธิบายโดย transition state **70b-A**, **70b-B** และ **70a-A** ดังแสดงในแผนผังที่ 28 เราเชื่อว่า vicinal dianions **70a** และ **70b** จะอยู่ในรูปของ (Z,Z)-configuration สำหรับ vicinal dianion **70a** alkylating agent จะเข้ามาทางด้าน Si-face (ดู **70a-A**) ส่วน vicinal dianion **70b** alkylating agent จะเข้าทางด้าน Re-face (ดู **70b-A**) หลังจากที่เกิด alkylation ครั้งที่ 1 แล้ว จะไม่สามารถเกิด alkylation ครั้งที่ 2 ได้ เนื่องจากจะมี steric interaction กับ phenyl และ methyl group ของ chiral auxiliary และกับ α -arylmethyl group


แผนผังที่ 27

Proposed models for the stereochemical course of the alkylation of the vicinal dianions **70a** and **70b**



สามารถพิสูจน์ (R)-configuration ของ stereocenter ใหม่ของสาร **72b** ได้โดยทำ single crystal X-ray diffraction ดังแสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 3




17.1 การเตรียมสารประกอบ (+)-β-arylmethyl-γ-butyrolactones **75**

หลังจากที่สามารถเตรียมสารประกอบ (R)-**72** ได้แล้ว จึงใช้เป็นสารเริ่มต้นในการเตรียมสาร (+)-β-arylmethyl-γ-butyrolactones **75** โดยนำสาร **72a-c** มาทำปฏิกิริยา hydrolysis โดยใช้ LiOH/THF/H₂O,

reflux, 42 ชม. จะได้ succinic acid derivatives **73a-c** ใน % yield ที่ดีมาก หลังจากนั้นให้สาร **73** ทำปฏิกิริยากับ acetic anhydride ที่ 0 °C จะให้ succinic anhydride **74** ซึ่งไม่จำเป็นต้อง purify ได้ใช้ทำปฏิกิริยา reduction ต่อเลยโดยใช้ NaBH₄ และ work-up ด้วย 1M HCl จะได้ส่วนผสมของสาร (+)-β-aryl-methyl-γ-butyrolactones **75a-c** ที่ต้องการ ปนกับ (-)-α-aryl-methyl-γ-butyrolactones **76a-c** ซึ่งสามารถแยกออกจากกันให้บริสุทธิ์ได้โดยง่าย ผลการทดลองได้สรุปไว้ในแผนผังที่ 29

แผนผังที่ 29



งานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

1. การสำรวจและเก็บพืชสกุล *Phyllanthus*

ได้ร่วมมือกับนักพฤกษศาสตร์จากหอพรรณไม้ กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สืบเสาะหาแหล่งพืชในสกุล *Phyllanthus* จากข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูลที่หอพรรณไม้ กรมป่าไม้ รวมกับข้อมูลที่ค้นได้จากฐานข้อมูล NAPRALERT จึงได้ทำการเก็บพืชในสกุลนี้มาได้ทั้งหมด 18 สปีชีส์ (37 ตัวอย่าง) ดังปรากฏในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 น้ำหนักของส่วนต่าง ๆ และแหล่งเก็บของพืชในสกุล *Phyllanthus* ที่เก็บ

ตัวอย่างที่	ชื่อ genus และ species	ส่วนที่เก็บ	น้ำหนัก (kg)	แหล่งเก็บ
1	<i>P. columnaris</i>	LF+TW	1.3	เชียงใหม่
		ST	1.0	เชียงใหม่
		BK	1.3	เชียงใหม่
2	<i>P. milabile</i>	LF+TW	1.3	เชียงใหม่
		ST	1.1	เชียงใหม่
		BK	0.6	เชียงใหม่
3	<i>P. sootepensis</i>	PX	1.2	เชียงใหม่
4	<i>P. roseus</i>	LF+TW	0.6	เชียงใหม่
		ST	0.7	เชียงใหม่
5	<i>P. collinsae</i>	LF+TW	0.8	อุบลราชธานี
		ST	0.65	อุบลราชธานี
6	<i>P. taxodiifolius</i>	PX (ครั้งที่ 1)	1.7	อำนาจเจริญ
		PX (ครั้งที่ 2)	14.3	อำนาจเจริญ
		RT (ครั้งที่ 3)	1.7	อำนาจเจริญ
		RT (ครั้งที่ 4)	4.0	อำนาจเจริญ
7	<i>P. winittii</i>	PX	0.4	เชียงใหม่
8	<i>P. hullettii</i>	PX (ครั้งที่ 1)	0.5	เลย
		PX (ครั้งที่ 2)	2.3	เลย
		PX (ครั้งที่ 3)	18.3	เลย
9	<i>P. pulcher</i>	LF+TW	1.1	สกลนคร
		ST	0.8	สกลนคร
10	<i>P. sikkimensis</i>	PX (ครั้งที่ 1)	0.5	สุราษฎร์ธานี
		PX (ครั้งที่ 2)	10.2	สุราษฎร์ธานี
11	<i>P. albidiscus</i>	LF+TW (ครั้งที่ 1)	1.1	นครศรีธรรมราช
		LF+TW (ครั้งที่ 2)	3.7	นครศรีธรรมราช
		ST (ครั้งที่ 1)	0.7	นครศรีธรรมราช
		ST (ครั้งที่ 2)	3.35	นครศรีธรรมราช

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ตัวอย่างที่	ชื่อ genus และ species	ส่วนที่เก็บ	น้ำหนัก (kg)	แหล่งเก็บ
12	<i>P. pachyphyllus</i>	LF+TW	1.5	ระนอง
		ST	1.0	ระนอง
13	<i>P. oxyphyllus</i>	PX	1.1	ตรัง
14	<i>P. geoffrayi</i>	LF+TW	1.2	สกลนคร
		ST	1.0	สกลนคร
15	<i>P. oxyphyllus</i>	PX	1.1	นครราชสีมา
16	<i>P. acutissima</i>	PX	1.2	ขอนแก่น
	<i>P. acutissima</i>	PX	8.6	ขอนแก่น
17	<i>P. chamaepeuce</i>	PX	2.4	ชัยภูมิ
18	<i>P. gracilipes</i>	PX	1.4	ชัยภูมิ

LF+TW = leaves+twigs; ST = stems; BK = bark; PX = whole plant

2. การสกัดด้วยการแช่ในเมทานอลเพื่อ screen หา cytotoxic activity ในขั้นต้น

ในขั้นต้นได้ทำการสกัดพืชตัวอย่างด้วยการแช่ในเมทานอลตามขั้นตอนดังนี้

1. บดตัวอย่างพืชแต่ละตัวอย่างให้ละเอียด ในกรณีที่เป็น stems และ roots ต้องหั่นให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ ก่อนบด
2. บรรจุตัวอย่างพืชที่บดแล้วลงในถุงผ้า แล้วนำไปใส่ในถังสแตนเลสที่มีก๊อกสำหรับไขออก แล้วเติมเมทานอล
3. ไขสารละลายออกทุก ๆ 5-8 วัน ทำเช่นนี้จนกระทั่งสีของสารละลายจางมากที่สุดจึงเลิกแช่สกัด โดยเฉลี่ยจะแช่สกัดด้วยเมทานอล 5-6 ครั้ง ทั้งนี้แล้วแต่ว่าแต่ละครั้งจะได้สารออกมามากหรือน้อย ถ้าได้น้อยก็จะหยุดการแช่
4. สารละลายที่ไขออกทุก ๆ 5-8 วัน ให้เก็บรวมกันเป็นส่วนสกัดเมทานอล จากนั้นจึงนำไประเหยแห้งด้วยเครื่อง rotary evaporator เสร็จแล้วให้นำไปกำจัดตัวทำละลายขั้นสุดท้ายด้วย liophilizer อีกทีหนึ่ง
5. ชั่งน้ำหนักส่วนสกัดที่ได้จากพืชตัวอย่างต่าง ๆ ได้ผลการสกัดดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ปริมาณของส่วนสกัดจากตัวอย่างพืชต่าง ๆ และเวลาที่ใช้ในการสกัด

ชื่อ genus และ species	ส่วนของพืช	เวลาที่แช่สกัด เฉลี่ย(ครั้ง x วัน)	น้ำหนักแห้งที่บด ละเอียด (kg)	น้ำหนักที่สกัดได้ จาก MeOH (g)
1. <i>P. columnaris</i>	LF+TW	5 x 5	1.3	192.8
	ST	5 x 5	1.0	55.9
	BK	5 x 5	1.3	107.9
2. <i>P. milabile</i>	LF+TW	6 x 5	1.3	84.7
	ST	5 x 5	1.1	47.7
	BK	6 x 8	0.6	111.4
3. <i>P. sootepense</i>	PX	5 x 6	1.2	86.3
4. <i>P. roseus</i>	LF+TW	5 x 7	0.6	73.4
	ST	5 x 7	0.7	39.0
5. <i>P. collinsae</i>	LF+TW	5 x 8	0.8	117.3
	ST	5 x 8	0.65	25.4
6. <i>P. taxodiifolius</i>	PX (ครั้งที่ 1)	6 x 5	1.7	83.4
	PX (ครั้งที่ 2)	6 x 6	14.3	834.9
	RT (ครั้งที่ 3)	5 x 6	1.7	104.53
7. <i>P. winittii</i>	PX	6 x 5	0.4	58.8
8. <i>P. hullettii</i>	PX	6 x 7	0.5	37.3
9. <i>P. pulcher</i>	LF+TW	6 x 7	1.1	100.9
	ST	6 x 7	0.8	43.7
10. <i>P. sikkimensis</i>	PX	5 x 7	0.5	36.4
11. <i>P. albidiscus</i>	LF+TW	5 x 6	1.1	181.7
	ST	4 x 6	0.7	34.9
12. <i>P. pachyphyllus</i>	LF+TW	5 x 6	1.5	238.6
	ST	5 x 8	1.0	21.8
13. <i>P. oxyphyllus</i>	PX	5 x 6	1.1	54.9
14. <i>P. geoffrayi</i>	LF+TW	5 x 6	1.2	204.7
	ST	5 x 7	1.0	110.0
15. <i>P. oxyphyllus</i>	PX	5 x 6	1.1	106.30
16. <i>P. acutissima</i>	PX (ครั้งที่ 1)	5 x 6	1.2	63.73
17. <i>P. chamaepeuce</i>	PX	5 x 6	2.4	296.97
18. <i>P. gracilipes</i>	PX	5 x 6	1.4	102.99

3. การทดสอบ cytotoxic activity ของส่วนสกัดต่าง ๆ ที่ได้จากการแช่ในเมทานอลอย่างเดียว

ได้จัดให้มีการทดสอบ cytotoxic activity โดยได้ส่งให้ทางกลุ่มของ รศ.ดร.สมัยศึก โสภาสรรค์ ภาควิชา สรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่วนที่เหลือได้เก็บไว้ทำการแยกทางเคมีและพิสูจน์โครงสร้าง ผลการทดสอบ cytotoxic activity เป็นไปตามที่แสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผล cytotoxic activity จากส่วนสกัดเมทานอลของ *Phyllanthus* สปีชีส์ต่าง ๆ

ชื่อ genus และ species	ส่วนของพืช	EC ₅₀ (µg/mL)					
		Cell Line					
		P-388	KB	Col-2	BCA-1	Lu-1	ASK
1. <i>P. columnaris</i>	LF+TW	<4	>20	>20	>20	>20	-
	ST	>20	>20	>20	>20	>20	-
	BK	>20	>20	>20	>20	>20	-
2. <i>P. milabile</i>	LF+TW	>20	>20	>20	>20	>20	-
	ST	>20	>20	>20	>20	>20	-
	BK	>20	>20	>20	>20	>20	-
3. <i>P. sootepense</i>	PX	>20	>20	15.27	>20	>20	-
4. <i>P. roseus</i>	LF+TW	>20	>20	>20	>20	>20	-
	ST	>20	>20	>20	>20	>20	-
5. <i>P. collinsae</i>	LF+TW	>20	>20	>20	>20	>20	>20
	ST	>20	>20	>20	>20	14.57	>20
6. <i>P. taxodiifolius</i>	PX (ครั้งที่ 1)	13.03	<4	9.36	<4	<4	11.82
	PX (ครั้งที่ 2)	11.05	<4	<4	<4	<4	9.45
	RT (ครั้งที่ 3)	16.52	<4	13.21	<4	1.0	-
7. <i>P. winitii</i>	PX	>20	>20	>20	>20	>20	>20
8. <i>P. hullettii</i>	PX	13.98	>20	>20	>20	14.79	11.54
9. <i>P. pulcher</i>	LF+TW	>20	>20	>20	>20	>20	>20
	ST	>20	>20	>20	-	>20	>20
10. <i>P. sikkimensis</i>	PX	<4	>20	2.44	>20	>20	<4
11. <i>P. albidiscus</i>	LF+TW	>20	>20	>20	>20	>20	16.78
	ST	>20	>20	>20	>20	>20	>20
12. <i>P. pachyphyllus</i>	LF+TW	>20	>20	>20	>20	>20	>20
	ST	>20	>20	>20	>20	>20	>20
13. <i>P. oxyphyllus</i>	PX	13.38	>20	12.61	>20	>20	>20
14. <i>P. geoffrayi</i>	LF+TW	>20	>20	-	>20	>20	>20
	ST	>20	12.11	19.34	>20	17.57	>20
15. <i>P. exyphyllus</i>	PX	14.07	>20	>20	>20	>20	-
16. <i>P. acutissima</i>	PX	<4	<4	<4	<4	>20	-
17. <i>P. chamaepeuce</i>	PX	>20	>20	>20	>20	>20	-
18. <i>P. gracilipes</i>	PX	15.7	>20	>20	>20	>20	-

หมายเหตุ คำ EC₅₀ ≤ 20 µg/mL จึงถือว่าแสดง activity, - = ยังไม่ได้ผลการทดสอบ

P-388: murine lymphocytic leukemia, KB: human nasopharyngeal carcinoma, COL-2: human colon cancer, BCA-1: human breast cancer, Lu-1: human lung cancer, ASK: rat glioma

จากผลการทดสอบในตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่า มี *Phyllanthus* อยู่ 3 สปีชีส์ ที่มีผลการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ดี มาก เพราะส่วนสกัดเมทานอลของทั้ง 3 สปีชีส์แสดง cytotoxic activity ด้วยค่า $EC_{50} < 4 \mu\text{g/ml}$ ใน 3-4 cell lines กล่าวคือ

ส่วนสกัดเมทานอลของ *P. taxodiifolius* (PX) แสดง cytotoxic activity ใน KB, BCA-1 และ Lu-1 cell lines ด้วยค่า $EC_{50} < 4 \mu\text{g/ml}$

ส่วนสกัดเมทานอลของ *P. sikkimensis* (PX) แสดง cytotoxic activity ใน P-388, Col-2 และ ASK cell lines ด้วยค่า $EC_{50} < 4 \mu\text{g/ml}$

ส่วนสกัดเมทานอลของ *P. acutissima* (PX) แสดง cytotoxic activity ใน P-388, KB, Col-2 และ BCA-1 cell lines ด้วยค่า $EC_{50} < 4 \mu\text{g/ml}$


ด้วยเหตุนี้พืชทั้ง 3 สปีชีส์นี้จึงได้รับความสนใจจากกลุ่มของเรา และได้รับคัดเลือกที่จะศึกษาทางเคมีต่อไป ในระดับลึก ส่วน *P. columnaris* (LF+TW) นั้นมี cytotoxic activity < 4 เพียงใน P-388 เท่านั้น จึงไม่ได้เลือกศึกษาต่อ

เนื่องจาก cytotoxic activity ระดับปานกลางมีปรากฏอยู่บ้างในส่วนสกัดเมทานอลของ *Phyllanthus* สปีชีส์อื่นนอกเหนือจาก 3 สปีชีส์นี้ด้วย ดังนั้นจึงได้นำส่วนสกัดเมทานอลของ *Phyllanthus* ทุก ๆ สปีชีส์ที่เก็บมาได้มาทำการสกัดแยกด้วยตัวทำละลายที่มีขั้วต่ำกว่าเมทานอล เพื่อแยกส่วนแล้วทำการทดสอบ cytotoxic activity อีก ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อสกัดแยกเป็นส่วนย่อยแล้วนั้น activity ยังคงมีอยู่ในส่วนสกัดย่อยหรือไม่ และในบางครั้งแม้ว่า activity จะไม่ปรากฏให้เห็นในส่วนสกัดเมทานอลก็ตาม เมื่อสกัดแยกเป็นส่วนสกัดย่อยแล้ว activity อาจมาปรากฏให้เห็นในส่วนสกัดย่อยก็ได้ ทั้งนี้เนื่องจากเชื่อว่า สารที่ active อาจถูกกลบด้วยสารอื่นๆ ที่ไม่ active ที่มีอยู่เป็นปริมาณมากกว่าก็ได้

4. การ partition เพื่อให้ได้ส่วนสกัดที่มีขั้วแตกต่างกัน และการทดสอบ cytotoxic activity

ได้ทำการแยกส่วนสกัดเมทานอลต่อไปในกรวยแยกเพื่อให้ได้ส่วนสกัดที่มีขั้วแตกต่างกัน และได้นำไปทดสอบ cytotoxic activity อีก ขั้นตอนการสกัดแยกเป็นดังแสดงในแผนผังที่ 1

แผนผังที่ 1



นำชั้นต่าง ๆ ที่สกัดได้ไประเหยแห้งโดยเครื่อง rotary evaporator ทำให้แห้งด้วย liophilizer อีกทีหนึ่ง แล้วจึงชั่งน้ำหนักและบันทึกผลการสกัด ซึ่งผลของการแยกสกัดในกรวยแยกแสดงไว้ในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ปริมาณของส่วนสกัดจากการสกัดแยกในกรวยแยกของ *Phyllanthus* สปีชีส์ต่าง ๆ

ชื่อ genus และ species	ส่วนของพืช	ส่วนสกัด	น้ำหนักที่ได้ (g)
1. <i>P. columnaris</i>	LF+TW	Hexane	43.98
	LF+TW	EtOAc	31.08
	LF+TW	<i>n</i> -BuOH	51.46
	LF+TW	H ₂ O	69.18
	ST	Hexane	*
	ST	EtOAc	5.96
	ST	<i>n</i> -BuOH	8.11
	ST	H ₂ O	43.94
	BK	Hexane	*
	BK	EtOAc	23.87
	BK	<i>n</i> -BuOH	21.31
	BK	H ₂ O	61.19
2. <i>P. milabile</i>	LF+TW	Hexane	26.28
	LF+TW	EtOAc	9.02
	LF+TW	<i>n</i> -BuOH	15.21
	LF+TW	H ₂ O	37.97
	ST	Hexane	2.61
	ST	EtOAc	2.34
	ST	<i>n</i> -BuOH	7.22
	ST	H ₂ O	39.23
	BK	Hexane	*
	BK	EtOAc	20.13
	BK	<i>n</i> -BuOH	19.61
	BK	H ₂ O	65.36
3. <i>P. sootepense</i>	PX	Hexane	22.99
	PX	EtOAc	7.02
	PX	<i>n</i> -BuOH	14.05
	PX	H ₂ O	44.66
4. <i>P. roseus</i>	LF+TW	Hexane	8.66
	LF+TW	EtOAc	16.08
	LF+TW	<i>n</i> -BuOH	27.15
	LF+TW	H ₂ O	20.15
	ST	Hexane	1.67
	ST	EtOAc	3.67
	ST	<i>n</i> -BuOH	9.42
	ST	H ₂ O	23.73

*ไม่สามารถสกัดแยกได้ด้วย Hexane เนื่องจากไม่ละลาย

ตารางที่ 4 (ต่อ)

ชื่อ genus และ species	ส่วนของพืช	ส่วนสกัด	น้ำหนักที่ได้ (g)
5. <i>P. collinsae</i>	LF+TW	Hexane	17.15
	LF+TW	EtOAc	19.82
	LF+TW	<i>n</i> -BuOH	38.18
	LF+TW	H ₂ O	36.87
	ST	Hexane	0.51
	ST	EtOAc	1.33
	ST	<i>n</i> -BuOH	3.16
	ST	H ₂ O	17.91
6. <i>P. taxodiifolius</i>	LF+TW	Hexane	11.40
	LF+TW	EtOAc	15.63
	LF+TW	<i>n</i> -BuOH	3.85
	LF+TW	H ₂ O	38.04
	ST	Hexane	230.05
	ST	EtOAc	158.80
	ST	<i>n</i> -BuOH	140.06
	ST	H ₂ O	282.74
6. <i>P. taxodiifolius</i>	PX (ครั้งที่ 1)	Hexane	11.40
	PX	EtOAc	15.63
	PX	<i>n</i> -BuOH	3.85
	PX	H ₂ O	38.04
	PX (ครั้งที่ 2)	Hexane	230.05
	PX	EtOAc	158.80
	PX	<i>n</i> -BuOH	140.06
	PX	H ₂ O	282.74
	RT (ครั้งที่ 3)	Hexane	6.03
	RT	EtOAc	7.06
	RT	<i>n</i> -BuOH	13.79
	RT	H ₂ O	45.39
7. <i>P. winitii</i>	PX	Hexane	3.31
	PX	EtOAc	11.02
	PX	<i>n</i> -BuOH	20.40
	PX	H ₂ O	15.42
8. <i>P. hullettii</i>	PX	Hexane	3.19
	PX	EtOAc	2.84
	PX	<i>n</i> -BuOH	7.54
	PX	H ₂ O	27.63
9. <i>P. pulcher</i>	LF+TW	Hexane	30.25
	LF+TW	EtOAc	10.76
	LF+TW	<i>n</i> -BuOH	21.46
	LF+TW	H ₂ O	35.63
	ST	Hexane	1.23
	ST	EtOAc	3.05
	ST	<i>n</i> -BuOH	10.26
	ST	H ₂ O	27.30

ตารางที่ 4 (ต่อ)

ชื่อ genus และ species	ส่วนของพืช	ส่วนสกัด	น้ำหนักที่ได้ (g)
10. <i>P. sikkimensis</i>	PX	Hexane	5.81
	PX	EtOAc	6.31
	PX	<i>n</i> -BuOH	7.26
	PX	H ₂ O	16.49
11. <i>P. albidiscus</i>	LF+TW	Hexane	23.75
	LF+TW	EtOAc	24.14
	LF+TW	<i>n</i> -BuOH	57.46
	LF+TW	H ₂ O	64.57
	ST	Hexane	2.36
	ST	EtOAc	4.06
	ST	<i>n</i> -BuOH	8.34
	ST	H ₂ O	18.45
12. <i>P. pachyphyllus</i>	LF+TW	Hexane	35.13
	LF+TW	EtOAc	29.64
	LF+TW	<i>n</i> -BuOH	45.41
	LF+TW	H ₂ O	103.16
	ST	Hexane	3.71
	ST	EtOAc	4.09
	ST	<i>n</i> -BuOH	3.96
	ST	H ₂ O	7.35
13. <i>P. oxyphyllus</i>	PX	Hexane	20.75
	PX	EtOAc	4.47
	PX	<i>n</i> -BuOH	12.34
	PX	H ₂ O	12.11
14. <i>P. geoffrayi</i>	LF+TW	Hexane	2.07
	LF+TW	EtOAc	34.47
	LF+TW	<i>n</i> -BuOH	37.05
	LF+TW	H ₂ O	215.19
14. <i>P. geoffrayi</i>	ST	Hexane	1.06
	ST	EtOAc	14.23
	ST	<i>n</i> -BuOH	60.55
	ST	H ₂ O	39.60
15. <i>P. exyphyllus</i>	PX	Hexane	10.43
	PX	EtOAc	8.46
	PX	<i>n</i> -BuOH	20.98
	PX	H ₂ O	63.39
	PX (ครั้งที่ 1)	Hexane	6.57
16. <i>P. acutissima</i>	PX	EtOAc	25.43
	PX	<i>n</i> -BuOH	13.87
	PX	H ₂ O	14.83
17. <i>P. chamaepeuce</i>	PX	Hexane	28.07
	PX	EtOAc	37.63
	PX	<i>n</i> -BuOH	51.96
	PX	H ₂ O	175.48

ตารางที่ 4 (ต่อ)

ชื่อ genus และ species	ส่วนของพืช	ส่วนสกัด	น้ำหนักที่ได้ (g)
18. <i>P. gracilipes</i>	PX	Hexane	13.95
	PX	EtOAc	11.15
	PX	<i>n</i> -BuOH	9.16
	PX	H ₂ O	62.15

5. การสกัดตามลำดับความมีขั้วของตัวทำละลาย (sequential extraction)

เนื่องจากมีตัวอย่างพืชบางสปีชีส์ที่ประกอบด้วยสารที่มีขั้วสูง จึงทำการสกัดแบบ partition ได้ไม่ดี ดังนั้นจึงแช่ในตัวทำละลายตามลำดับความมีขั้ว ผลการสกัดแสดงในตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ผลการสกัดตามลำดับความมีขั้วของตัวทำละลาย (sequential extraction)

ชื่อ genus และ species	น้ำหนักแห้งที่บดละเอียด (kg)	ส่วนของพืช	ส่วนสกัด	เวลาที่แช่สกัดเฉลี่ย (ครั้ง x วัน)	น้ำหนักที่ได้ (g)
6. <i>P. taxodiifolius</i>	4.0	RT (ครั้งที่ 4)	Hexane	7 x 5	75.37
		RT (ครั้งที่ 4)	EtOAc	7 x 6	126.80
		RT (ครั้งที่ 4)	MeOH	7 x 6	145.72
8. <i>P. hullettii</i> ^a	2.3	PX (ครั้งที่ 2)	Hexane	5 x 5	11.0
		PX (ครั้งที่ 2)	EtOAc	5 x 5	24.37
		PX (ครั้งที่ 2)	CH ₂ Cl ₂ : MeOH (1:1)	5 x 7	322.82
		PX (ครั้งที่ 2)	MeOH	5 x 5	44.22
10. <i>P. sikkimensis</i>	10.2	PX (ครั้งที่ 2)	Hexane	5 x 6	52.03
		PX (ครั้งที่ 2)	EtOAc	5 x 6	124.13
		PX (ครั้งที่ 2)	MeOH	5 x 7	694.59
11. <i>P. albidiscus</i> ^b	3.7	LF+TW (ครั้งที่ 2)	Hexane	5 x 5	86.26
		LF+TW (ครั้งที่ 2)	EtOAc	5 x 5	59.12
		LF+TW (ครั้งที่ 2)	Acetone	5 x 5	161.66
		LF+TW (ครั้งที่ 2)	MeOH	5 x 5	155.30
	3.35	ST (ครั้งที่ 2)	Hexane	**	**
		ST (ครั้งที่ 2)	EtOAc	5 x 7	23.19
		ST (ครั้งที่ 2)	Acetone	5 x 8	51.89
		ST (ครั้งที่ 2)	MeOH	5 x 10	94.61
16. <i>P. acutissima</i>	8.6	PX (ครั้งที่ 2)	Hexane	5 x 5	103.20
		PX (ครั้งที่ 2)	EtOAc	7 x 5	104.56
		PX (ครั้งที่ 2)	MeOH	6 x 7	442.96

** ไม่สามารถสกัดแยกได้ด้วย Hexane เนื่องจากไม่ละลาย

^a เก็บซ้ำ เพราะหลังจาก partition เป็น fractions ย่อยแล้ว พบว่ามี cytotoxic activity ในหลาย cell lines

^b มี anti-HIV activity อยู่ในเกณฑ์ดี จึงได้ทำการเก็บซ้ำอีก 2 ครั้งเพื่อศึกษาทางเคมีด้วย

ได้จัดทำมีการทดสอบ cytotoxic activity ของส่วนสกัดย่อยต่าง ๆ ซึ่งได้ผลการทดสอบตามที่ได้แสดงไว้ในตารางที่ 6

ตารางที่ 6 ผลการทดสอบ cytotoxic activity ของส่วนสกัดย่อยต่าง ๆ ของ *Phyllanthus* สปีชีส์ต่าง ๆ

ชื่อ genus และ species	ส่วนของพืช	ส่วนสกัด	EC ₅₀ (μg/mL)					
			Cell Line					
			P-388	KB	Col-2	BCA-1	Lu-1	ASK
1. <i>P. columnaris</i>	LF+TW	Hexane	>20	>20	>20	>20	>20	>20
	LF+TW	EtOAc	>20	>20	>20	>20	>20	>20
	LF+TW	<i>n</i> -BuOH	>20	>20	>20	>20	>20	>20
	LF+TW	H ₂ O	>20	>20	>20	>20	>20	>20
	ST	Hexane	**	**	**	**	**	**
	ST	EtOAc	>20	>20	>20	>20	>20	>20
	ST	<i>n</i> -BuOH	>20	>20	>20	>20	>20	>20
	ST	H ₂ O	>20	>20	>20	>20	>20	>20
	BK	Hexane	**	**	**	**	**	**
	BK	EtOAc	>20	>20	>20	>20	>20	-
	BK	<i>n</i> -BuOH	>20	>20	>20	>20	>20	-
	BK	H ₂ O	>20	>20	>20	>20	>20	-
2. <i>P. milabile</i>	LF+TW	Hexane	17.44	>20	>20	>20	>20	>20
	LF+TW	EtOAc	>20	>20	>20	>20	>20	>20
	LF+TW	<i>n</i> -BuOH	>20	>20	>20	>20	>20	>20
	LF+TW	H ₂ O	>20	>20	>20	>20	>20	>20
	ST	Hexane	>20	>20	>20	>20	>20	-
	ST	EtOAc	>20	>20	>20	>20	>20	-
	ST	<i>n</i> -BuOH	>20	>20	>20	>20	>20	-
	ST	H ₂ O	>20	>20	>20	>20	>20	-
	BK	Hexane	**	**	**	**	**	**
	BK	EtOAc	>20	>20	>20	>20	>20	>20
	BK	<i>n</i> -BuOH	>20	>20	>20	>20	>20	>20
	BK	H ₂ O	>20	>20	>20	>20	>20	>20
3. <i>P. sootepense</i>	PX	Hexane	>20	>20	>20	18.19	>20	-
	PX	EtOAc	>20	>20	>20	>20	>20	-
	PX	<i>n</i> -BuOH	>20	>20	>20	>20	>20	>20
	PX	H ₂ O	>20	>20	>20	>20	>20	>20

**ไม่สามารถสกัดแยกได้ด้วย Hexane เนื่องจากไม่ละลาย จึงไม่มีผลการทดสอบ

หมายเหตุ ค่า EC₅₀ ≤ 20 μg/mL จึงถือว่าแสดง activity, - = ยังไม่ได้ผลการทดสอบ

P-388: murine lymphocytic leukemia, KB: human nasopharyngeal carcinoma, COL-2: human colon cancer, BCA-1: human breast cancer, Lu-1: human lung cancer, ASK: rat glioma

ตารางที่ 6 (ต่อ)

ชื่อ genus และ species	ส่วนของ พืช	ส่วนสกัด	EC ₅₀ (µg/mL)					
			Cell Line					
			P-388	KB	Col-2	BCA-1	Lu-1	ASK
4. <i>P. roseus</i>	LF+TW	Hexane	>20	>20	>20	>20	>20	>20
	LF+TW	EtOAc	>20	>20	>20	>20	>20	>20
	LF+TW	<i>n</i> -BuOH	>20	>20	>20	>20	>20	>20
	LF+TW	H ₂ O	>20	>20	>20	>20	>20	>20
	ST	Hexane	>20	>20	>20	>20	>20	-
	ST	EtOAc	>20	>20	>20	>20	>20	-
	ST	<i>n</i> -BuOH	>20	>20	>20	>20	>20	-
	ST	H ₂ O	>20	>20	>20	>20	>20	-
5. <i>P. collinsae</i>	LF+TW	Hexane	>20	>20	>20	>20	>20	>20
	LF+TW	EtOAc	>20	>20	>20	>20	>20	>20
	LF+TW	<i>n</i> -BuOH	>20	>20	>20	12.05	18.66	>20
	LF+TW	H ₂ O	>20	>20	>20	13.08	>20	>20
	ST	Hexane	>20	>20	>20	>20	>20	>20
	ST	EtOAc	>20	>20	>20	>20	>20	>20
	ST	<i>n</i> -BuOH	>20	>20	>20	>20	11.90	>20
	ST	H ₂ O	>20	>20	>20	>20	>20	>20
6. <i>P. taxodiifolius</i>	PX (ครั้งที่ 1)	Hexane	7.28	<4	5.25	<4	<4	>20
	PX (ครั้งที่ 1)	EtOAc	<4	<4	<4	<4	<4	<4
	PX (ครั้งที่ 1)	<i>n</i> -BuOH	>20	7.94	>20	0.71	8.53	-
	PX (ครั้งที่ 1)	H ₂ O	>20	>20	>20	>20	>20	-
	PX (ครั้งที่ 2)	Hexane	15.78	<4	<4	<4	<4	>20
	PX (ครั้งที่ 2)	EtOAc	<4	<4	<4	<4	<4	<4
	PX (ครั้งที่ 2)	<i>n</i> -BuOH	>20	0.09	12.45	4.88	12.26	>20
	PX (ครั้งที่ 2)	H ₂ O	>20	>20	>20	>20	>20	>20
	RT (ครั้งที่ 3)	Hexane	<4	11.65	7.72	<4	3.89	16.55
	RT (ครั้งที่ 3)	EtOAc	<4	<4	<4	<4	<4	19.17
	RT (ครั้งที่ 3)	<i>n</i> -BuOH	>20	16.92	>20	>20	12.0	>20
	RT (ครั้งที่ 3)	H ₂ O	>20	>20	>20	>20	>20	>20
	RT (ครั้งที่ 4)*	Hexane	7.98	<4	-	10.27	-	15.38
	RT (ครั้งที่ 4)*	EtOAc	-	-	-	-	-	-
	RT (ครั้งที่ 4)*	MeOH	-	-	-	-	-	-

* ทำการสกัดด้วยวิธี sequential extraction

หมายเหตุ ค่า EC₅₀ ≤ 20 µg/mL จึงถือว่าแสดง activity, - = ยังไม่ได้ผลการทดสอบ

P-388: murine lymphocytic leukemia, KB: human nasopharyngeal carcinoma, COL-2: human colon cancer, BCA-1: human breast cancer, Lu-1: human lung cancer, ASK: rat glioma

ตารางที่ 6 (ต่อ)

ชื่อ genus และ species	ส่วนของพืช	ส่วนสกัด	EC ₅₀ (μg/mL)					
			Cell Line					
			P-388	KB	Col-2	BCA-1	Lu-1	ASK
7. <i>P. winitii</i>	PX	Hexane	12.12	19.95	>20	>20	>20	-
	PX	EtOAc	17.36	>20	>20	>20	>20	-
	PX	<i>n</i> -BuOH	>20	>20	>20	>20	>20	-
	PX	H ₂ O	>20	>20	>20	>20	>20	-
8. <i>P. hulletii</i>	PX (ครั้งที่ 1)	Hexane	<4	>20	>20	>20	14.96	-
	PX (ครั้งที่ 1)	EtOAc	<4	>20	12.15	>20	10.96	-
	PX (ครั้งที่ 1)	<i>n</i> -BuOH	14.27	>20	>20	>20	>20	13.63
	PX (ครั้งที่ 1)	H ₂ O	>20	>20	>20	>20	>20	>20
	PX (ครั้งที่ 2)*	Hexane	<4	>20	12.45	9.66	16.52	-
	PX (ครั้งที่ 2)*	EtOAc	<4	<4	<4	<4	>20	8.86
	PX (ครั้งที่ 2)*	CH ₂ Cl ₂ -MeOH (1:1)	18.66	<4	17.45	>20	<4	>20
	PX (ครั้งที่ 2)*	MeOH	>20	16.52	>20	>20	10.68	>20
9. <i>P. pulcher</i>	LF+TW	Hexane	>20	>20	>20	>20	>20	>20
	LF+TW	EtOAc	15.7	>20	>20	>20	>20	>20
	LF+TW	<i>n</i> -BuOH	11.94	>20	>20	>20	>20	>20
	LF+TW	H ₂ O	>20	>20	>20	>20	>20	>20
	ST	Hexane	>20	>20	>20	>20	>20	>20
	ST	EtOAc	>20	>20	>20	>20	>20	>20
	ST	<i>n</i> -BuOH	18.46	>20	>20	>20	11.27	>20
	ST	H ₂ O	>20	>20	>20	>20	>20	>20
10. <i>P. sikkimensis</i>	PX (ครั้งที่ 1)	Hexane	>20	>20	>20	<4	>20	>20
	PX (ครั้งที่ 1)	EtOAc	<4	>20	>20	<4	>20	>20
	PX (ครั้งที่ 1)	<i>n</i> -BuOH	<4	>20	>20	>20	>20	>20
	PX (ครั้งที่ 1)	H ₂ O	>20	>20	>20	>20	>20	>20
	PX (ครั้งที่ 2)*	Hexane	<4	<4	>20	>20	16.62	<4
	PX (ครั้งที่ 2)*	EtOAc	<4	<4	>20	>20	>20	<4
	PX (ครั้งที่ 2)*	MeOH	19.11	>20	>20	>20	>20	11.2
	LF+TW	Hexane	>20	>20	>20	>20	>20	>20
11. <i>P. albidiscus</i>	LF+TW	EtOAc	9.58	>20	>20	17.59	11.11	>20
	LF+TW	<i>n</i> -BuOH	>20	>20	>20	>20	>20	16.74
	LF+TW	H ₂ O	>20	>20	>20	>20	>20	>20
	LF+TW	H ₂ O	>20	>20	>20	>20	>20	>20

* ทำการสกัดด้วยวิธี sequential extraction

หมายเหตุ ค่า EC₅₀ ≤ 20 μg/mL จึงถือว่าแสดง activity, - = ยังไม่ได้ผลการทดสอบ

P-388: murine lymphocytic leukemia, KB: human nasopharyngeal carcinoma, COL-2: human colon cancer, BCA-1: human breast cancer, Lu-1: human lung cancer, ASK: rat glioma

ตารางที่ 6 (ต่อ)

ชื่อ genus และ species	ส่วนของพืช	ส่วนสกัด	EC ₅₀ (µg/mL)					
			Cell Line					
			P-388	KB	Col-2	BCA-1	Lu-1	ASK
11. <i>P. albidiscus</i>	ST	Hexane	17.91	>20	>20	>20	>20	-
	ST	EtOAc	14.74	>20	>20	>20	>20	-
	ST	<i>n</i> -BuOH	>20	>20	>20	>20	>20	-
	ST	H ₂ O	>20	>20	>20	>20	>20	-
12. <i>P. pachyphyllus</i>	LF+TW	Hexane	>20	>20	>20	>20	>20	>20
	LF+TW	EtOAc	>20	>20	>20	>20	>20	>20
	LF+TW	<i>n</i> -BuOH	>20	>20	>20	>20	>20	>20
	LF+TW	H ₂ O	>20	>20	>20	>20	>20	>20
	ST	Hexane	10.28	>20	>20	19.9	>20	>20
	ST	EtOAc	18.85	>20	>20	>20	>20	>20
	ST	<i>n</i> -BuOH	>20	>20	>20	>20	>20	>20
	ST	H ₂ O	>20	>20	>20	>20	>20	>20
13. <i>P. oxyphyllus</i>	PX	Hexane	11.13	>20	18.09	>20	>20	13.74
	PX	EtOAc	>20	>20	>20	>20	>20	>20
	PX	<i>n</i> -BuOH	>20	>20	>20	>20	>20	>20
	PX	H ₂ O	>20	>20	>20	>20	>20	>20
14. <i>P. geoffrayi</i>	LF+TW	Hexane	7.90	>20	>20	>20	>20	>20
	LF+TW	EtOAc	5.84	>20	-	>20	>20	>20
	LF+TW	<i>n</i> -BuOH	>20	>20	-	>20	>20	>20
	LF+TW	H ₂ O	>20	>20	-	>20	>20	>20
	ST	Hexane	12.04	>20	>20	>20	>20	>20
	ST	EtOAc	13.59	7.41	15.23	>20	16.80	>20
	ST	<i>n</i> -BuOH	>20	>20	>20	>20	>20	>20
	ST	H ₂ O	>20	>20	>20	>20	>20	>20
15. <i>P. exyphyllus</i>	PX	Hexane	<4	>20	>20	8.2	>20	>20
	PX	EtOAc	<4	<4	18.05	13.1	>20	>20
	PX	<i>n</i> -BuOH	17.22	>20	>20	>20	>20	>20
	PX	H ₂ O	>20	>20	>20	>20	>20	>20
16. <i>P. acutissima</i>	PX (ครั้งที่ 1)	Hexane	11.31	>20	>20	16.5	>20	>20
	PX (ครั้งที่ 1)	EtOAc	<4	<4	<4	<4	14.13	2.89
	PX (ครั้งที่ 1)	<i>n</i> -BuOH	18.18	14.62	17.62	13.0	>20	>20
	PX (ครั้งที่ 1)	H ₂ O	>20	>20	>20	>20	>20	>20

หมายเหตุ ค่า EC₅₀ ≤ 20 µg/mL จึงถือว่าแสดง activity, - = ยังไม่ได้ผลการทดสอบ
P-388: murine lymphocytic leukemia, KB: human nasopharyngeal carcinoma, COL-2: human colon cancer, BCA-1: human breast cancer, Lu-1: human lung cancer, ASK: rat glioma

ตารางที่ 6 (ต่อ)

ชื่อ genus และ species	ส่วนของพืช	ส่วนสกัด	EC ₅₀ (μg/mL)					
			Cell Line					
			P-388	KB	Col-2	BCA-1	Lu-1	ASK
16. <i>P. acutissima</i>	PX (ครั้งที่ 2)*	Hexane	-	-	-	-	-	-
	PX (ครั้งที่ 2)*	EtOAc	-	-	-	-	-	-
	PX (ครั้งที่ 2)*	MeOH	-	-	-	-	-	-
17. <i>P. chamaepeuce</i>	PX	Hexane	16.01	>20	>20	>20	>20	>20
	PX	EtOAc	15.77	15.97	>20	>20	16.35	14.11
	PX	<i>n</i> -BuOH	>20	>20	>20	>20	>20	>20
	PX	H ₂ O	>20	>20	>20	>20	>20	>20
18. <i>P. gracilipes</i>	PX	Hexane	>20	>20	>20	>20	>20	>20
	PX	EtOAc	>20	>20	>20	>20	>20	>20
	PX	<i>n</i> -BuOH	>20	>20	>20	>20	>20	>20
	PX	H ₂ O	14.99	>20	>20	>20	>20	>20

* ทำการสกัดด้วยวิธี sequential extraction

หมายเหตุ ค่า EC₅₀ ≤ 20 μg/mL จึงถือว่าแสดง activity, - = ยังไม่ได้ผลการทดสอบ

P-388: murine lymphocytic leukemia, KB: human nasopharyngeal carcinoma, COL-2: human colon cancer, BCA-1: human breast cancer, Lu-1: human lung cancer, ASK: rat glioma

จากผลของการทดสอบ cytotoxic activity ของส่วนสกัดย่อยในตารางที่ 6 ปรากฏว่าพืชทั้ง 3 สปีชีส์ยังคงแสดง cytotoxic activity อยู่ในเกณฑ์ดีมากอยู่

นอกจากนี้ยังพบว่า *Phyllanthus* ที่แสดง cytotoxic activity ในส่วนสกัดย่อยต่าง ๆ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก (EC₅₀ < 4 μg/ml) เพิ่มขึ้นอีก 2 สปีชีส์ คือ *Phyllanthus hullettii* และ *Phyllanthus exyphyllus* (ดูตารางที่ 6)

6. การแยกสารองค์ประกอบ และการศึกษาหาโครงสร้างของสารองค์ประกอบของพืชในสกุล

Phyllanthus

เนื่องจากมีพืชในสกุล *Phyllanthus* ที่แสดง cytotoxic activity ในเกณฑ์ดีมาก และได้รับความสนใจจากกลุ่มวิจัยของเราถึง 5 สปีชีส์ จากจำนวน 18 สปีชีส์ที่ได้ศึกษาและทดสอบ cytotoxic activity ในเบื้องต้น

ด้วยเหตุผลที่มีเวลาจำกัดที่จะศึกษาสารองค์ประกอบ จึงไม่สามารถที่จะทำการศึกษาได้ทั้ง 5 สปีชีส์พร้อม ๆ กัน

กลุ่มวิจัยของเราจึงได้เลือกทำการศึกษาย่างลึกใน 2 สปีชีส์ ได้แก่

1. *Phyllanthus taxodiifolius*

2. *Phyllanthus acutissima*

มีอีกสปีชีส์หนึ่งที่ได้ศึกษาไปบ้างแต่ยังไม่สามารถแยกสารได้ คือ *Phyllanthus sikkimensis* ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสารที่ได้ไม่ค่อย stable นัก จะเป็นสีดำและเชื่อว่าถูกออกซิไดซ์ได้ในอากาศ จึงพักการศึกษาสปีชีส์นี้ไว้ก่อน

Phyllanthus hullettii นั้น ได้เก็บพืชมาเพิ่มอีก และอยู่ในขั้นการพัฒนาการสกัด ทั้งนี้เพราะ *Phyllanthus* สปีชีส์นี้มีสารที่ค่อนข้างมีขี้สูง ถ้าสกัดแบบเดิมจะได้ส่วนสกัดออกมาน้อยมาก จึงได้ทำการสกัดพืชสปีชีส์นี้ที่เก็บมาใหม่โดยวิธีการแช่แบบ sequential extraction ด้วย hexane, EtOAc, CH_2Cl_2 :MeOH (1:1) และ MeOH ตามลำดับ สำหรับ *Phyllanthus exyphyllus* ยังไม่ได้ทำการแยกสารองค์ประกอบ แต่ในอนาคตจะได้ทำการศึกษาต่อดังนั้นในรายงานฉบับนี้จะได้รายงานเฉพาะการแยกและการหาโครงสร้างของพืช 2 ชนิดคือ *Phyllanthus taxodiifolius* และ *Phyllanthus acutissima* เท่านั้น

7. การแยกสารองค์ประกอบจากส่วนสกัดของ *Phyllanthus taxodiifolius*

ได้ทำการเก็บพืชสปีชีส์นี้มาทั้งหมด 4 ครั้ง ทั้งหมดมี 4 ตัวอย่าง ได้แก่

1. ส่วนที่อยู่เหนือดิน (aerial part, PX) (1.7 kg)
2. ส่วนที่อยู่เหนือดิน (aerial part, PX) (14.3 kg)
3. ส่วนใต้ดิน (root, RT) (1.7 kg)
4. ส่วนใต้ดิน (root, RT) (4.0 kg)

ได้ทำการศึกษา cytotoxic activity ของพืชสปีชีส์นี้ทุกตัวอย่าง ปรากฏว่าตัวอย่างที่ 1-3 ให้ผลในเกณฑ์ดีมาก แต่ตัวอย่างที่ 4 ยังรอผลการทดสอบอยู่

ได้ทำการแยกสารองค์ประกอบเฉพาะส่วนที่อยู่เหนือดิน (PX) เท่านั้น และได้ทำทั้ง 2 ตัวอย่าง แต่สำหรับตัวอย่างที่ 2 ยังไม่เสร็จดี แต่ก็สามารถแยกสารได้มากขึ้นทั้งจำนวนและปริมาณ ในกรณีของส่วนใต้ดิน (RT) ซึ่งเก็บมาทีหลังนั้นยังไม่ได้ทำการแยกสารองค์ประกอบ

7.1 การแยกสารจากส่วนเหนือดิน (aerial part, PX) ของตัวอย่างที่ 1 ของ *Phyllanthus taxodiifolius*

เนื่องจากส่วนสกัดจาก *Phyllanthus taxodiifolius* นั้น แสดงค่า cytotoxic activity อยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งในส่วนสกัดจากเมทานอล และส่วนสกัดย่อยต่าง ๆ กลุ่มวิจัยของเราจึงได้เลือกทำการศึกษาอย่างละเอียดในส่วนสกัดจากพืชนี้ในขั้นต้นได้นำส่วนสกัด (จากการเก็บพืชครั้งที่ 1) ที่เหลือจากการทดสอบมาทำการแยกสารองค์ประกอบก่อน

- การแยกสารองค์ประกอบจากส่วนสกัด hexane ของ *Phyllanthus taxodiifolius* (ตัวอย่างที่ 1)

ได้นำส่วนสกัด hexane (11.4 g) มาแยกด้วย column chromatography โดยใช้ silica gel เป็น stationary phase โดยเริ่ม elute ด้วย pure hexane เพิ่ม % ของ ethyl acetate ไปเรื่อย ๆ จนถึง pure ethyl acetate แล้วค่อย ๆ เพิ่ม % ของ methanol ใน ethyl acetate ไปจนถึง pure methanol ได้ทำการเก็บสารละลายที่ออกจาก column ที่ละ 500 mL นำแต่ละส่วนที่เก็บไประเหยแห้งด้วย rotary evaporator แล้วรวมส่วนสกัดที่แสดง TLC คล้าย ๆ กันเข้าเป็น fractions ต่าง ๆ ปรากฏว่ารวมได้ 9 fractions ได้จัดให้มีการทดสอบ cytotoxic activity ของ fractions ต่าง ๆ ได้ผลตามที่แสดงในตารางที่ 7

ตารางที่ 7 ผล cytotoxic activity ของ fractions จากส่วนสกัด hexane ที่ผ่านการแยก column chromatography ครั้งแรกแล้ว


Fraction	EC ₅₀ (μg/mL)					
	Cell Line					
	P-388	KB	Col-2	BCA-1	Lu-1	ASK
F1	>20	>20	>20	>20	>20	-
F2	>20	>20	>20	>20	>20	-
F3	>20	>20	>20	>20	>20	-
F4	>20	>20	>20	>20	>20	-
F5	>20	>20	>20	>20	>20	-
F6	11.77	>20	>20	>20	>20	-
F7	11.64	12.97	15.92	18.21	15.66	-
F8	<4	<4	<4	<4	<4	-
F9	9.07	<4	6.17	<4	<4	-

หมายเหตุ ค่า EC₅₀ ≤ 20 μg/mL จึงถือว่าแสดง activity, - = ยังไม่ได้ผลการทดสอบ

P-388: murine lymphocytic leukemia, KB: human nasopharyngeal carcinoma, COL-2: human colon cancer, BCA-1: human breast cancer, Lu-1: human lung cancer, ASK: rat glioma


กลุ่มวิจัยของเราสามารถแยกสารจากส่วนสกัดเฮกเซนได้ 3 ตัว (สาร 1-3) จาก fractions F2, F4 และ F8 ตามลำดับ ดังแสดงในแผนผังที่ 2

แผนผังที่ 2




CC = column chromatography


กลุ่มวิจัยได้ทำการพิสูจน์โครงสร้างโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ทางสเปกโทรสโกปี และโดยการเปรียบเทียบ ข้อมูลกับที่มีผู้รายงานมาก่อน พบว่าสารทั้งสามตัวมีโครงสร้างดังแสดงข้างล่าง



Glochidone (1)



Glochidonol (2)



Cleistanthin A methyl ether (3)

- การแยกสารองค์ประกอบจากส่วนสกัด ethyl acetate ของ *Phyllanthus taxodiifolius* (ตัวอย่างที่ 1)

ได้นำส่วนสกัด ethyl acetate (15.6 g) มาแยกด้วย column chromatography โดยใช้ silica gel เป็น stationary phase โดยเริ่ม elute ด้วย pure hexane เพิ่ม % ของ ethyl acetate ไปเรื่อย ๆ จนถึง pure ethyl acetate แล้วค่อย ๆ เพิ่ม % ของ methanol ใน ethyl acetate ไปจนถึง pure methanol ได้ทำการเก็บสารละลายที่ออกจาก column ทีละ 500 mL นำแต่ละส่วนที่เก็บไประเหยแห้งด้วย rotary evaporator แล้วรวมส่วนที่แยกได้ทีละ TLC คล้าย ๆ กันเข้าเป็น fraction เดียวกัน ปรากฏว่ารวมได้ 6 fractions ได้จัดให้มีการทดสอบ fractions ต่าง ๆ จาก column นี้ ได้ผลตามที่แสดงในตารางที่ 8


ตารางที่ 8 ผล cytotoxic activity ของ fractions จากส่วนสกัด ethyl acetate ที่ผ่านการแยก column chromatography ครั้งแรกแล้ว

Fraction	EC ₅₀ (μg/mL)					
	Cell Line					
	P-388	KB	Col-2	BCA-1	Lu-1	ASK
F1	>20	>20	>20	>20	>20	>20
F2	11.7	>20	>20	>20	>20	>20
F3	>20	>20	>20	>20	>20	>20
F4	<4	<4	<4	<4	<4	<4
F5	<4	<4	<4	<4	<4	<4
F6	>20	>20	>20	<4	<4	17.73


หมายเหตุ ค่า EC₅₀ ≤ 20 μg/mL จึงถือว่าแสดง activity, - = ยังไม่ได้ผลการทดสอบ

P-388: murine lymphocytic leukemia, KB: human nasopharyngeal carcinoma, COL-2: human colon cancer, BCA-1: human breast cancer, Lu-1: human lung cancer, ASK: rat glioma


กลุ่มวิจัยของเราสามารถแยกสารได้จากส่วนสกัด ethyl acetate 3 ตัว ได้แก่ Glochidonol (2 จาก F3) Cleistanthin A (4 จาก F5) และ Cleistanthoside A (5 จาก F6) ดังแสดงในแผนผังที่ 3




CC = column chromatography



Glochidonol (2)



Cleistanthin A (4)




Cleistanthoside A (5)

- การแยกสารองค์ประกอบจากส่วนสกัด *n*-butanol ของ *Phyllanthus taxodiifolius* (ตัวอย่างที่ 1)

เนื่องจากกลุ่มวิจัยได้พบว่าส่วนสกัด *n*-butanol นั้นแสดง cytotoxic activity เช่นกัน จึงได้ทำการแยกสารจากส่วนสกัดนี้ด้วย แต่ว่าพบอุปสรรคมากมาย เนื่องมาจากส่วนสกัดนี้ประกอบด้วยสารที่มีขั้วสูง มักจะติด column ทำให้ได้ส่วนแยกในแต่ละ fraction เป็นปริมาณน้อย จึงไม่ได้ทำการทดสอบ cytotoxic activity ของแต่ละ fraction ที่ได้จาก column chromatography แต่ได้ทำการแยกบาง fraction ที่สามารถจะทำต่อได้ อย่างไรก็ตามสามารถแยกสาร lignan glycoside ออกมาได้อีก 1 ตัว คือสาร 6 จาก F5 เพียง 14.6 mg ดังแสดงในแผนผังที่ 4

แผนผังที่ 4




CC = column chromatography

เนื่องจากสาร 6 มีปริมาณน้อย ไม่เพียงพอต่อการเก็บข้อมูลทางสเปกโทรสโคปีได้เต็มที่ จึงได้เก็บข้อมูลทางสเปกโทรสโคปีบางอย่างไปบ้าง ซึ่งยังไม่สามารถที่จะหาโครงสร้างได้ แต่ได้ทำการทดสอบ cytotoxic activity ไปแล้ว โดยที่คาดหวังว่าจะแยกสารตัวนี้ได้จากส่วนสกัดของพืชที่เก็บครั้งที่ 2

7.2 การแยกสารจากส่วนเหนือดิน (aerial part, PX) ของตัวอย่างที่ 2 ของ *Phyllanthus taxodiifolius*

เนื่องจากสารบางตัวที่แยกจากตัวอย่างพืชที่ 1 ของ *Phyllanthus taxodiifolius* มีปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อการศึกษาหาโครงสร้างอย่างสมบูรณ์ และไม่เพียงพอต่อการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพในระดับลึกลงไปอีก จึงได้ทำการสกัด *Phyllanthus taxodiifolius* ที่เก็บมาครั้งที่ 2 ด้วย MeOH ตามรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 2 ได้ส่วนสกัด MeOH 834.9 g ได้แบ่งไปทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้นเล็กน้อย ที่เหลือนำไปทำ partition ต่อด้วยตัวทำละลายที่มีขั้วต่ำกว่า ได้ผลการสกัดตามที่แสดงไว้ในแผนผังที่ 5

แผนผังที่ 5




ผลการทดสอบ cytotoxic activity ของส่วนสกัดย่อยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตามที่แสดงไว้ก่อนแล้วในตารางที่ 6

- การแยกสารองค์ประกอบจากส่วนสกัด hexane ของ *Phyllanthus taxodiifolius* (ตัวอย่างที่ 2)


ได้นำส่วนสกัด hexane (230.02 g) มาแยกด้วย column chromatography โดยใช้ silica gel เป็น stationary phase โดยเริ่ม elute ด้วย pure hexane เพิ่ม % ของ dichloromethane ไปเรื่อย ๆ จนถึง pure dichloromethane แล้วค่อย ๆ เพิ่ม % ของ methanol ใน dichloromethane ไปจนถึง pure methanol ได้ทำการเก็บสารละลายที่ออกจาก column ที่ละ 500 mL นำแต่ละส่วนที่เก็บไประเหยแห้งด้วย rotary evaporator แล้วรวมส่วนสกัดที่แสดง TLC คล้าย ๆ กันเข้าเป็น fractions ต่าง ๆ ปรากฏว่ารวมได้ 4 fractions ตามที่ได้แสดงไว้ในแผนผังที่ 6

แผนผังที่ 6




CC = column chromatography


จาก fraction F2 สามารถแยกสารได้ 4 ตัว ได้แก่ Cleistanthin methyl ether (3), Cleistanthin A (4), *N*-benzoylphenylalaninyl-*N*-benzoylphenylalaninate (7) และ *N*-benzoylphenylalaninoyl-phenylalaninol acetate (8) ซึ่งมีโครงสร้างดังแสดงข้างล่าง




Cleistanthin A methyl ether (3)



Cleistanthin A (4)



N-benzoylphenylalaninyl-*N*-benzoylphenylalaninate (7)




N-benzoylphenylalaninoyl-phenylalaninol acetate (8)

สาร 3 และ 4 แยกได้มาก่อนใน batch ที่เก็บครั้งที่ 1 แต่สาร 7 และ 8 ยังไม่เคยได้มาก่อนเลย แต่ก็ เป็นสารที่ known สำหรับการแยก F1, F3 และ F4 ยังอยู่ระหว่างดำเนินการต่อไป



- การแยกสารองค์ประกอบจากส่วนสกัด EtOAc ของ *Phyllanthus taxodiifolius* (ตัวอย่างที่ 2)


ได้นำส่วนสกัด EtOAc (158.8 g) มาแยกด้วย column chromatography โดยใช้ silica gel เป็น stationary phase โดยเริ่ม elute ด้วย pure hexane แล้วค่อย ๆ เพิ่ม % ของ dichloromethane ไปเรื่อย ๆ จนถึง pure dichloromethane แล้วค่อย ๆ เพิ่ม % ของ methanol ใน dichloromethane ไปจนถึง pure methanol ได้ทำการเก็บสารละลายที่ออกจาก column ทีละ 500 mL นำแต่ละส่วนที่เก็บไประเหยแห้งด้วย rotary evaporator แล้วรวมส่วนสกัดที่แสดง TLC คล้าย ๆ กันเข้าเป็น fractions ต่าง ๆ ปรากฏว่ารวมได้ 12 fractions หลังจากทำการแยกด้วยวิธี recrystallization หรือ column chromatography ตามด้วย recrystallization แล้ว สามารถแยกสารได้ 4 ตัว ได้แก่ Glochidone (1) จาก F4, Cleistanthin A (4) จาก F9, Taxodiifoloside (9) กับ Cleistanthoside A (5) จาก F10 และ Cleistanthoside A (5) จาก F11 ตามที่ได้แสดงไว้ในแผนผังที่ 7 และมีโครงสร้างดังแสดงข้างล่าง

Taxodiifoloside (9) เป็นสารใหม่ที่ยังไม่มีใครรายงานมาก่อน มีโครงสร้างเป็น monoacetate ของ Cleistanthoside A (5)




CC = column chromatography





Cleistanthoside A (5)




Taxodiifolioside (9)


- การแยกสารองค์ประกอบจากส่วนสกัด *n*-butanol ของ *Phyllanthus taxodiifolius* (ตัวอย่างที่ 2)

ได้นำส่วนสกัด *n*-butanol (112.8 g) มาแยกด้วย column chromatography โดยใช้ silica gel เป็น stationary phase โดยเริ่ม elute ด้วย pure CH_2Cl_2 แล้วค่อย ๆ เพิ่ม % ของ MeOH ไปเรื่อย ๆ จนถึง 30% MeOH- CH_2Cl_2 แล้วสุดท้ายใช้ pure MeOH ได้ทำการเก็บสารละลายที่ออกจาก column ทีละ 500 mL นำแต่ละส่วนที่เก็บไประเหยแห้งด้วย rotary evaporator แล้วรวมส่วนสกัดที่แสดง TLC คล้าย ๆ กันเข้าเป็น fractions ต่าง ๆ ปรากฏว่ารวมได้ 6 fractions หลังจากทำการแยกต่อด้วยวิธี column chromatography ตามด้วย recrystallization แล้วสามารถแยกสารได้ 3 ตัว ได้แก่ cleistanthin A (4) กับ 4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid (10) จาก F3 และ cleistanthoside A (5) จาก F4 ดังแสดงในแผนผังที่ 8


แผนผังที่ 8




CC = column chromatography



Cleistanthin A (4)



Cleistanthoside A (5)




4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid (10)

8. การพิสูจน์โครงสร้างของสารองค์ประกอบที่บริสุทธิ์จาก *Phyllanthus taxodiifolius*

ได้ทำการพิสูจน์โครงสร้างของสารบริสุทธิ์ที่แยกได้จาก *Phyllanthus taxodiifolius* โดยใช้ข้อมูลทางสเปกโตรสโกปีประกอบการพิจารณา

Physical data ของสารที่บริสุทธิ์จาก *Phyllanthus taxodiifolius*

Compound 1 (Glochidone)



Glochidone (1)

$C_{30}H_{48}O$


colourless needles from CH_2Cl_2 -MeOH, m.p. 166.0–166.6 °C [Lit.¹ 164–165 °C, $CHCl_3$ -MeOH, Lit.² 163–164 °C, $CHCl_3$ -MeOH]

$[\alpha]_D^{30} +72.38^\circ$ (c 0.1 $CHCl_3$) [Lit. $[\alpha]_D^{24} +73.41^\circ$ (c 2.0, $CHCl_3$)]


FT-IR ($CHCl_3$): ν_{max} 1662 (C=O), 1457, 1382, 1284, 1161, 1103, 947, 888, 826 cm^{-1}

EIMS m/z (rel. int.): 422 $[M]^+$ (20), 229 (69), 203 (34), 191 (53), 175 (23), 161 (35), 150 (100), 137 (73), 121 (45), 109 (58), 95 (75), 83 (97), 69 (30), 55 (17)

1H NMR ($CDCl_3$, 500 MHz) and ^{13}C NMR ($CDCl_3$, 125 MHz): ตารางที่ 9

Compound 2 (Glochidonol)

Glochidonol (2)



colourless needles from CH_2Cl_2 -MeOH, m.p. 223.2–224.1 °C [Lit.³ 228–230 °C, benzene]

$[\alpha]_{589}^{30} : +45.1^\circ$ (c 0.1, $CHCl_3$) [Lit. $[\alpha]_D +46.0^\circ$ (c 1.0, $CHCl_3$)]

FT-IR (KBr) $\nu_{max} = 3422$ (OH), 1713 (C=O), 1641, 1459, 1381, 1346, 1287, 1253, 1238, 1208, 1144, 1110, 1089, 1074, 1025, 1009, 985, 949, 918, 882, 859 cm^{-1}

EIMS m/z (rel. int.): 440 $[M]^+$ (0.7), 422 (5), 327 (3), 229 (9), 203 (6), 189 (6), 175 (4), 161 (5), 147 (7), 135 (10), 121 (18), 114 (100), 107 (18), 95 (17), 82 (12), 70 (10), 56 (7)

1H NMR ($CDCl_3$, 500 MHz) and ^{13}C NMR ($CDCl_3$, 125 MHz): ดูตารางที่ 9

Glochidone (1) และ Glochidonol (2) เป็นสารที่ known และพบในพืชทั้งในสกุล *Glochidion*¹⁻³ และ *Phyllanthus*⁴ มาก่อน นอกจากนี้ยังพบเป็น metabolites ของ bird's nest fungi อีกด้วย⁵

ตารางที่ 9 300 MHz ^1H - และ 75 MHz ^{13}C -NMR data ของสาร 1 และ 2 ใน CDCl_3


Position	δ_{H}		δ_{C}	
	1	2	1	2
1	7.10 (d, 10.2)	3.90 (m)	159.87	79.58
2	5.79 (d, 10.2)	a) 2.22 (dd, 14.4, 8.1) b) 3.01 (dd, 14.4, 3.5)	125.14	45.08
3	-	-	205.55	215.97
4	-	-	43.63	47.11
5	1.56 (obsc.)	1.34 (obsc.)	53.42	51.30
6	1.52 (obsc.)	1.57 (obsc.)	19.01	19.59
7	a) 1.48 (obsc.) b) 1.54 (obsc.)	1.44 (obsc.)	33.75	32.88
8	-	-	41.74	41.10
9	1.53 (obsc.)	1.52 (obsc.)	44.42	50.65
10	-	-	39.54	42.88
11	a) 1.38 (obsc.) b) 1.63 (obsc.)	a) 1.35 (obsc.) b) 1.84 (obsc.)	21.23	22.98
12	a) 1.12 (obsc.) b) 1.76 (obsc.)	a) 1.12 (obsc.) b) 1.71 (obsc.)	25.08	25.11
13	1.73 (obsc.)	1.71 (obsc.)	38.21	37.93
14	-	-	43.00	42.92
15	a) 1.01 (obsc.) b) 1.69 (obsc.)	a) 1.05 (obsc.) b) 1.69 (obsc.)	27.36	27.46
16	a) 1.39 (obsc.) b) 1.53 (obsc.)	a) 1.36 (obsc.) b) 1.50 (obsc.)	35.48	35.48
17	-	-	43.09	42.93
18	1.39 (obsc.)	1.38 (obsc.)	48.14	48.21
19	2.40 (ddd, 11.1, 11.1, 5.7)	2.38 (ddd, 11.0, 11.0, 5.7)	47.88	47.90
20	-	-	150.74	150.72
21	a) 1.30 (obsc.) b) 1.92 (obsc.)	a) 1.33 (obsc.) b) 1.92 (obsc.)	29.79	29.74
22	a) 1.19 (obsc.) b) 1.39 (obsc.)	a) 1.20 (obsc.) b) 1.41 (obsc.)	39.96	39.94
23	1.13 (s)	1.06 (s)	27.79	27.94
24	1.08 (s)	1.04 (s)	21.41	19.81
25	1.07 (s)	0.83 (s)	19.19	11.81
26	1.11 (s)	1.06 (s)	16.45	15.92
27	0.96 (s)	0.98 (s)	14.42	14.42
28	0.81 (s)	0.80 (s)	18.03	18.01
29	a) 4.58 (d, 1.5) b) 4.70 (d, 2.3)	a) 4.57 (d, 1.4) b) 4.68 (d, 2.2)	109.49	109.46
30	1.69 (s)	1.68 (s)	19.32	19.25

หมายเหตุ Chemical shifts given in ppm using TMS as internal reference; multiplicities and coupling constants (Hz) are given in parentheses; obsc. = obscured signals.


ข้อมูลทาง Nuclear magnetic resonance spectroscopy ตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 9 ซึ่ง ^{13}C -NMR spectral data นั้นมีค่าใกล้เคียงกับค่าที่ระบุใน literature⁵

การ assign ค่า chemical shifts ของ protons และ carbons ที่ตำแหน่งต่าง ๆ นั้น ทำได้โดยอาศัยข้อมูลจาก 2D-NMR spectra (COSY, HMQC และ HMBC) นอกจากนี้ stereochemistry ของสารนั้น assign ได้โดยอาศัยข้อมูลจาก NOE enhancement experiments

Compound 3 (Cleistanthin A methyl ether)



Cleistanthin A methyl ether (3)



white powder from EtOH, m.p. 211–215 °C [Lit.⁶ 214–215 °C, ether petroleum ether]

$[\alpha]_{\text{D}}^{27} : -50^\circ$ (c 1.0, CHCl_3)

FT-IR (KBr): $\nu_{\text{max}} = 1760$ (C=O ของ γ -lactone), 1624 and 1508 , 1479, 1456, 1434, 1391, 1336, 1265, 1231, 1215, 1169, 1097, 1061, 1039, 1007, 982, 932 (methylenedioxy), 865 cm^{-1}


UV (EtOH): λ_{max} (log ϵ) = 221 (4.56), 258 (4.93), 292 (4.22), 314 (4.22), 349 (3.91) nm

EIMS m/z (rel. int.): 380 (M^+ -sugar)(100), 351(3), 321 (7), 293 (13), 143 (18), 111 (13), 102 (7), 75 (17).


HRMS m/z (rel. int.): รวบรวมการวัด

^1H NMR (CDCl_3 , 500 MHz) and ^{13}C NMR (CDCl_3 , 125 MHz): ดูตารางที่ 10

Compound 4 (Cleistanthin A)



Cleistanthin A (4)



white powder from EtOH, m.p. 140–141.3 °C [Lit.⁶ 135–136 °C MeOH]

$[\alpha]_{\text{D}}^{27} : -69.6^\circ$ (c 1.02, CHCl_3) [Lit. $[\alpha]_{\text{D}} -67.2^\circ$ (CHCl_3)]

FT-IR (KBr): $\nu_{\text{max}} = 3481, 1742$ (C=O ของ lactone), 1623, 1593, 1509, 1479, 1453, 1433, 1390, 1370, 1354, 1337, 1327, 1265, 1235, 1215, 1195, 1173, 1157, 1108, 1087, 1036, 1009, 991, 952, 935, 917, 885, 867, 841, 816, 786, 772 cm^{-1}

UV (EtOH): λ_{max} (log E) = 221 (4.50), 258 (4.89), 292 (4.17), 313 (4.19), 348 (3.86) nm

EIMS m/z (rel. int.): 380 (M^+ -sugar)(100), 362 (2), 351 (4), 335 (4), 321 (7), 293 (13), 229 (4), 69 (2)

HRMS m/z (rel. int.): รวบรวมการวัด

^1H NMR (CDCl_3 , 500 MHz) and ^{13}C NMR (CDCl_3 , 125 MHz): ดูตารางที่ 10

สาร 3 และ 4 เป็นสารที่มีผู้รายงานมาก่อนจาก *Cleistanthus collinus*⁶⁻⁸ และ *Cleistanthus petulus*⁹⁻¹⁰

แม้ว่า ^1H - และ ^{13}C -NMR data ใน literature จะใกล้เคียงกับ data ของเราก็ดังนั้น แต่ว่าการ assign chemical shift แตกต่างกันไปบ้าง ซึ่งกลุ่มวิจัยได้พยายาม assign โดยใช้ 2D-NMR data เข้าช่วย จึงสามารถทำการ assign chemical shifts ต่าง ๆ ได้ ซึ่งกลุ่มวิจัยคิดว่าน่าจะถูกต้องมากกว่าใน literature ซึ่งการ assign chemical shifts ทำโดยไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการ correlations จาก 2D-NMR spectra

ข้อมูลจาก IR, ^1H NMR และ ^{13}C NMR สนับสนุนว่าสาร 3 และ 4 เป็นสารจำพวก 1-arylnaphthalide lignans¹¹ ตารางที่ 10 แสดง ^1H - และ ^{13}C -NMR data ของสาร 3 และ 4 ใน CDCl_3 ข้อสังเกตจาก ^{13}C -NMR data จะเห็นว่าทั้งสาร 3 และ 4 นั้น แสดง chemical shifts ที่บาง carbons เป็น 2 ค่า¹² ทั้งนี้เคยมีผู้รายงานว่า เกิดขึ้นเนื่องจาก hindered rotation รอบ $\text{C1}-\text{C1}'$ ซึ่งแต่ละ signal นั้นพิสูจน์ได้จาก 2D-NMR data คือใช้ HMQC ซึ่งแสดง direct correlations ของ carbon และ proton ที่จับกันโดยตรง

การ assign ค่า chemical shifts ของ protons และ carbons ที่ตำแหน่งต่าง ๆ นั้น ทำได้โดยอาศัยข้อมูลจาก 2D-NMR spectra (COSY, HMQC และ HMBC) และจากค่า coupling constant ของ protons บนวงของ น้ำตาลทำให้สามารถยืนยัน stereochemistry ของ หมู่ OH และ OMe บนวงของ sugar ตารางที่ 11 แสดง HMBC correlations ของสาร 3 และ 4

ตารางที่ 10 แสดง 500 MHz ^1H - และ 125 MHz ^{13}C -NMR data ของสาร 3 และ 4 ใน CDCl_3


Position	δ_{H}		δ_{C}	
	3	4	3	4
1	-	-	136.37	135.86, 135.85
1a	-	-	130.79	130.63
2	-	-	119.21	119.13
2a	-	-	169.74	169.79
3	-	-	130.95, 130.93	128.90, 128.85
3a	5.510, 5.505 (d each, 1H, 15.0 Hz) 5.424, 5.420 (d each, 1H, 15.0 Hz)	5.514, 5.510 (d each, 1H, 14.8 Hz) 5.444, 5.540 (d each, 1H, 14.8 Hz)	67.28	67.29
4	-	-	144.29	144.07
4a	-	-	127.02	126.79
5	7.85 (s, 1H)	7.93 (s, 1H)	100.64	100.99
6	-	-	151.92	151.774, 151.767
7	-	-	150.15	150.14
8	7.10 (s, 1H)	7.08 (s, 1H)	106.27	106.03
1'	-	-	128.32	128.35
2'	6.83 (obsc., 1H)	6.84 (d, 1H, 1.6 Hz)	110.67	110.68
3' and 4'	-	-	147.47	147.42, 147.41
5'	6.97 (d, 1H, 8.1 Hz)	6.96 (d, 1H, 7.8 Hz)	108.13	108.13
6'	6.80 (obsc., 1H)	6.81 (dd, 1H, 7.8, 1.6 Hz)	123.57, 123.53	123.55
7'	6.098, 6.096 (d each, 1H, 1.5 Hz) 6.052, 6.049 (d each, 1H, 1.5 Hz)	6.10 (d, 1H, 1.3 Hz) 6.05 (d, 1H, 1.3 Hz)	101.18	101.18
1''	4.76 (d, 1H, 7.6 Hz)	5.049, 5.043 (d each, 1H, 5.6 Hz)	105.10	103.42, 103.39
2''	3.41 (dd, 1H, 8.6, 7.6 Hz)	3.93 (m, 1H)	83.45	71.08, 71.04
3''	3.23 (t, 1H, 8.6 Hz)	3.39, 3.38 (t each, 7.0 Hz)	85.47	82.07, 82.02
4''	3.39 (ddd, 9.8, 8.6, 5.2 Hz)	3.48 (ddd, 1H, 7.0, 7.0, 3.7 Hz)	79.34	78.18, 78.16
5''(1)	4.027, 4.025 (dd each, 11.8, 5.2 Hz)	4.12 (dd, 12.0, 3.7 Hz)	63.43	61.61, 61.59
5''(2)	3.06 (dd, 11.4, 10.2 Hz)	3.359, 3.356 (dd each, 1H, 12.0, 7.0 Hz)	-	-
6-OMe	4.08 (s, 3H)	4.06 (s, 3H)	56.07	56.17
7-OMe	3.81 (s, 3H)	3.81 (s, 3H)	55.79	55.77
2''-OH	-	3.258, 3.247 (br d each, 1H)	-	-
2''-OMe	3.84 (s, 3H)	-	61.21	-
3''-OMe	3.69 (s, 3H)	3.69 (s, 3H)	60.67	60.04, 60.02
4''-OMe	3.50 (s, 3H)	3.50 (s, 3H)	58.70	57.93

หมายเหตุ Chemical shifts given in ppm using TMS as internal reference; multiplicities and coupling constants (Hz) are given in parentheses; 1'', 2'', 3'', 4'' and 5'' are positions on the sugar ring.


ตารางที่ 11 HMBC correlations observed ของสาร 3 และ 4 ใน CDCl_3

3		4	
C	correlated H		correlated H
1	5, 8, 2', 6'	5, 8, 2', 6'	
1a	5, 8	5, 8	
2	3a	3a	
2a	3a	3a	
3	3a	3a	
3a	-	-	
4	3a, 5, 8, 1"	5, 8, 3a, 1"	
4a	3a, 5, 8	5, 8, 3a	
5	8, 6-OMe	8, 6-OMe	
6	5, 8, 6-OMe	5, 8, 6-OMe	
7	5, 8, 7-OMe	5, 8, 7-OMe	
8	5, 7-OMe	5, 7-OMe	
1'	5'	5'	
2'	6'	5', 6'	
3' and 4'	2', 5', 6', 7'	2', 5', 6', 7'	
5'	-	2'	
6'	2'	2'	
7'	-	-	
1"	2", 5"(a), 5"(b)	2", 3", 5"(a), 5"(b)	
2"	1", 3", 2"-OMe	1", 3"	
3"	1", 2", 4", 5"(a), 5"(b), 3"-OMe	1", 2", 4", 5"(a), 5"(b), 3"-OMe	
4"	2", 3", 5"(a), 5"(b), 4"-OMe	2", 3", 5"(a), 5"(b), 4"-OMe	
5"	1", 3", 4"	1", 3", 4"	
6-OMe	-	-	
7-OMe	-	-	
2"-OMe	2"	-	
3"-OMe	3"	3"	
4"-OMe	4"	4"	

Compound 5 (Cleistanthoside A)



Cleistanthoside A (5)



white powder from EtOH, m.p. 237–240 °C [Lit.¹⁰ 238–241 °C from MeOH]

$[\alpha]_{589}^{26} -5.7^\circ$ (c 1.0, MeOH) [Lit.¹⁰ $[\alpha]_D -7.3^\circ$, (c 1.04, dioxane)]

FT-IR (KBr): $\nu_{\max} = 3449$ (O-H), 1759 (C=O lactone), 1624, 1508, 1481, 1457, 1436, 1390, 1340, 1265, 1230, 1215, 1193, 1169, 1121, 1073, 1038, 1004, 932, 865, 812, 793, 770, 730 cm^{-1}

UV (MeOH): $\lambda_{\max}$ (log ϵ) = 220 (3.20), 258 (4.58), 292 (3.85), 313 (3.88), 348 (3.55)


EIMS m/z (rel. int.): 380 (M^+ -sugar)(100), 351 (9), 335 (8), 306 (6), 321 (17), 293 (36), 263 (6), 160 (9), 130 (5), 102 (8), 59 (10)

HRMS m/z (rel. int.): รอยผลการวัด


สาร 5 เป็นสาร known มีชื่อว่า cleistanthoside A แยกได้จาก heartwood ของ *Cleistanthus patulus* Muell.¹⁰

เนื่องจาก resolution ของ ^1H NMR spectrum ไม่ว่าจะ record ใน solvent ใด ๆ ไม่ดีนัก จึงได้เตรียมเป็นอนุพันธ์ tetraacetate (5a) แล้ววิเคราะห์โครงสร้างของ 5 ผ่าน 5a แทน การหาโครงสร้างของสาร 5 นั้น ทำได้จากวิเคราะห์ข้อมูลจาก ^1H NMR, ^{13}C NMR, DEPT, COSY, HMQC HMBC และ NOESY spectra ของอนุพันธ์ tetraacetate 5a ซึ่งการ assign ^1H และ ^{13}C signals ต่าง ๆ เป็นดังแสดงในตารางที่ 12

Compound 5a (Cleistanthoside A tetraacetate)



Cleistanthoside A tetraacetate (5a)



white powder from MeOH, m.p. 136.5–138.1 °C [Lit.¹⁰ 136–139 °C]

$[\alpha]_{589}^{27} -35.0^\circ$ (c 1.0, CHCl_3) [Lit.¹⁰ $[\alpha]_D -25.1^\circ$ (c 1.0, CHCl_3)]

FT-IR (KBr): $\nu_{\max} = 1759$ (broad C=O of lactone and C=O of acetate), 1623, 1509, 1481, 1457, 1436, 1369, 1344, 1264, 1229, 1169, 1120, 1062, 1038, 932, 908, 868, 841, 812, 793, 770 cm^{-1}

FT-IR (CHCl_3): $\nu_{\max} = 1756$ (broad C=O of lactone and C=O of acetate), 1623,, 1599, 1507, 1482, 1456, 1435, 1369, 1337, 1263, 1168, 1120, 1097, 1063, 1041, 1014, 936, 909, 868, 841 cm^{-1}


UV (EtOH): $\lambda_{\max}$ (log ϵ) = 222 (4.25), 258 (4.64), 291 (3.92), 311 (3.93), 348 (3.61) nm

HR-MS: รอยผลการวัด

^1H NMR (CDCl_3 , 500 MHz) and ^{13}C NMR (CDCl_3 , 125 MHz): ดูตารางที่ 12

Cleistanthoside A tetraacetate (5a) เป็น known ซึ่งมีผู้รายงานว่าเตรียมขึ้นได้จาก Cleistanthoside A (5)¹⁰

Compound 9 (Taxodiifoloside, New compound)



Taxodiifoloside (9)

$\text{C}_{36}\text{H}_{40}\text{O}_{17}$

white powder from EtOAc-hexane, m.p. 142.3–143.1°C

$[\alpha]_{\text{D}}^{25} -34^\circ$ (c 0.5, CHCl_3)

FT-IR (KBr): ν_{max} = 3419, 1756 (C=O of lactone), 1742 (C=O of acetate), 1623, 1507, 1482, 1456, 1437, 1386, 1345, 1264, 1230, 1216, 1169, 1076, 1037, 1008, 930, 871, 841, 812, 793, 770 cm^{-1}

UV (EtOH): λ_{max} (log ϵ) = 223 (3.92), 258 (4.31), 294 (3.67), 314 (3.70), 349 (3.46)

HR-MS m/z (rel. int.): รวบรวมการวัด

^1H NMR (CDCl_3 , 500 MHz) and ^{13}C NMR (CDCl_3 , 125 MHz): ดูตารางที่ 12

ตารางที่ 12 500 MHz ^1H - และ 125 MHz ^{13}C -NMR data ของสาร 5-tetraacetate และ 9 ใน CDCl_3

Position	δ_{H}		δ_{C}	
	5a	9	5a	9
1	-	-	136.20	136.42
1a	-	-	130.75	130.76, 130.70
2	-	-	119.19	119.13
2a	-	-	169.66	169.74
3	-	-	130.62, 130.58	130.81
3a	5.53 (d, 1H, 15.0 Hz) 5.439, 5.432 (d each, 1H, 15.0 Hz)	5.557, 5.556 (d each, 1H, 15.0 Hz) 5.424, 5.418 (d each, 1H, 15.0 Hz)	67.30	67.28
4	-	-	143.96, 143.94	143.72
4a	-	-	126.86, 126.84	126.86
5	7.83 (s, 1H)	7.932, 7.927 (s, 1H)	101.30, 101.28	101.52
6	-	-	151.78	151.95
7	-	-	150.20	150.29
8	7.08 (s, 1H)	7.08 (s, 1H)	106.21	106.21
1'	-	-	128.35	128.32
2'	6.84 (obsc., 1H)	6.82 (obsc., 1H)	110.69, 110.62	110.71, 110.61
3' and 4'	-	-	147.45	147.53
5'	6.96 (d, 1H, 8.1 Hz)	6.96 (d, 1H, 7.8 Hz)	108.11	108.19
6'	6.80 (obsc., 1H)	6.79 (obsc., 1H)	123.58, 123.49	123.61, 123.50
7'	6.10 (d, 1H, 1.1 Hz) 6.05 (d, 1H, 1.1 Hz)	6.099, 6.097 (d each, 1H, 1.4 Hz) 6.055, 6.053 (d each, 1H, 1.4 Hz)	101.15	101.22
1*	4.92 (d, 1H, 7.2 Hz)	4.996, 4.993 (d each, 1H, 7.0 Hz)	103.06	103.27
2*	3.89 (obsc., 1H)	3.937, 3.934 (dd each, 1H, 8.3, 7.0 Hz)	80.28, 80.23	80.99, 80.92
3*	3.28 (t, 1H, 8.5 Hz)	3.43 (t, 1H, 8.3 Hz)	84.51	83.08
4*	3.42 (m, 1H)	3.46 (obsc., 1H)	79.91	79.56
5*	4.02 (dd, 1H, 11.8, 5.0 Hz) 3.11 (dd, 1H, 11.8, 9.5 Hz)	4.037, 4.034 (dd each, 1H, 12.1, 4.6 Hz) 3.132, 3.131 (dd each, 1H, 12.1, 8.8 Hz)	62.99	62.54
1'''	5.08 (obsc. 1H)	4.68 (d, 1H, 7.6 Hz)	101.80, 101.78	105.91, 105.87
2'''	5.07 (obsc., 1H)	3.48 (dd, 1H, 9.1, 7.6 Hz)	71.86	75.32
3'''	5.26 (t, 1H, 8.9 Hz)	3.64 (t, 1H, 9.1 Hz)	73.06	75.74
4'''	5.10 (obsc., 1H)	3.41 (t, 1H, 9.1 Hz)	68.14	69.61
5'''	3.72 (m, 1H)	3.51 (ddd, 1H, 9.1, 4.7, 2.0 Hz)	72.04	74.76
6'''(a)	4.173, 4.166 (dd each, 1H, 12.2, 3.3 Hz)	4.38 (dd, 1H, 12.3, 4.7 Hz)	61.37	63.06
6'''(b)	3.93 (obsc. 1H)	4.09 (obsc., 1H)	-	-
6-OMe	4.14 (s, 3H)	4.11 (s, 3H)	56.47	56.53
7-OMe	3.81 (s, 3H)	3.81 (s, 3H)	55.76	55.81
3*-OMe	3.62 (s, 3H)	3.74 (s, 3H)	60.64	60.78
4*-OMe	3.47 (s, 3H)	3.47 (s, 3H)	58.28	58.23
2'''-COMe	2.12 (s, 3H)	-	20.76	-
3'''-COMe	2.04 (s, 3H)	-	20.52	-
4'''-COMe	2.01 (s, 3H)	-	20.45	-
6'''-COMe	1.81 (s, 3H)	1.79 (s, 3H)	20.17	20.20
2'''-COMe	-	-	169.25	-
3'''-COMe	-	-	170.20	-
4'''-COMe	-	-	169.27	-
6'''-COMe	-	-	170.25	171.54
OH	-	4.69 (1H), 3.34 (1H), 3.29 (1H)	-	-

หมายเหตุ Chemical shifts given in ppm using TMS as internal reference; multiplicities and coupling constants (Hz) are given in parentheses; 1', 2', 3', 4' and 5' are positions on the sugar ring.

obsc. = obscured signal


ตารางที่ 13 HMBC correlations observed ของสาร 5a และ 9 ใน CDCl_3

C	5a correlated H	9 correlated H
1	5, 8, 2', 6'	5, 8, 2', 6'
1a	5, 8	5, 8
2	3a	3a
2a	3a	3a
3	3a	3a
3a	-	-
4	5, 8, 3a, 1''	5, 8, 3a, 1''
4a	5, 8, 3a	5, 8, 3a
5	8, 6-OMe	8, 6-OMe
6	5, 8, 6-OMe	5, 8, 6-OMe
7	5, 8, 7-OMe	5, 8, 7-OMe
8	5, 7-OMe	5, 7-OMe
1'	5'	5'
2'	6'	6'
3' and 4'	2', 5', 6', 7'	2', 5', 6', 7'
5'	6'	6'
6'	2', 5'	2'
7'	-	-
1''	2'', 3'', 5''(a), 5''(b)	2'', 3'', 5''(a), 5''(b)
2''	1'', 3'', 1'''	3'', 1'''
3''	1'', 2'', 4'', 5''(a), 5''(b), 3''-OMe	1'', 2'', 4'', 5''(a), 5''(b), 3''-OMe,
4''	2'', 3'', 5''(a), 5''(b), 4''-OMe	3'', 5''(a), 5''(b), 4''-OMe
5''	1'', 3'', 4''	1''
1'''	2'', 3''', 5'''	2'', 2'''
2'''	1''', 3''', 4''', 2'''-O(CO)Me	1''', 3'''
3'''	1''', 2''', 4''', 3'''-O(CO)Me	1''', 2''', 4'''
4'''	2''', 3''', 5''', 6'''(a), 6'''(b), 4'''-O(CO)Me	3''', 5''', 6'''(b)
5'''	1''', 4''', 6'''(a), 6'''(b)	1''', 4''', 6'''(b)
6'''	4''', 6'''-O(CO)Me	4''', 6'''-O(CO)Me
6-OMe	-	-
7-OMe	-	-
3''-OMe	3''	3''
4''-OMe	4''	4''


การ assign chemical shifts ในสาร 5a และ 9 ก็ประสบกับปัญหาอย่างมาก ทั้งนี้เพราะว่าเมื่อ concentration เปลี่ยน chemical shifts ก็เปลี่ยนด้วย และ chemical shifts ทั้งใน ^1H และ ^{13}C NMR spectra จะมีบางตำแหน่งที่แสดง chemical shifts 2 ค่า¹² ซึ่งเกิดจาก hindered rotation รอบ C1-C1' bond เช่นเดียวกับใน cleistanthin A methyl ether (3) และ cleistanthin A (4) แต่กลุ่มวิจัยของเราได้ใช้ข้อมูลจาก 2D-NMR data (COSY, HMQC, HMBC) ช่วยในการ assign ค่า chemical shifts ต่าง ๆ จึงเชื่อว่าการ assign ของเราน่าจะถูก

ต้องมากกว่าใน literature ซึ่ง assign ^1H และ ^{13}C chemical shifts โดยไม่มี correlation data จาก 2D-NMR experiments มาสนับสนุน ตารางที่ 13 แสดง HMBC correlations ของสาร 5a และ 9

Compound 7 (*N*-Benzoylphenylalaninyl-*N*-benzoylphenylalaninate)



N-Benzoylphenylalaninyl-*N*-benzoylphenylalaninate (7)



white powder from EtOAc-hexane, m.p. 207.1–208.1 °C [Lit.¹³ 212.5–213 °C]

$[\alpha]_{\text{D}}^{27} -25.2^\circ$ (c 0.5, CHCl_3) [Lit.¹⁴ $[\alpha]_{\text{D}} -98.6^\circ$ (c 0.76, $\text{C}_5\text{H}_5\text{N}$), Lit.¹⁴ $[\alpha]_{\text{D}} -78.7^\circ$ (c 0.14, EtOH)]


IR ν_{max} (CHCl_3): 3440 (N-H), 1744 (C=O of ester), 1659 (C=O of amide), 1604, 1581, 1517, 1486, 1456, 1388, 1354, 1295, 1180, 1101, 1029, 917 cm^{-1}

UV (EtOH): λ_{max} (log ϵ) = 223 (4.28)

ESI-MS m/z (rel. int.): 529 $[\text{M}+\text{Na}]^+$ (100), 507 (65), 256 (42), 238 (16), 149 (7)

^1H NMR (CDCl_3 , 500 MHz): 7.63 (dd, 2H, H-2'', H-6''), 7.59 (dd, 2H, 8 and 1.2 Hz, H-2''', H-6'''), 7.42 (t, 1H, 7.6 Hz, H-4'''), 7.36 (t, 1H, 7.4 Hz, H-4''), 7.31 (t, 1H, 8 Hz, H-3''', H-5'''), 7.26–7.20 (m, 6H, H-3, H-3', H-3'', H-5, H-5', H-5''), 7.20–7.12 (obscured signal, 4H, H-2, H-2', H-4, H-4', H-6, H-6'), 6.66 (d, 1H, 10-NH), 6.57 (d, 1H, 10'-NH), 4.84 (ddd, 1H, 6.6, 6.6, 6.6 Hz, H-8'), 4.55 (m, 1H, H-8), 4.47 (dd, 1H, 11.4, 3.3 Hz, H-9a), 3.95 (dd, 1H, 11.4, 4.3 Hz, H-9b), 3.22 (dd, 1H, 13.9 and 6.5, H-7'a), 3.14 (dd, 1H, 13.9, 7.1 Hz, H-7'b), 2.92 (dd, 1H, 13.7 and 6.5 Hz, H-7a), 2.81 (dd, 1H, 13.7 and 8.4 Hz, H-7b)

^{13}C NMR (CDCl_3 , 125 MHz): 171.88 (C-9'), 167.41 (C-7'''), 167.21 (C-7''), 137.16 (C-1), 135.80 (C-1'), 134.24 (C-1''), 133.38 (C-1'''), 131.96 (C-4'''), 131.35 (C-4''), 129.28 (C-2, C-6), 129.16 (C-2', C-6'), 128.84, 128.67, 128.63, 128.40 (aromatic carbon *meta*- to CH_2R), 127.35 (C-4'), 127.10 (C-2'', C-6''), 127.04 (C-2''', C-6'''), 126.78 (C-4), 65.44 (C-9), 54.46 (C-8'), 50.28 (C-8), 37.55 (C-7'), 37.27 (C-7).

Compound 8 (N-Benzoylphenylalaninoylphenylalaninol acetate)*N*-Benzoylphenylalaninoylphenylalaninol acetate (8) $C_{27}H_{28}O_4N_2$

White powder from EtOAc-hexane

m.p. 175.6–176.2 °C [Lit.¹⁵ 175 °C, 184 °C, Lit.¹³ 182–183.5 °C] $[\alpha]_{589}^{27} -26^\circ$ (c 0.1, $CHCl_3$)Lit.¹⁵ L,L m.p. 184 °C $[\alpha]_{589}^{26} -40^\circ$ (c1.0, $CHCl_3$)D,D m.p. 185 °C $[\alpha]_{589}^{26} +40.6^\circ$ (c1.0, $CHCl_3$)D,L m.p. 175 °C $[\alpha]_{589}^{26} -5^\circ$ (c1.0, $CHCl_3$)L,D m.p. 175 °C $[\alpha]_{589}^{26} +4.8$ (c1.0, $CHCl_3$)


IR V_{max} (KBr): 3429 (NH), 1726 (C=O ester), 1662 (C=O amide), 1632 (C=O amide), 1603, 1580, 1535, 1493, 1468, 1453, 1392, 1373, 1323, 1263, 1198, 1151, 1126, 1053, 1126, 1052, 1034, 936, 914 cm^{-1}

UV (EtOH): λ_{max} (log ϵ) = 224 (4.02)ESI-MS m/z (rel. int.): 467 $[M+Na]^+$ (100), 194 (5)

1H NMR ($CDCl_3$, 500 MHz): δ 7.72 (m, 2H, H-2'', H-6''), 7.53 (m, 1H, H-4''), 7.44 (m, 2H, H-3'', H-5''), 7.20–7.30 (m, 5H, H-2, H-3, H-4, H-5, H-6), 7.05–7.19 (m, 3H, H-3', H-4', H-5'), 7.07 (m, 2H, H-2', H-6') 6.82 (d, 1H, 7.6 Hz, 10-NH), 6.09 (d, 1H, 8.6 Hz, 10'-NH), 4.79 (ddd, 1H, 8.6, 8.5, 5.9 Hz, H-8), 4.35 (m, 1H, H-8'), 3.93 (dd, 1H, 11.3, 4.9 Hz, H-9'a), 3.82 (dd, 1H, dd, 1H, 11.3, 4.2 Hz, H-9'b), 3.22 (dd, 1H, 13.6, 5.9 Hz, H-7'a), 3.08 (dd, 1H, 13.6, 8.5 Hz, H-7'b), 2.77 (dd, 1H, 13.8, 6.8 Hz, H-7'a), 2.73 (dd, 1H, 13.8, 7.5 Hz, H-7'b), 2.02 (s, 3H, H-2''')

^{13}C NMR ($CDCl_3$, 125 MHz): 170.72 (C-1'''), 170.28 (C-9), 167.11 (C-7''), 136.70 (C-1'), 136.61 (C-1), 133.68 (C-1''), 131.87 (C-4''), 129.28 (C-2, C-6), 129.11 (C-2', C-6'), 128.72 (C-3, C-5), 128.60 (C-3'', C-5''), 128.55 (C-3', C-5'), 127.10 (C-4), 127.04 (C-2'', C-6''), 126.71 (C-4'), 64.58 (C-9'), 54.96 (C-8), 49.46 (C-8'), 38.40 (C-7), 37.43 (C-7'), 20.74 (C-2''')

จะเห็นว่า ขณะนี้ค่า optical ที่วัดได้ยังแตกต่างจากใน literature อยู่มาก จึงยังไม่สามารถสรุป configurations ที่ chiral centers ในสารทั้งสองได้ คิดว่าจะต้องทำการ recrystallize สารอีก แล้ววัดทั้งค่า $[\alpha]_D$ และ melting points ใหม่

Compound 10 (4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid)¹⁶

10

ได้พิสูจน์โครงสร้างโดยเทียบ physical properties และ ¹H NMR data กับ data ที่รายงานใน literature¹⁶

9. การทดสอบฤทธิ์ cytotoxic activity ของสารบริสุทธิ์ที่แยกได้จาก *Phyllanthus taxodiifolius*

ได้จัดให้มีการทดสอบ cytotoxic activity ของสารบริสุทธิ์ที่แยกได้ แต่ขณะนี้ได้ผลการทดสอบมา 6 ตัว ดังแสดงในตารางที่ 14

ตารางที่ 14 ผล cytotoxic activity ของสาร 1-9

Compound	EC ₅₀ (μg/mL)					
	Cell line					
	P-388	KB	Col-2	BCA-1	Lu-1	ASK
1	16.257	>20	>20	16.080	>20	>20
2	>20	>20	>20	3.87	>20	>20
3	0.112	0.016	0.076	0.028	0.021	0.275
4	0.053	0.003	0.029	0.014	0.008	0.128
5	>20	>20	>20	>20	>20	>20
6	>20	2.805	7.84	12.17	7.06	>20
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ED₅₀ ≤ 5 μg/mL = active; - รวผลการทดสอบ

P-388: murine lymphocytic leukemia, KB: human nasopharyngeal carcinoma, COL-2: human colon cancer, BCA-1: human breast cancer, Lu-1: human lung cancer, ASK: rat glioma

จะเห็นว่า สาร 3 และ 4 มีผลการทดสอบดีมากดังแสดงในตารางที่ 14 สาร 1 และ สาร 5 นั้น inactive ในทุก cell lines ที่ทดสอบ สาร 2 นั้น active เฉพาะใน BCA-1 cell line แต่ไม่เด่นนัก สาร 6 นั้น active เฉพาะใน KB cell line แต่ไม่เด่นนัก ส่วนสาร 7-9 นั้นยังรอผลการทดสอบอยู่

10. การแยกสารองค์ประกอบจาก *Phyllanthus acutissima* และการทดสอบ cytotoxic activity ของส่วนแยกย่อยต่าง ๆ

เนื่องจากผลการทดสอบ cytotoxic activity ของส่วนสกัด MeOH ของ *Phyllanthus acutissima* อยู่ในเกณฑ์ดีมากมีค่า ED₅₀ <4 mg/ml ในหลาย cell lines (ดูผลการทดสอบได้ในตารางที่ 3) และเมื่อนำมาทำ partition ได้เป็นส่วนสกัด hexanes, EtOAc, *n*-BuOH และน้ำแล้ว ได้จัดให้มีการทดสอบ cytotoxic activity ของส่วนสกัดย่อยด้วย พบว่า ส่วนสกัด ethyl acetate ให้ผลการทดสอบดีที่สุด (ดูผลการทดสอบได้ในตารางที่ 6) จึงเห็นสมควรที่จะทำการศึกษาทางเคมีต่อไป

ได้ทำการแยกส่วนสกัด ethyl acetate (25.36 g) ของ *Phyllanthus acutissimus* โดยใช้ column chromatography และใช้ acetone-hexane เป็น eluent สามารถแยก ได้ทั้งหมด 10 fractions ได้ส่ง fractions ต่าง ๆ ที่แยกได้ไปทดสอบ cytotoxic activity ที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์การทดสอบมีบาง fractions ที่แสดง activity อยู่ในเกณฑ์ที่ตั้งแสดงในตารางที่ 15

ตารางที่ 15 ผลการทดสอบ cytotoxic activity ของ fractions ย่อยที่แยกได้จาก *Phyllanthus acutissimus*


Fraction	Cell line					
	P-388	KB	Col-2	BCA-1	Lu-1	ASK
1	>20	>20	>20	>20	>20	>20
2	11.63	>20	>20	>20	>20	>20
3	11.9	>20	>20	>20	>20	>20
4	9.09	>20	>20	>20	>20	>20
5	9.1	18.03	19.56	13.41	>20	>20
6	7.09	15.42	15.30	9.6	17.89	16.43
7	1.3	17.48	>20	>20	>20	>17.9
8	<4	<4	<4	<4	4.81	<4
9	3.06	9.78	14.29	13.32	>20	>20
10	>20	>20	>20	>20	>20	>20

หมายเหตุ ค่า $EC_{50} < 20 \mu\text{g/ml}$ จึงถือว่าแสดง activity

P-388: murine lymphocytic leukemia, KB: human nasopharyngeal carcinoma, COL-2: human colon cancer, BCA-1: human breast cancer, Lu-1: human lung cancer, ASK: rat glioma


ได้ทำการแยกส่วนสกัด F6, F7 และ F8 ต่อ โดย column chromatography สามารถแยกสารได้ 5 ตัว คือ 11-15 ดังแสดงในแผนผังที่ 9

แผนผังที่ 9




11. การพิสูจน์โครงสร้างของสาร 11-15


ได้ทำการพิสูจน์โครงสร้างของสาร 11-15 พบว่าเป็นจำพวก canthin-6-one alkaloids ทั้ง 4 ตัว ส่วนสาร 15 เป็นสารจำพวก coumarin มีชื่อเรียกว่า scopolatin ซึ่งมีสูตรโครงสร้างดังแสดง




11




12



13




14




15

Physical properties และ spectroscopic data ของสาร 11-15

Compound 11 (Canthin-6-one)¹⁷



11



Yellow needles

m.p. 154.0–155.5 °C (Lit.¹⁷ 155–156 °C)

IR $\nu_{\max}$ (CHCl₃): 3014, 1682, 1637, 1604, 1562, 1488, 1449, 1395, 1436, 1394, 1337, 1315, 1305, 1244, 1192, 1108, 1143, 1109, 1057, 846 cm⁻¹

UV $\lambda_{\max}$ (EtOH) nm (log ϵ): 226 (4.68), 251 (4.45), 259 (4.43), 268 (4.41), 297 (4.26), 361 (4.41), 379 (4.38)

EIMS (70 eV) m/z : 220 [M]⁺ (100), 192 (78), 193 (29), 221 (20), 166 (6), 138 (7), 140 (4), 113 (3), 88 (3)


¹H NMR (CDCl₃, 500 MHz): δ 8.81 (d, J = 5.0 Hz, H-2), 8.65 (dd, J = 8.2 Hz, 0.7 Hz, H-8), 8.09 (ddd, J = 7.8, 1.1, 0.7 Hz, H-11), 8.02 (dd, J = 9.9, 0.6 Hz, H-4), 7.95 (d, J = 5.0 Hz, H-1), 7.70 (m, H-9), 7.52 (m, H-10), 6.98 (d, J = 9.9 Hz, H-5)

¹³C NMR (CDCl₃): δ 116.35 (C-1), 117.29 (C-8), 122.64 (C-11), 124.39 (C-12), 125.63 (C-10), 128.92 (C-5), 130.27 (C-14), 130.86 (C-9), 132.04 (C-15), 136.24 (C-16), 139.45 (C-13), 139.62 (C-4), 145.84 (C-2), 159.51 (C-6)

หมายเหตุ การ assign ^1H และ ^{13}C signals นั้น อาศัยข้อมูลจาก 2D-correlation spectra (COSY, HMQC, HMBC และ NOESY)

สาร 11 เป็นสาร known แยกได้จาก *Ailanthus altissima*¹⁷ และ *Eurycoma longifolia*¹⁸

Compound 12 (9-Methoxycanthin-6-one)¹⁹



12

$\text{C}_{15}\text{H}_{10}\text{O}_2\text{N}_2$

Yellow needles CH_2Cl_2 -MeOH

m.p. 178.5–179.5 °C (Lit.¹⁹ 177–179 °C)

IR ν_{max} (CHCl_3): 3013, 2970, 1683, 1635, 1611, 1496, 1454, 1439, 1425, 1393, 1351, 1333, 1314, 1280, 1247, 1152, 1111, 1096, 1031, 847 cm^{-1}

UV λ_{max} (EtOH) nm (log E): 262 (4.73), 269 (4.89), 305 (4.40), 347 (4.57)

EIMS (70 eV) m/z 250 [M^+] (100), 235 (5), 221 (50), 207 (30), 192 (16), 179 (29), 164 (3), 153 (10)


^1H NMR (CDCl_3): δ 8.65 (d, J = 5.0 Hz, H-2), 8.03 (d, J = 2.4 Hz, H-8), 7.89 (d, J = 9.8 Hz, H-4), 7.78 (d, J = 8.6 Hz, H-11), 7.69 (d, J = 5.0 Hz, H-1), 6.93 (dd, J = 8.6, 2.4 Hz, H-10), 6.83 (d, J = 9.8 Hz, H-5), 3.90 (s, 9-OMe)

^{13}C NMR (CDCl_3): δ 55.91 (9-OMe), 101.18 (C-8), 114.07 (C-10), 115.40 (C-1), 117.08 (C-12), 123.20 (C-11), 128.39 (C-5), 130.29 (C-14), 132.18 (C-15), 135.57 (C-16), 139.77 (C-4), 141.10 (C-13), 145.90 (C-2), 159.58 (C-6), 162.40 (C-9)

หมายเหตุ การ assign ^1H และ ^{13}C signals นั้น อาศัยข้อมูลจาก 2D-correlation spectra (COSY, HMQC, HMBC และ NOESY)

สาร 12 เป็นสาร known แยกได้จาก *Simaba multiflora*¹⁹ และ *Eurycoma longifolia*²⁰

Compound 13 (1-Hydroxycanthin-6-one)²¹



13

$\text{C}_{14}\text{H}_8\text{O}_2\text{N}_2$

Yellow Solid CH_2Cl_2 -MeOH

m.p. 224–225 °C (Lit.²¹ 220 °C)

IR $\nu_{\max}$ (KBr): 3422, 1671, 1636, 1602, 1579, 1443, 1352, 1328, 1259, 1243, 1216, 833, 790, 742 cm^{-1}

UV $\lambda_{\max}$ (MeOH) nm (log ϵ): 269 (3.74), 278 (3.79), 285 (3.65), 301 (3.64), 340 (3.62), 364 (3.71), 372 (3.96)

EIMS (70 ev) m/z 236 $[M]^+$ (100), 208 (66), 206 (29), 153 (41), 118 (23), 209 (18), 129 (18)


^1H NMR (CDCl_3 ; MeOH, 1:1): δ 8.66 (d, J = 8.2 Hz, H-8), 8.34 (s, H-2), 8.29 (d, J = 7.7 Hz, H-11), 7.96 (d, J = 9.7 Hz, H-4), 7.68 (dd, J = 7.6, 7.7 Hz, H-9), 7.56 (dd, J = 7.6, 7.7 Hz, H-10), 6.82 (d, J = 9.7 Hz, H-5)

^{13}C NMR (CDCl_3): δ 116.09 (C-14), 116.70 (C-8), 123.85 (C-5 and C-12), 124.35 (C-11), 125.73 (C-10), 128.12 (C-16), 129.21 (C-9), 133.62 (C-15), 135.04 (C-2), 138.26 (C-13), 138.26 (C-13), 138.45 (C-4), 151.48 (C-1), 160.61 (C-6)

หมายเหตุ การ assign ^1H และ ^{13}C signals นั้น อาศัยข้อมูลจาก 2D-correlation spectra (COSY, HMQC, HMBC และ NOESY)

สาร 13 เป็นสาร known แยกได้จาก *Ailanthus firdii*²¹

Compound 14 (9,10-Dimethoxycanthin-6-one)¹⁸



$\text{C}_{18}\text{H}_{12}\text{O}_3\text{N}_2$

Yellow needles

m.p. 212–214 $^{\circ}\text{C}$ dec. (Lit.¹⁸ 213–215 $^{\circ}\text{C}$)

IR $\nu_{\max}$ (CHCl_3): 3025, 2968, 1672, 1633, 1587, 1486, 1464, 1439, 1414, 1393, 1362, 1338, 1303, 1283, 1235, 1191, 1184, 1157, 1118, 1057, 1020, 928, 841 cm^{-1}

UV $\lambda_{\max}$ (EtOH) nm (log ϵ): 229 (4.32), 272 (4.30), 280 (4.38), 299 (3.97), 309 (3.93), 360 (4.03), 374 (4.00)

EIMS (70 ev) m/z : 280 $[M]^+$ (100), 265 (14), 237 (88), 209 (43), 194 (28), 181 (10), 167 (26), 139 (10), 127 (5)


^1H NMR (CDCl_3): δ 8.77 (d, J = 5.0 Hz, H-2), 8.17 (s, H-8), 7.99 (d, J = 9.8 Hz, H-4), 7.82 (d, J = 5.0 Hz, H-1), 7.44 (s, H-11), 6.94 (d, J = 9.8 Hz, H-5), 4.08 (s, 9-OMe), 4.03 (s, 10-OMe)

^{13}C NMR (CDCl_3): δ 56.39 (10-OMe), 56.57 (9-OMe), 100.23 (C-8), 104.00 (C-11), 115.47 (C-1), 116.33 (C-12), 128.57 (C-5), 130.58 (C-14), 131.89 (C-15), 134.55 (C-13), 135.69 (C-16), 139.59 (C-4), 145.73 (C-2), 147.99 (C-10), 152.26 (C-6)

หมายเหตุ การ assign ^1H และ ^{13}C signals นั้น อาศัยข้อมูลจาก 2D-correlation spectra (COSY, HMQC, HMBC และ NOESY)

สาร 14 เป็นสาร known แยกได้จาก *Eurycoma longifolia*¹⁸

Compound 15 (Scopoletin)²²



15

$\text{C}_{10}\text{H}_8\text{O}_4$

Yellow needles

m.p. 201.8 – 202.4 °C (Lit.²² 203–205 °C)

IR ν_{max} (KBr): 3294, 1703, 1608, 1561, 1509, 1455, 1434, 1291, 1263, 1141, 1016, 923, 857, 529 cm^{-1}

UV λ_{max} (EtOH) nm (log ϵ): 226 (4.24), 250 (3.79), 257 (3.75), 295 (3.80), 343 (4.18)

EIMS (70 eV) m/z : 192 [$\text{M}]^+$ (75), 193 (100), 164 (35), 149 (27), 121 (27), 70 (12)

^1H NMR (CD_3COCD_3): δ 8.80 (br, 7-OH), 7.83 (d, $J = 9.5$ Hz, H-4), 7.18 (s, H-5), 6.78 (s, H-8), 6.16 (d, $J = 9.5$ Hz, H-3)

^{13}C NMR (CD_3COCD_3): δ 56.66 (6-OMe), 103.67 (C-8), 109.91 (C-5), 112.04 (C-4a), 113.25 (C-3), 144.61 (C-4), 145.93 (C-1a), 151.09 (C-6), 151.81 (C-7), 161.26 (C-2)

หมายเหตุ การ assign ^1H และ ^{13}C signals นั้น อาศัยข้อมูลจาก 2D-correlation spectra (COSY, HMQC, HMBC และ NOESY)

สาร 15 เป็นสาร known แยกได้จาก *Simaba multiflora*²²

ในการแยกสารจาก EtOAc extract ของ *Phyllanthus acutissima* (ตัวอย่างที่ 2) ซึ่งมีปริมาณมากกว่าปรากฏว่า สามารถแยกสาร triterpenes ได้อีก 2 ตัว คือสาร 16 และ 17 ซึ่งเป็น analogues กัน การวิเคราะห์ทาง nuclear magnetic resonance ในเบื้องต้น พบว่า มี cyclopropane ring อยู่ที่ตำแหน่ง 13, 14 เพราะ H-13 และ H-14 มี HMBC correlations กับ C-17 สารทั้งสองต่างมี olefinic protons 2 ตัว นอกจากนี้ยังพบ aromatic protons อยู่ในโครงสร้างทั้ง 2 อีกด้วย คาดว่าเป็นสารใหม่ทั้ง 2 ตัว แต่เนื่องจากเพิ่งแยกสาร 2 ตัวนี้ได้ และสารทั้งสองเป็นสารที่ไม่เลกุลใหญ่มาก จึงยังคงต้องศึกษาโครงสร้างด้วยเทคนิคทางสเปกโทรสโกปีเพิ่มเติมอีก ขณะนี้ไม่สามารถนำข้อมูลมาสรุปในรายงานครั้งนี้ได้


ได้จัดให้มีการทดสอบ cytotoxic activity ของสารบริสุทธิ์ทุกตัวที่แยกได้ แต่ยังรอผลการทดสอบอยู่ กลุ่มวิจัยจะได้รวบรวมเพื่อการตีพิมพ์ต่อไป

บทวิจารณ์


สรุปผลงานวิจัยในรอบ 3 ปี

- ด้านการสังเคราะห์

ได้ศึกษาปฏิกิริยาของ vicinal dianions **3**, **4**, **18**, **42** และ **70** โดยพบว่า vicinal dianion ทุกตัวทำปฏิกิริยากับ electrophiles เช่น carbonyl compounds เป็นแบบ regioselective ที่ β -carbon




ได้แสดงให้เห็นประโยชน์ของ vicinal dianion **18** ว่าเป็น reagent ที่สามารถใช้เตรียม α, β, γ -trisubstituted γ -butyrolactone natural products ได้เช่น ($\pm$)-lichesterinic acid (**27**), ($\pm$)-phaseolinic acid (**28**), ($\pm$)-nephromopsinic acid (**29**), ($\pm$)-rocellaric acid (**30**) และ ($\pm$)-dihydroprotolichesterinic acid (**31**) ได้




สปีชีส์ ในจำนวนนี้พบว่า *Phyllanthus taxodiifolius* และ *Phyllanthus acutissima* นั้นแสดง potent cytotoxic activity และได้ทำการศึกษาดังเดิมของพืชทั้ง 2 สปีชีส์นี้อย่างละเอียด


จาก *Phyllanthus taxodiifolius* พบสาร triterpenes 2 ตัว ได้แก่ glochidone (1) และ glochidonol (2) พบสารจำพวก lignan glycosides 4 ตัว ได้แก่ cleistanthin A methyl ether (3), cleistanthin A (4), cleistanthoside A (5) และสาร lignan glycoside ใหม่ คือ taxodiifolosite (9) ซึ่งมีโครงสร้างเป็น monoacetate ของ cleistanthoside A พบสารจำพวก amide 2 ตัว ได้แก่ *N*-benzoylphenylalaninyl-*N*-benzoylphenylalaninate (7) และ *N*-benzoylphenylalaninoylphenylalaninol acetate (8) นอกจากนี้ยังพบสารอนุพันธ์ของกรดเบนโซอิก คือ 4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid (10)




1




2




3




4




5




9 (New)



7



8



10






ได้ทำการวิเคราะห์หาโครงสร้างโดยวิธีทาง spectroscopy และการเปรียบเทียบกับใน literature แต่เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ได้จาก literature ไม่ค่อยสมบูรณ์นัก ซึ่งข้อมูลสำหรับสารบางตัว ได้มีรายงานแต่เฉพาะ ^1H NMR และ บางตัวก็มี ^{13}C NMR ด้วย แต่ไม่มีการทำ 2D-NMR experiments เพื่อการ assign ตำแหน่ง chemical shifts ต่าง ๆ ดังนั้นกลุ่มวิจัยของเราจึงน่าจะมีการ assign chemical shifts ได้ถูกต้องมากกว่า เนื่องจากได้ทำ 2D-NMR experiments ของสาร lignans ที่แยกได้ สำหรับสาร 5 นั้นการละลายไม่ดีนักจึงได้เตรียมเป็นอนุพันธ์ tetraacetate คือ cleistanthoside A tetraacetate (5a) โดยปฏิกิริยากับ acetic anhydride และ *N,N*-dimethylaminopyridine (DMAP) ที่อุณหภูมิห้อง แล้วได้ทำการวิเคราะห์โครงสร้างของ cleistanthoside A tetraacetate (5a) แทน cleistanthoside A (5) แม้ว่าได้ทำ 2D-NMR experiment ของ 5 แล้วก็ตาม แต่การวิเคราะห์ทำไม่ได้ดีเนื่องจากสัญญาณขึ้นซ้อนกันและ broad มาก

ได้ทำ methylation ของ cleistanthin A (4) โดยปฏิกิริยากับ methyl iodide/NaH/DMSO ปรากฏว่าได้ product ที่มี ^1H NMR เหมือน cleistanthin A methyl ether (3) ทุกประการ จึงสรุปได้ว่า สาร 3 เป็น analogue ของสาร 4 ขณะนี้ได้พยายามทำ monoacetylation ของสาร 5 ด้วย เพื่อพิสูจน์ว่า สาร 9 เป็น analogue ของสาร 5 แต่ยังไม่ได้นำสาร 9 ไปทำ fully acetylation ทั้งนี้เพราะมีอยู่ปริมาณน้อยต้องการวัด physical properties ต่าง ๆ ก่อน และยังต้องทดสอบ cytotoxic activity อีกด้วย ส่วนสาร 6 มีปริมาณน้อยมากไม่สามารถหาโครงสร้างได้ และยังไม่พบในตัวอย่างพืชที่เก็บครั้งที่ 2 ด้วย

ในแต่ละขั้นตอนของงานวิจัยด้านนี้ได้ทำการทดสอบ cytotoxic activity โดยตลอด ทั้งในส่วนสกัด ใน fractions และในสารบริสุทธิ์ ได้ผลการทดสอบ cytotoxic activity ของสารที่แยกได้ ซึ่งพบว่าสาร 3 และ 4 มีผลการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (สาร 3: ED_{50} ใน P-388 cell line 0.112 $\mu\text{g/mL}$ ใน KB cell line 0.016 $\mu\text{g/mL}$ ใน Col-2 cell line 0.076 $\mu\text{g/mL}$ ใน BCA-1 cell line 0.028 $\mu\text{g/mL}$ ใน Lu-1 cell line 0.021 $\mu\text{g/mL}$ และใน ASK cell line 0.275 $\mu\text{g/mL}$; สาร 4 ED_{50} ใน P-388 cell line 0.053 $\mu\text{g/mL}$ ใน KB cell line 0.003 $\mu\text{g/mL}$ ใน Col-2 cell line 0.029 $\mu\text{g/mL}$ ใน BCA-1 0.014 $\mu\text{g/mL}$ ใน Lu-1 cell line 0.008 $\mu\text{g/mL}$ และใน ASK cell line 0.128 $\mu\text{g/mL}$) สำหรับ สาร 5 และ สาร 6 นั้นไม่ active ขณะนี้ยังรอผลการทดสอบสาร 7-9 อยู่

ขณะนี้กำลังรอผลการวัดทาง high resolution mass spectrometry และรอผลการทดสอบ cytotoxic activity จึงได้เริ่มเตรียม manuscript เพื่อการตีพิมพ์งานที่เกี่ยวกับ *Phyllanthus taxodiifolius* นี้ไปบ้างแล้ว

การศึกษาร่องค์ประกอบจาก *Phyllanthus acutissima* ตัวอย่างที่ 1 นั้น พบสารจำพวก alkaloids 4 ตัว และ coumarin อีก 1 ตัว alkaloids ทั้ง 4 ตัวเป็นชนิด canthin-6-one alkaloid ได้แก่ canthin-6-one (11), 9-methoxy-canthin-6-one (12), 1-hydroxycanthin-6-one (13), 9,10-dimethoxycanthin-6-one (14) ส่วน coumarin ที่แยกได้คือ scopoletin (15)



เนื่องจาก *Phyllanthus acutissima* ตัวอย่างที่ 1 มีปริมาณน้อย จึงแยกสารไม่ได้มากนัก จึงได้ทำการแยกสารจาก *Phyllanthus acutissima* ตัวอย่างที่ 2 ซึ่งมีปริมาณมากกว่า ปรากฏว่าแยกสาร triterpenes ได้ 2 ตัว คือ สาร 16 และ 17 สารทั้ง 2 ต่างมี cyclopropane ring อยู่ที่ตำแหน่ง 13, 14 มี olefinic protons 2 protons และมี aromatic protons อยู่ในโครงสร้างด้วย คาดว่าเป็นสารใหม่ทั้ง 2 ตัว แต่เนื่องจากเพิ่งแยกสาร 2 ตัวนี้ได้ และสารทั้งสองเป็นสารที่โมเลกุลใหญ่มาก ($M^+ = 614$ และ 658) จึงยังคงต้องศึกษาโครงสร้างด้วยเทคนิคทางสเปกโทรสโกปีเพิ่มเติมต่อไปอีก ขณะนี้ไม่สามารถนำข้อมูลมาสรุปในรายงานครั้งนี้ได้ และยังรอผลการทดสอบ cytotoxic activity อยู่ด้วย กลุ่มวิจัยจะได้รวบรวมเพื่อการตีพิมพ์ต่อไป

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง

ด้านการสังเคราะห์

1. Methylenolactocin
Isolation: Park, B.K.; Nakagawa, M.; Hirota, A.; Nakayama, M. *J. Antibiot.* **1988**, *41*, 751.
Synthesis: Masaki, Y.; Arasaki, H.; Itoh, A. *Tetrahedron Lett.* **1999**, *40*, 4829 and references cited therein: Lertvorachon, J.; Meepowpan, P.; Thebtaranonth, Y. *Tetrahedron* **1998**, *54*.
2. Protolichesterinic acid
Isolation: Murta, M.M.; de Azevedo, M.B.M.; Greene, A. *J. Org. Chem.* **1993**, *58*, 7537 and references cited therein.
Synthesis: Ghatak, A.; Sarkar, S.; Ghosh, S. *Tetrahedron* **1997**, *53*, 17335 and references cited therein.
3. Crump, R.A.N.C.; Fleming, I.; Hill, J.H.M.; Parker, D.; Reddy, N.L.; Watersom, D. *J. Chem. Soc. Perkin Trans. I* **1992**, 3277.
4. Linke, S.; Kurz, J.; Lipinsik, D.; Gau, W. *Liebigs Ann. Chem.* **1980**, 542.
5. Aftab, T.; Carter, C.; Chrislieb, M.; Hart, J.; Nelson, A. *J. Chem. Soc. Perkin Trans. I*, **2000**, 711.
6. Lichesterinic acid
Isolation: Cavallito, C.J.; Fruehauf, D.M. *J. Am. Chem. Soc.* **1948**, *70*, 3724.
Synthesis: D' Onofrio, F.; Margarita, R.; Parlanti, L.; Piancatelli, G.; Sbraga, M. *Chem. Commun.* **1998**, 185 and references cited therein.
7. Phaseolinic acid
Isolation: Mahato, S.B.; Siddiqui, K.A.I.; Bhattacharya, G.; Ghosal, T.; Miyahara, K.; Sholichin, M.; Kawasaki, T. *J. Nat. Prod.* **1987**, *50*, 245.
Synthesis: Drioli, S.; Felluga, F.; Forzato, C.; Nitti, P.; Pitacco, G.; Valentin, E. *J. Org. Chem.* **1998**, *63*, 2385.
8. Nephromopsinic acid
Isolation: Asano, M.; Azumi, T. *Ber. Dtsch. Chem. Ges.* **1935**, *68*, 995; van Tamelen, E.E.; Rosenberg Bach, S. *J. Amer. Chem. Soc.* **1958**, *80*, 3079; Huneck, S.; Follmann, G. *Z. Naturforsch. B* **1967**, *22*, 666.
Synthesis: Forster, A.; Fitremann, J.; Renaud, P. *Tetrahedron Lett.* **1998**, *39*, 7097 and references cited therein; Mulzer, J.; Kattner, L.; Strecker, A.R.; Schroder, C.; Buschmann, J.; Lehmann, C.; Luger, P. Highly Felkin-Ahn selective Hiyama addition of chiral allylic bromides to aldehydes. Application to the first synthesis of nephromopsinic acid and its enantiomer. *J. Amer. Chem. Soc.* **1991**, *113*, 4218.
9. Roccellaric acid
Isolation: Bruckner, C.H.; Reissig, H.U. *J. Org. Chem.* **1998**, *53*, 2440.
Synthesis: Sibi, M.P.; Ji, J. *Angew. Chem. Int. Ed. Engl.* **1997**, *36*, 274; Mulzer, J.; Salimi, N.; Hartl, H. *Tetrahedron Asym.* **1993**, *4*, 457.

10. Dihydroprotolichesterinic acid
Isolation: Huneck, S.; Follmann, G. *Z. Naturforsch. B* **1967**, *22*, 666.
Synthesis: Mandal, P.K.; Roy, S.C. *Tetrahedron* **1999**, *44*, 11395; Mulzer, J.; Salimi, N.; Hartl, H. *Tetrahedron Asym.* **1993**, *4*, 457.
11. Hwang, E.I.; Yun, B.S.; Kim, Y.K.; Kwon, B.M.; Kim, H.G.; Lee, H.B.; Jeong, W.J.; Kim, S.K. *J. Antibiot.* **2000**, *53*, 903.
12. (a) Stetter, H.; Kuhlman, H. *Org. React.* **1991**, *40*, 407.
(b) Albright, J.D. *Tetrahedron* **1983**, *39*, 3207.
(c) Reutrakul, V.; Nimgirawath, S.; Panichanun, S.; Ratananukul, P. *Chem. Lett.* **1979**, 399.
13. San Feliciano, A.; Lopez, J.L.; Medarde, M.; Mignel del Corral J.M.; de Pascual-Teresa, B.; Puebla, P. *Tetrahedron* **1988**, *44*, 7255.
14. (a) Murphy, W.S.; Wattanasin, S. *J. Chem. Soc. Perkin Trans. 1* **1982**, 271.
(b) Andrews, R.C.; Teague, S.J.; Meyers, A.I. *J. Am. Chem. Soc.* **1988**, *110*, 7854.
(c) Yoshida, S.; Yamanaka, T.; Miyake, T.; Moritani, Y.; Ohmizu, H.; Iwasaki, T. *Tetrahedron* **1997**, *53*, 9585.
15. (a) Wards, R.S. *Synthesis* **1992**, 719.
(b) Peterson, J.R.; Do, H.D.; Rogers, R.D. *Synthesis* **1991**, 275 and references cited .
(c) Canel, C.; Moraes, R.M.; Dayan F.E.; Ferreira, D. *Phytochemistry* **2000**, *54*, 115.
16. (a) Anjaneyulu, A.S.R.; Rao, V.K.; Row, L.R.; Subrahmanyam, C.; Pelter, A.; Ward, R.S. *Tetrahedron* **1975**, *31*, 1277.
(b) Griggith, R.; Chanphen, R.; Leach, S.P.; Keller, P.A. *Biorg. & Med. Chem. Lett.* **2002**, *12*, 539.

ด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

1. Ganguly, A.K.; Govindachari, T.R.; Mohamed, P.A.; Rahimtulla, A.D.; Viswanathan, N. *Tetrahedron* **1966**, *22*, 1513.
2. Srivastava R.; Kulshreshtha, D.K. *Phytochemistry* **1988**, *27*, 3575.
3. Wai-Haan, H.; Man-Moon, L. *Phytochemistry* **1978**, *17*, 156.
4. Matsunaga, S.; Tanaka, R.; Takaoka, Y.; In, Y.; Ishida, T.; Rahmani, M.; Ismail, H.B.M. *Phytochemistry* **1993**, *32*, 165.
5. Ayer, W.A.; Flanagan, R.J.; Reffstrup, T. *Tetrahedron* **1984**, *40*, 2069.
6. Anjaneyulu, A.S.R.; Atchuta Rahmaiah, P. Ramachandra Row, L. Venkateswarlu, R.; Pelter, A.; Wards, R.S. *Tetrahedron* **1981**, *37*, 3641.
7. Govindachari, T.R.; Sathe, S.S.; Viswanathan, N.; Pai, B.R.; Srinivasan, M. *Tetrahedron* **1969**, *25*, 2815.
8. Govindachari, T.R.; Sathe, S.S.; Viswanathan, N.; Pai, B.R.; Srinivasan, M. *Tetrahedron Lett.* **1967**, 3517.
9. Sastry, K.V.; Venkata Rao, E. Buchanan, J.G.; Sturgeon, R.J. *Phytochemistry* **1987**, *26*, 1153.
10. Sastry, K.V.; Venkata Rao, E. *Planta Med.* **1983**, *47*, 227.
11. Ghosal, S.; Chauhan, R.P.S.; Srivastava, R.S. *Phytochemistry* **1974**, *13*, 1933.

12. Bachmann, T.L.; Ghia F.; Torrsell, K.B.G. *Phytochemistry* **1993**, *33*, 189.
13. Catalán, C.A.N.; de Heluani, C.S.; Kotowicz, C.; Gedris, T.E.; Herz, W. *Phytochemistry* **2003**, *64*, 625.
14. McCorkindale, N.J.; Baxter, R.L.; Roy, T.P.; Shields, H.S.; Stewart R.M.; Hutchinson, S.A. *Tetrahedron* **1978**, *34*, 2791.
15. Ishiguro K.; Nagata, S.; Fugumoto, H.; Yamaki, M.; Takago, S.; Isoi, K. *Phytochemistry* **1991**, *30*, 3639..
16. Lee, C.-K.; Lee, P.-H.; Kuo Y.-H. *J. Chin. Chem. Soc.*, **2001**, *48*, 1053.
17. Ohmoto, T.; Tanaka, R.; Nakaido, T. *Chem. Pharm. Bull.* **1976**, *24*, 1532.
18. Mitsunaga, K.; Koike, K.; Tanaka, T.; Ohkowa, Y.; Kobayashi, Y.; Ohmoto, T. *Phytochemistry* **1994**, *35*, 799.
19. Polonsky, J.; Gallas, J.; Varenne, J.; Prange, T.; Pascard, C. *Tetrahedron Lett.* **1982**, *23*, 869.
20. Kardono, L.B.S.; Angerhofer, C.K.; Tsausi, S.; Padmawinata, K.; Pezzuto, J.M.; Kinghorn, A.D. *J. Nat. Prod.* **1991**, *54*, 1360.
21. Khan, S.A.; Shamsuddin K.M. *Phytochemistry* **1981**, *20*, 2062.
22. Arisawa, M.; Kinghorn A.D.; Cordell, G.A.; Farnsworth, N.R. *J. Nat. Prod.* **1983**, *46*, 222.

Output ที่ได้จากโครงการ

Output ที่ได้จากโครงการ

ผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์แล้ว

1. "Vicinal Dianion of Triethyl Ethanetricarboxylate: Syntheses of ($\pm$)-Lichesterinic Acid, ($\pm$)-Phaseolinic Acid, ($\pm$)-Nephromopsinic Acid, ($\pm$)-Rocellaric Acid and ($\pm$)-Dihydroproto-lichesterinic Acid" M. Pohmakotr, W. Harnying, P. Tuchinda, and V. Reutrakul, *Helv. Chem. Acta* **2002**, *85*, 3792.
2. "Vicinal dianions of diethyl α -aroylsuccinates: a general synthetic route to α -aroyl- and α -arylidene- γ -butyrolactones" M. Pohmakotr, L. Sampaongoen, Arisara Issaree, P. Tuchinda and V. Reutrakul, *Tetrahedron Lett.* **2003**, *44*, 6717.
3. "Vicinal dianions of diethyl α -aroylsuccinates: preparation of functionalized-2,3-dihydrofurans and furans, and diaxial 2,4-diaryl-3,7-bicyclo[3.3.0]octanes" M. Pohmakotr, A. Issaree, L. Sampaongoen, P. Tuchinda and V. Reutrakul, *Tetrahedron Lett.* **2003**, *44*, 7937.
4. "Highly diastereoselective alkylation of vicinal dianions of chiral succinic acid derivatives: a new general strategy to (*R*)- β -arylmethyl- γ -butyrolactones" M. Pohmakotr, D. Soorukram, P. Tuchinda, S. Prabpai, P. Kongsaree, V. Reutrakul, *Tetrahedron Lett.* **2004**, *45*, 4315.

ผลงานวิจัยที่กำลังจะตีพิมพ์

กำลังเตรียม manuscripts และทำเพิ่มเติม

1. Synthesis of Thuriferic Acid Ethyl Ester and Analogues and Picropodophyllone คาดว่าจะ submit ไปตีพิมพ์ใน *Tetrahedron*
2. A General Synthetic Route to 1-Substituted-2,6-Diaryl-3,7-dioxabicyclo[3.3.0]octanes: Synthesis of Gmelinol คาดว่าจะ submit ไปตีพิมพ์ใน *Organic Letters*
3. Lignan glycosides from *Phyllanthus taxodiifolius* คาดว่าจะ submit ไปตีพิมพ์ใน *Planta Medica*
4. Triterpenes and alkaloids from *Phyllanthus accutissima* คาดว่าจะ submit ไปตีพิมพ์ใน *Tetrahedron*

Abstract ในการประชุมวิชาการนอกประเทศ

1. เสนอผลงานแบบ oral Communication เรื่อง "Synthetic Utilities of Vicinal Dianions of Succinic Acid Derivatives" ในการประชุม "The 7th International Symposium on Carbanion Chemistry (ISCC-7)" ที่ University of Alicante (Spain) ระหว่างวันที่ 7-11 July 2004 บทคัดย่อหมายเลข C-27

Abstract ในการประชุมวิชาการในประเทศของนักศึกษา

แบบปากเปล่า

1. เสนอผลงานของนักศึกษาแบบ oral เรื่อง "Synthetic approach to tetrasubstituted dihydrofurans and tetrahydrofurans" ในการประชุม Perch conference II ที่โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช รีสอร์ท เมืองพัทยา ชลบุรี ระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2546 บทคัดย่อหมายเลข OC-O14
2. เสนอผลงานของนักศึกษาแบบ oral เรื่อง "Dianions of α -aroylsuccinic esters: Synthesis of Thuriferic acid and analogues" ในการประชุม Perch conference II ที่โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช รีสอร์ท เมืองพัทยา ชลบุรี ระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2546 บทคัดย่อหมายเลข OC-O15

แบบโปสเตอร์

1. เสนอผลงานของนักศึกษาแบบโปสเตอร์ เรื่อง “Dianions of α -aroylsuccinic esters: Synthesis of a Podophyllotoxin Precursor” ในการประชุม Perch conference I ที่โรงแรมการ์เดนชีวิร์รีสอร์ท เมืองพัทยา ชลบุรี ระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2545 บทความหมายเลข OC-P21
2. เสนอผลงานของนักศึกษาแบบโปสเตอร์ เรื่อง “Reaction of vicinal dianion derived from triethyl ethanetricarboxylate” ในการประชุม Perch conference I ที่โรงแรมการ์เดนชีวิร์รีสอร์ท เมืองพัทยา ชลบุรี ระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2545 บทความหมายเลข OC-P24
3. เสนอผลงานของนักศึกษาแบบโปสเตอร์เรื่อง “Reaction of vicinal dianions derived from α -aroylsuccinic esters: Synthesis of some 2,6-diaryl-3,7-dioxabicyclo(3.3.0)octane-4,8-diones” ในการประชุม Perch conference II ที่โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช รีสอร์ท เมืองพัทยา ชลบุรี ระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2546 บทความหมายเลข OC-P19
4. เสนอผลงานของนักศึกษาแบบโปสเตอร์เรื่อง “Synthetic approach to furofuran lignans” ในการประชุม Perch conference III ที่โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช รีสอร์ท เมืองพัทยา ชลบุรี ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2547 บทความหมายเลข OC-P24
5. เสนอผลงานของนักศึกษาแบบโปสเตอร์เรื่อง “Isolation and structure identification of bioactive compounds form *Phyllanthus taxodiifolius*” ในการประชุม Perch conference III ที่โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช รีสอร์ท เมืองพัทยา ชลบุรี ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2547 บทความหมายเลข OC-P7

ภาคผนวก

**Vicinal Dianion of Triethyl Ethanetricarboxylate: Syntheses of
(±)-Lichesterinic Acid, (±)-Phaseolinic Acid, (±)-Nephromopsinic Acid,
(±)-Rocellaric Acid, and (±)-Dihydroprotolichesterinic Acid**

by Manat Pohmakotr*, Wacharee Harnying, Patoomratana Tuchinda, and Vichai Reutrakul

Department of Chemistry, Faculty of Science, Mahidol University, Rama 6 Road, Bangkok 10400, Thailand
(tel.: 066-02-2015158; fax: 066-02-2477050; e-mail: scmpk@mahidol.ac.th)


Dedicated to Professor *Dieter Seebach* on the occasion of his 65th birthday

The vicinal dianion **2** derived from triethyl ethanetricarboxylate reacted regioselectively with aldehydes and ketones at C(β) to provide paraconic acid derivatives **5a–f** in moderate to high yields as mixtures of diastereoisomers. The paraconic acid derivatives **5e** and **5f** were utilized as the starting materials for the syntheses of (±)-lichesterinic acid (**12**), (±)-phaseolinic acid (**13**), (±)-nephromopsinic acid (**14**), (±)-rocellaric acid (**15**), and (±)-dihydroprotolichesterinic acid (**16**).


1. Introduction. – Dianions of numerous classes of organic compounds have been reported and played important roles in organic synthesis due to their high reactivity and regioselectivity towards electrophiles [1]. The reactions of these dianions have led to the development of new synthetic methods of many classes of organic compounds. Amongst these dianions, the dianions derived from succinic acid derivatives and succinic esters were found to be versatile reagents for the preparation of various types of compounds [2–14].

The vicinal dianions of dialkyl succinates underwent mono- or dialkylation [2] [3] and condensation reactions [4] with appropriate alkylating agents to give good yields of products. We have reported that the vicinal dianion of diethyl succinate could undergo hydroxyalkylation reactions with aliphatic aldehydes and ketones to afford paraconic esters, which could be readily converted into 4-carboxy-2,3-dialkyl-substituted 2-cyclopentenones [3]. Furthermore, paraconic esters have attracted considerable interest because their basic skeletons, trisubstituted γ -butyrolactones, are found in many natural products possessing interesting biological properties.

Our previous results, concerning the reactions of diethyl succinate dianion with electrophiles [3], prompted us to study the generation of the vicinal dianion **2** and the regioselectivity towards electrophiles. This dianion has not been previously reported and is expected to be generated by double deprotonation of triethyl ethanetricarboxylate (**1**) upon treatment with appropriate bases as shown in *Scheme 1*. The reaction of the vicinal dianion **2** with carbonyl compounds would provide a new synthetic pathway to functionalized 3,4,5-trisubstituted γ -lactones of type **3**. The lactones of type **3** appear to be useful as synthetic intermediates for the synthesis of several natural α -alkyl-substituted γ -lactones, such as methylenolactocin (**10**) [15], protolichesterinic acid (**11**) [16], lichesterinic acid (**12**) [17], phaseolinic acid (**13**) [18], nephromopsinic acid (**14**) [19], rocellaric acid (**15**) [20], and dihydroprotolichesterinic acid (**16**) [21].

Scheme 1. Proposed Synthetic Route to γ -Lactone **3** by the Reaction of Dianion **2** with Carbonyl Compounds

2. Results and Discussion. – **2.1 Reaction of Dianion **2** with Carbonyl Compounds.** Dianion **2** could be easily generated by reacting triester **1** with 2 equiv. of lithium diisopropylamide (LDA) in THF at -78° for 1 h. When dianion **2** was allowed to react with 1.5 equiv. of piperonal (= 1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde) at -78° for 2 h, the resulting product mainly consisted of an adduct **4a** ($\text{R} = 1,3\text{-benzodioxol-5-yl}$; Scheme 2) accompanied by a small amount of the expected γ -lactone **5a** after acidic (1.5M HCl) workup. However, the adduct **4a** could be easily converted into γ -lactone **5a** by treatment of the crude product **4a** with a catalytic amount of *p*-toluenesulfonic acid



Scheme 2. Generation and Reactions of Dianion **2** with Aldehydes

(TsOH) in CH_2Cl_2 at room temperature. More conveniently, complete lactonization could be achieved when the reaction mixture was first quenched with AcOH at -78° and warmed to room temperature, followed by addition of a catalytic amount of TsOH and stirring at the same temperature overnight. This procedure was used as the standard condition for the reactions of the dianion **2** with other carbonyl compounds (Scheme 2).

The γ -lactone **5a** was obtained as a mixture of four diastereoisomers (*t,c*, *c,c*, *t,t*, and *c,t* isomers, *c* = *cis*, *t* = *trans*) in a ratio of 71:11:16:2 in 78% yield. The relative configurations of these compounds were assigned by their $^1\text{H-NMR}$ spectra. Attempted separation of the diastereoisomers of **5a** was performed by prep. TLC to give two bands, a less polar (14% yield) consisting of a 11:89 mixture *c,t,t,t*-**5a** and a more polar (64% yield) consisting of a 86:14 mixture of *t,c,c,c*-**5a**. The pure diastereoisomer *t,c*-**5a** could be obtained by fractional crystallization from AcOEt/hexane.

Having succeeded in preparing compound **5a**, we next investigated the reaction of dianion **2** with other aldehydes as summarized in Table 1. Moderate to high yields of γ -lactones **5a–f** could be achieved. The *cis*- and *trans*-configuration at the 4,5-positions of compounds **5a–c** and **5e,f** could be assigned by their $^1\text{H-NMR}$ data (see Table 2).

Table 1. Preparation of γ -Lactones **5a–f**

Product	R	Yield ^{a)} [%]	<i>t,c,c,t,t,c,t</i>
5a		78	71:11:16:2 ^{b)} ^{c)}
5b		81	79:4:14:3 ^{c)}
5c	Ph	78	71:6:19:4 ^{d)}
5d	^t Bu	53	(80:20) ^{e)}
5e	$\text{Me}(\text{CH}_2)_4$	55	79:6:15:trace ^{f)}
5f	$\text{Me}(\text{CH}_2)_{12}$	62	86:3:11:trace ^{f)}


^{a)} Isolated yield. ^{b)} Calculated from Fractions 1 and 2. ^{c)} Determined by $^1\text{H-NMR}$ (H–C(5)) of the isolated product. ^{d)} Determined by $^1\text{H-NMR}$ (H–C(5)) of the crude product. ^{e)} The configuration could not be assigned, and the ratio was determined by $^1\text{H-NMR}$ (H–C(3)) of the crude product. ^{f)} Determined by $^1\text{H-NMR}$ (H–C(3) and H–C(5)) of the crude product.

The coupling constants J_{en} and J_{tran} of H–C(5) (OCHAr) of **5a–c,e,f**, which appeared as *d* in the range of δ 4.46–5.97, were 5.2–8.0 and 8.9–9.3 Hz, resp. (see Table 2). The configurational assignment of the 3,4-positions of the *t,t* and *c,c* isomers could be accomplished by determining of the coupling constants of H–C(3), which appeared as *d* varying in the range δ 3.67–4.09 ($J_{tran} \approx 7.3$ –10.8 and $J_{en} \approx 7.2$ –9.5 Hz). However, the assignments of the *t,c* and *c,t* isomers were ambiguous.

To get more insight into the reaction of dianion **2**, we investigated the reaction of dianion **2** with ketones. As expected, the desired γ -lactones **5g–k** were obtained in moderate yields. The results are summarized in Table 3. The structures of compounds **5g–k** were established by their spectral data.

Table 2. Significant $^1\text{H-NMR}$ Data of γ -Lactones **5a–c** and **5e,f**

		<i>t,c</i>		<i>c,c</i>		<i>t,t</i>		<i>c,t</i>	
		H–C(3) (<i>d</i>)		H–C(4) (<i>dd</i>)		H–C(5) (<i>d</i>)			
		δ [ppm]	$J(3,4)$ [Hz]	δ [ppm]	$J(3,4), J(4,5)$ [Hz]	δ [ppm]	$J(4,5)$ [Hz]		
5a	<i>t,c</i>	4.11	7.3	4.07	7.5 (app. <i>t</i>)	5.73	7.5		
	<i>c,c</i>	–	–	–	–	5.47	5.7		
	<i>t,t</i>	3.98	10.7	3.76	10.7, 8.9	5.37	8.9		
	<i>c,t</i>	3.92	9.4	3.45	9.4 (app. <i>t</i>)	5.79	9.3		
5b	<i>t,c</i>	4.20	7.6	4.15	7.7 (app. <i>t</i>)	5.84	8.0		
	<i>c,c</i>	–	–	–	–	5.58	5.7		
	<i>t,t</i>	4.06	10.8	–	–	5.47	9.1		
	<i>c,t</i>	3.99	9.3	3.53	9.3 (app. <i>t</i>)	5.90	9.3		
5c	<i>t,c</i>	–	–	–	–	5.91	7.0		
	<i>c,c</i>	3.95	7.2	–	–	5.65	5.7		
	<i>t,t</i>	4.09	10.6	–	–	5.56	8.9		
	<i>c,t</i>	4.02	9.3	3.57	9.1 (app. <i>t</i>)	5.97	8.9		
5e	<i>t,c</i>	3.88	8.0	3.81	8.0 (app. <i>t</i>)	–	–		
	<i>c,c</i>	3.67	7.3	–	–	–	–		
	<i>t,t</i>	3.89	10.3	–	10.2, 8.6	–	–		
	<i>c,t</i>	–	9.4	–	9.2 (app. <i>t</i>)	–	–		
5f	<i>t,c</i>	3.99	8.0	3.92	7.9 (app. <i>t</i>)	–	–		
	<i>c,c</i>	3.76	7.3	–	–	4.46	5.2		
	<i>t,t</i>	3.98	10.2	3.54	10.2, 8.7	–	–		
	<i>c,t</i>	3.84	9.5	3.22	9.4 (app. <i>t</i>)	–	–		

Table 3. Preparation of γ -Lactones **5g–k**


	R^S	R^L	Yield ^{a)} [%]	3,4-Position <i>cis/trans</i> ^{b)}
5g	Me	Me	45	0:100
5h	$-(\text{CH}_2)_5-$		58	0:100
5i	Ph	Ph	41	14:86
5j	Me	Ph	39	almost <i>trans</i> ^{c)}
5k	Me	Et	37	37:63 ^{d)}

^{a)} Isolated yield. ^{b)} Determined by $^1\text{H-NMR}$ (H–C(3)). The *cis/trans* ratio of **5g–k** could be calculated from (*c,t* + *c,c*)/(*t,c* + *t,t*). ^{c)} **5j** was obtained as a mixture of four diastereoisomers, which contained predominantly only one diastereoisomer. ^{d)} **5k** was obtained as a mixture of four diastereoisomers whose ratio was determined by $^1\text{H-NMR}$ (MeCH_2C).


The *cis*- and *trans*-configuration at the 3,4-positions of **5g–k** could be assigned by the coupling constants $J(3,4)$ in the $^1\text{H-NMR}$ spectra: $J_{\text{cis}} = 6.6$ Hz and $J_{\text{trans}} = 9.3–11.7$ Hz, resp.

As summarized in *Table I*, the major isomer obtained from the reaction of dianion **2** with aldehydes was the *t,c* isomer in all cases. The observed high stereoselectivity can be explained by assuming the involvement of the (*E*)-configuration of the dienolate form of dianion **2**, i.e., (*E*)-**2**, as shown in *Scheme 3*. Our assumption was based on the well established fact that esters appear to give (*E*)-enolates [22] upon deprotonation with LDA. The relative stereochemical outcome at C(4) and C(5) of γ -lactone **5** was determined by using the models of the 6-membered transition states **6A** and **6B** of the aldol condensation of dianion (*E*)-**2** with aldehydes at -78° . Due to the less important 2,3-steric interaction between the aryl or alkyl and alkoxy groups, the transition state **6A** is more favored than the transition state **6B**. Consequently, the addition preferentially proceeds *via* the alkoxide intermediate *anti*-**7** rather than the *syn*-**7**. These alkoxides are then protonated upon hydrolysis with acid to afford the hydroxy esters **8** and **9**, respectively. Compound **8** is lactonized under thermodynamic-control conditions to give the more stable lactone *t,c*-**5** as the major isomer and the less stable lactone *c,c*-**5** as the minor isomer. Similarly, lactonization of hydroxy ester **9** leads to the formation of *t,t*-**5** and *c,t*-**5** (*Scheme 3*).

2.2. *Syntheses of* ($\pm$)-*Lichesterinic Acid* (**12**), ($\pm$)-*Phaseolinic Acid* (**13**), ($\pm$)-*Nephromopsinic Acid* (**14**), ($\pm$)-*Rocellaric Acid* (**15**), and ($\pm$)-*Dihydroprotolichesterinic Acid* (**16**). The synthesis of trisubstituted γ -butyrolactones, in particular the β -carboxy derivatives (paraconic acids), has attracted considerable attention in recent years, because of the wide range of their biological activities. Some of these compounds are methylenolactocin (**10**) [15], protolichesterinic acid (**11**) [16], lichesterinic acid (**12**) [17], phaseolinic acid (**13**) [18], nephromopsinic acid (**14**) [19], rocellaric acid (**15**) [20], and dihydroprotolichesterinic acid (**16**) [21]. Several synthetic approaches towards




Scheme 3. Proposed Transitions for the Stereochemical Course of the Addition Reactions of the Dianion **2** to Aldehydes



these molecules either in racemic or pure enantiomeric form have been developed by a number of research groups over the past decade.

Since γ -lactones of type **5** could be readily obtained by the reaction of dianion **2** with aldehydes, we herein demonstrate the synthetic utility of this type of lactones for the syntheses of some naturally occurring α,β,γ -trisubstituted γ -lactones. As proposed in *Scheme 4*, we consider compounds **17** and **18** as important intermediates in the synthetic transformation of **5** into the corresponding natural products of types **13–16** and types **11** and **12**, respectively. Both γ -lactones **17** and **18** should be easily prepared from **5** by simple base-catalyzed methylation and (phenylthio)methylation followed by oxidation, respectively. Hydrolysis followed by decarboxylation of compound **17** would afford the desired compounds of types **13–16**. Similarly, compound **18** would be transformed into the corresponding compounds of types **10–12** by a tandem hydrolytic decarboxylative desulfonylation.

Scheme 4. Proposed Synthetic Strategy to Natural Products **10–16**




2.3. α -Alkylation of α,β -Bis(ethoxycarbonyl)-Substituted γ -Lactones **5e and **5f**.** Methylation of the diastereoisomer mixtures of **5e** or **5f** could be achieved by employing MeI/NaH in THF at 0° . Good yields of the α -methylated γ -lactones **17a** and **17b** were obtained. The diastereoisomer mixture of **5e** ($t,c/(t,t+c,c)/c,t$ 70:27:3) provided compound c,c -**17a** (67% yield) and an inseparable mixture $c,t/t,t$ -**17a** (60:40)

in 23% yield, while the diastereoisomer mixture of **5f** (*t,c*/(*t,t* + *c,c*) 63:34) gave compound *c,c*-**17b** (67% yield) and an inseparable mixture *c,t/t,t*-**17b** (51:49) in 25% yield.


The *c,c*-**17** was obtained as the major isomer. This can be rationalized by the assumption that methylation of the enolate anion **19** occurs from the less-hindered side avoiding the steric interaction with the ethoxycarbonyl group at C(4) (Scheme 5). The isomers *c,c*-**17a** and **-17b** could be easily separated from the isomer mixtures of *c,t/t,t*-**17a** and **-17b** respectively, by radial chromatography on silica-gel.

Scheme 5. Base-Catalyzed Methylation of γ -Lactone **5**



The relative configuration at the 4,5-positions of **17a** and **17b** could be assigned by the coupling constants observed for H–C(4), which appeared in the ^1H -NMR spectra as *d* at δ 3.30 ($J_{\text{en}} = 6.6\text{--}6.8\text{ Hz}$) and 2.84–3.67 ($J_{\text{trans}} \approx 9.7\text{--}9.9\text{ Hz}$).


Having succeeded in preparing compounds **17**, we then prepared next α -(phenylsulfonyl)methyl- α,β -bis(ethoxycarbonyl)-substituted γ -lactones **18a** and **18b** by treatment of the γ -lactones **5e** and **5f** with $\text{PhSCH}_2\text{Cl/NaH}$ in THF at 0° in the presence of NaI, followed by oxidation with $\text{H}_2\text{O}_2/\text{AcOH}$ (Scheme 6). Thus, γ -lactone **5e** (*t,c/c,t/t,t* 82:6:11:trace) provided **18a** (98% yield) which contained mainly the *c,c* isomer and a small amount of other isomers. Similarly, γ -lactone **5f** containing mostly the *t,c* isomer and a small amount of other isomers afforded *c,c*-**18b** (88% yield) and an inseparable mixture *c,t/t,t*-**18b** (73:27; 5% yield) (Scheme 6). We assumed that the *c,c* isomer of **18** was obtained as the major isomer. This can be explained as discussed above for the formation of the *c,c* isomer of compound **17**.

Scheme 6. Preparation of α -(Phenylsulfonyl)methylated γ -Lactone **18**

2.4. Attempted Preparation of ($\pm$)-Methylenolactocin (**10**) and Preparation of ($\pm$)-Lichesterinic Acid (**12**). As proposed in Scheme 7, hydrolysis of **18a** followed by base-catalyzed elimination of the expected product **20** should afford the desired methylenolactocin (**10**). Thus, treatment of **18a** containing mainly the *c,c* isomer with 48% HBr solution under reflux for 3 h provided the desired compound **20** in 48% yield, consisting of a *t,c/c,t/t,t* isomer mixture 32:64:4. Similarly, hydrolysis of a 41:59 mixture of *t,t/c,t*-**18a** gave **20** as a 85:15 mixture of *c,t/t,t* isomers in 65% yield. Attempts to convert compound **20** to the expected methylenolactocin (**10**) under various conditions, e.g., LDA or DBU as a base in THF or CH₂Cl₂ as a solvent, were investigated. All experiments led to a complex mixture of unidentified products besides a small amount of **10** and compound **21** (R = C₅H₁₁) as revealed by the ¹H-NMR spectra.

During our investigation for the hydrolysis of **18a** to compound **20**, we found that the reaction of a diastereoisomer mixture of **18a** with LiOH (4 equiv.) in THF/H₂O under reflux for 3 h followed by stirring overnight provided butenolactone **21** (R = Me(CH₂)₄) in 69% yield. The formation of butenolactone **21** (R = Me(CH₂)₄) resulted from a tandem ester hydrolysisdecarboxylative elimination of the phenylsulfonyl group followed by isomerization of the initially formed exocyclic methylene group. By employing this advantage, ($\pm$)-lichesterinic acid (**12**) could be synthesized in 26% yield from γ -lactone **18b** (Scheme 7).


2.5. Syntheses of ($\pm$)-Phaseolinic Acid (**13**), ($\pm$)-Nephromopsinic Acid (**14**), ($\pm$)-Rocellaric Acid (**15**), and ($\pm$)-Dihydroprotolichesterinic Acid (**16**). The facile accessibility of γ -lactones *c,c*-**17a** and *c,c*-**17b** prompted us to try to convert them into the desired paraconic acids **13**–**16** by sequential hydrolysis and decarboxylation, expecting to be able to control the configurations at the 3-, 4-, and 5-positions. Thus, hydrolysis of γ -lactone *c,c*-**17a** by refluxing with 48% HBr solution for 5 h afforded an inseparable 62:38 mixture of paraconic acid **22** and ($\pm$)-phaseolinic acid (**13**) in 89% yield (Scheme 8). The same results were obtained when *c,c*-**17b** was treated with 48%

Scheme 7. Preparation of (±)-Lichesterinic Acid (**12**)

HBr solution under the same conditions; an inseparable 62:38 mixture of paraconic acid **23** and (±)-nephromopsinic acid (**14**) was obtained in 87% yield. It should be noted that under the hydrolytic conditions with 48% HBr solution, there was no isomerization at C(4) and C(5). Both (±)-phascolinic acid (**13**) and (±)-nephromopsinic acid (**14**) could be separated from paraconic acids **22** and **23**, respectively, as their methyl ester derivatives formed by dicyclohexylcarbodiimide/MeOH treatment.

Hydrolysis of *c,c*-**17b** under basic conditions was also studied using LiOH/THF/H₂O at room temperature. The reaction led to incomplete hydrolysis as revealed by the ¹H-NMR spectrum of the crude product obtained. It was found that one ethoxycarbonyl group still remained. However, when the crude product was further treated with 48% HBr solution under reflux for 5 h, a 64:36 mixture of (±)-rocellaric acid (**15**) and (±)-dihydroprotolichesterinic acid (**16**) was obtained in 80% yield (Scheme 8). The results indicated that *c,c*-**17b** was isomerized to the thermodynamically more stable 4,5-*trans* isomer by LiOH during the hydrolysis in the first step, before the ethoxycarbonyl group was hydrolyzed. Good yield (77%) of a mixture **15/16** with the same ratio was obtained when a 73:27 mixture *c,t,t*-**17b** was hydrolyzed under the same conditions (LiOH and then 48% HBr solution under reflux).

Scheme 8. Preparation of Natural Products 13–16



The separation of paraconic acids **15** and **16** from each other by chromatography was unsuccessful. Isomerization of (±)-dihydroprotolichesterinic acid (**16**) to (±)-rocellaric acid (**15**) was investigated. It was anticipated that this isomerization was successful by treatment of a 66:34 mixture **15/16** with 2 equiv. of LDA in THF at 0 °C for 1 h, followed by quenching with AcOH. The resulting product was a 89:11 mixture **15/16**. The major isomer, (±)-rocellaric acid (**15**), was separated by fractional crystallization (AcOEt) in 72% yield, whereas the minor (±)-dihydroprotolichesterinic acid (**16**) could not be separated in pure form. However, **16** could be isolated as its methyl ester.

3. Conclusions. – We demonstrated that the reaction of dianion **2** with carbonyl compounds afforded the expected paraconic acids **5a–k** as mixtures of diastereoisomers containing the *t,c*-isomer as the major isomer. Moreover, paraconic acids **5e** and **5f** could be used as starting materials for the syntheses of the natural products (±)-lichesterinic acid (**12**), (±)-phaseolinic acid (**13**), (±)-nephromopsinic acid (**14**), (±)-rocellaric acid (**15**), and (±)-dihydroprotolichesterinic acid (**16**). The desired natural compounds **13–16** could be prepared with retention of configuration at C(4) and C(5) by hydrolysis of the corresponding paraconic acid **17** (*c,c* isomer) and **17** (*c,t,t,t* isomers) (obtained by methylation of **5e** and **5f**) in refluxing 48% HBr solution. The products

13–16 were separated as their methyl esters. ($\pm$)-Lichesterinic acid (**12**) was prepared by treatment of α -(phenylsulfonyl)methyl]- γ -lactone **18b** with LiOH in THF/H₂O. However, attempted synthesis of ($\pm$)-methylenolactocin (**10**) by elimination of the phenylsulfonyl group from compound **18a** was unsuccessful.

We thank the *Thailand Research Fund* for financial support (BRG/22/2544) to M. P. and the award of a *Senior Research Scholar* to V. R. W. H. is grateful to the *Development and Promotion of Science and Technology Talent Project (DSPT)* for a scholarship. Thanks are also made to the *Higher Education Development Project*, Postgraduate Education and Research Program in Chemistry, for partial support.

Experimental Part

1. General. THF was distilled from sodium-benzophenone ketyl (sodium oxidodiphenylmethyl). The molarity of BuLi (in hexane) was determined by titration with diphenylacetic acid in THF at 0 °C. Pr_2NH was distilled over CaH_2 ; CH_2Cl_2 and acetone were distilled over P_2O_5 . All glasswares and syringes were oven-dried and kept in a desiccator before use. Radial chromatography: plates prepared with Merck silica-gel PF_{254} containing $\text{CaSO}_4 \cdot 1/2 \text{H}_2\text{O}$ type 60 (TLC Art. 7749), prep. plates with Merck silica-gel 60 (PF_{254} , Art. 7747). FC = flash column chromatography. M.p.: Büchi 501 melting-point apparatus, uncorrected. IR Spectra: Jasco A-302 or Perkin-Elmer 683 spectrometer; in cm^{-1} . NMR Spectra: Bruker DPX-300 (^1H at 300 MHz, ^{13}C at 75 MHz) or Bruker DPX-400 (^1H at 400 MHz) spectrometer; in CDCl_3 with SiMe_4 as internal standard; chemical shifts δ in ppm downfield from SiMe_4 , J in Hz. MS: Finnigan MAT mass spectrometer; in m/z (rel. %). Elemental analyses: Perkin-Elmer elemental analyzer 2400 CHN.

2. Generation and Reactions of Dianion 2 with Carbonyl Compounds. Diethyl 2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)tetrahydro-5-oxofuran-3,4-dicarboxylate (**5a**): General Procedure (G.P.). A soln. of triethyl 1,1,2-ethanetricarboxylate (493 mg, 2.0 mmol) in THF (2 ml) was added dropwise at -78° to a THF soln. of lithium diisopropylamide (LDA) under Ar (prepared by reacting Pr_2NH (0.7 ml, 5 mmol) in THF (8 ml) with 1.25M BuLi in hexane (3.5 ml, 4.4 mmol) at -78° for 30 min). After stirring at -78° for 1 h, a THF (2 ml) soln. of piperonal (1.3813 g, 2.5 mmol) was added dropwise to the pale yellow soln. of the dianion **2**. Stirring was continued at -78° for 2 h, then the reaction was quenched with AcOH (4 ml). The resulting mixture was warmed to r.t., and TsOH (monohydrate) was added as a catalyst. After stirring overnight, the mixture was diluted with H_2O (50 ml) and extracted with AcOEt (3 $\times$ 30 ml). The combined org. layer was washed with 10% NaHCO_3 soln., H_2O , and brine, dried (Na_2SO_4), and evaporated, and the crude product purified by prep. TLC (SiO_2 , 20% AcOEt/hexane; double runs) to give two bands of **5a** (Fr. 1 and 2).

Fr. 1 (less polar) yielded a yellow viscous liquid; *c,t,t*-**5a** 11:89 (96 mg, 14%). IR (neat): 2984m, 2939m, 2907m, 1789s, 1738s, 1633w, 1612m, 1506s, 1493s, 1449s, 1398m, 1374m, 1303s, 1253s, 1197s, 1160s, 1038s, 929m, 859m, 815m, 705m. ^1H -NMR (300 MHz, CDCl_3): 6.88–6.70 (m, 3 arom. H); 5.92 (*t,t*) and 5.91 (*c,t*) (each s, OCH_2O): 5.79 (*c,t*), 5.37 (*t,t*) (each d, $J = 9.25$ and 8.9, resp., OCHAr): 4.24 (*q*, $J = 7.2$, OCH_2Me of *t,t*); 4.20–4.05 (m, 2 OCH_2Me of *c,t* and OCH_2Me of *t,t*); 3.98 (*t,t*) and 3.92 (*c,t*) (each d, $J = 10.7$ and 9.4, resp., O_2CCHCO_2); 3.76 (*dd*, $J = 10.7$, 8.9, CHCO_2Et of *t,t*); 3.45 (app. *t*, $J = 9.4$, CHCO_2Et of *c,t*); 1.27 (app. *t*, $J = 7.2$, OCH_2Me); 1.16 (app. *t*, $J = 7.2$, OCH_2Me). ^{13}C -NMR (75 MHz, CDCl_3): 169.1 (C=O); 168.9 (C=O); 166.2 (C=O); 148.3 (C); 148.1 (C); 130.6 (C, *c,t*) and 130.4 (C, *t,t*); 120.5 (CH, *c,t*), 120.4 (CH, *t,t*); 108.2 (CH, *t,t*) and 108.1 (CH, *c,t*); 106.6 (CH, *c,t*), 106.5 (CH, *t,t*); 101.4 (OCH_2O , *t,t*) and 101.3 (OCH_2O , *c,t*); 63.6 (OCH_2 , *c,t*), 62.6 (OCH_2 , *t,t*); 62.0 (OCH_2 , *t,t*), 61.6 (OCH_2 , *c,t*); 51.9 (CH, *t,t*), 51.5 (CH, *c,t*); 50.6 (CH, *t,t*), 50.5 (CH, *c,t*); 13.9 (Me, *t,t*) and 13.8 (Me, *c,t*); 13.88 (Me).

Fr. 2 (more polar) yielded a pale yellow solid; *t,c/c,c*-**5a** 86:14 (448 mg, 64%). ^1H -NMR (300 MHz, CDCl_3): 6.82–6.63 (m, 3 arom. H); 5.91 (*t,c*) and 5.90 (*c,c*) (each s, OCH_2O): 5.73 (*t,c*), 5.37 (*c,c*) (each d, $J = 7.5$ and 5.7, resp., OCHAr): 4.24 (app. *q*, $J = 7.2$, OCH_2Me of *t,c* and *c,c*); 4.11 (*d*, $J = 7.3$, O_2CCHCO_2 of *t,c*); 4.07 (app. *t*, $J = 7.5$, CHCO_2Et of *t,c*); 3.91–3.71 (m, OCH_2Me of *t,c* and OCH_2Me , COCHCO_2 , and CHCO_2Et of *c,c*); 1.28 (*t,c*) and 1.27 (*c,c*) (each *t*, $J = 7.2$ and 7.4, resp., OCH_2Me); 0.95 (*t,c*) and 0.94 (*c,c*) (each *t*, $J = 7.2$ and 7.7, resp., OCH_2Me).

The pale yellow solid obtained from the Fr. 2 (diastereoisomer mixture) was recrystallized from AcOEt/hexane to give pure *t,c*-**5a**. White solid. M.p. 84–85 °C. IR (nujol): 3071w, 3046w, 2989s, 1797s, 1728s, 1610w, 1505s, 1486m, 1448s, 1413m, 1369s, 1324s, 1261s, 1238s, 1213s, 1199s, 1141s, 1043s, 1018s, 939m, 908m, 871m, 805m. ^1H -NMR (400 MHz, CDCl_3): 6.80 (*d*, $J = 8.0$, 1 arom. H); 6.74 (*d*, $J = 8.0$, 1 arom. H); 6.72 (s, 1 arom. H); 5.99 (s, OCH_2O); 5.82 (*d*, $J = 8.0$, OCHAr); 4.32 (*q*, $J = 7.2$, 1 OCH_2Me); 4.19 (*d*, $J = 7.2$, O_2CCHCO_2); 4.15 (app. *t*,

$J = 7.6$, CHCO_2Et): 3.98–3.81 (m , 1 OCH_2Me); 1.37 (t , $J = 7.2$, OCH_2Me); 1.04 (t , $J = 7.2$, 1 OCH_2Me). ^{13}C -NMR (75 MHz, CDCl_3): 169.8 (C=O); 168.1 (C=O); 166.1 (C=O); 148.1 (C); 147.8 (C); 128.3 (C); 119.7 (CH); 108.1 (CH); 106.2 (CH); 101.3 (OCH_2O); 79.9 (OCHAr); 62.7 (CH_2O); 61.6 (CH_2O); 49.8 (CH); 48.4 (CH); 13.9 (Me); 13.6 (Me). EI-MS: 350 (100, M^+), 321 (0.83), 304 (13), 287 (2), 275 (9), 259 (10), 247 (4), 230 (19), 215 (4), 203 (27), 190 (12), 173 (17), 149 (85), 127 (79), 99 (69), 93 (6), 71 (4), 65 (10), 53 (8), 45 (4). Anal. calc. for $\text{C}_{17}\text{H}_{18}\text{O}_8$ (350.33): C 58.29, H 5.18; found: C 58.20, H 5.13.

Diethyl Tetrahydro-2-(4-methoxyphenyl)-5-oxofuran-3,4-dicarboxylate (5b). According to the *G.P.* with dianion **2** (2.0 mmol) in THF (10 ml) and the THF (5 ml) soln. of anisaldehyde (384 mg, 2.8 mmol). The crude product was purified by prep. TLC (SiO_2 , 20% AcOEt/hexane; double runs): 79:4:14:3 mixture *t,c,c,t,t,c,t-5b* (545 mg, 81%). Pale yellow solid. ^1H -NMR (300 MHz, CDCl_3): 7.37–7.24 (m , 2 arom. H of *c,t,c,c*, and *t,t*); 7.16 (d , $J = 8.7$, 2 arom. H of *t,c*); 6.93, 6.87 (each app. d , $J = 8.7$, 2 arom. H); 5.90 (*c,t*), 5.84 (*t,c*), 5.58 (*c,c*), 5.47 (*t,t*) (each d , $J = 9.3$, 7.8, 5.7, and 9.1, resp., OCHAr); 4.30 (q , $J = 7.2$, OCH_2Me of *t,c*); 4.35–4.10 (m , 2 OCH_2Me of *c,t* and *t,t*, OCH_2Me of *c,c*); 4.20 (*t,c*), 4.06 (*t,t*), 3.99 (*c,t*) (each d , $J = 7.6$, 10.8, and 9.3, resp., COCHCO); 4.15 (*t,c*), 3.53 (*c,t*) (each app. t , $J = 7.7$ and 9.3, resp., CHCO_2Et); 3.95–3.69 (m , OCH_2Me of *t,c*, OCH_2Me , COCHCO and CHCO_2Et of *c,c*, CHCO_2Et of *t,t*, OMe of *c,t*, *c,c*, and *t,t*); 3.79 (*s*, OMe of *t,c*); 1.35 (*t,c*), 1.34 (*c,t* and *t,t*), 1.29 (*c,c*) (each t , $J = 7.2$, OCH_2Me); 1.24 (*c,t*), 1.22 (*t,t*), 0.95 (*t,c*), 0.92 (*c,c*) (each t , $J = 7.2$, 7.2, 7.2, and 7.6, resp., OCH_2Me).

The pale yellow solid of diastereoisomer mixture **5b** was recrystallized from AcOEt/hexane: pure *t,c-5b*. White solid. M.p. 82–83°. IR (nujol): 1801s, 1740s, 1693w, 1614m, 1581w, 1516m, 1454m, 1326s, 1304m, 1257m, 1241m, 1215m, 1181m, 1137m, 1015m, 968m, 847m, 806m. ^1H -NMR (400 MHz, CDCl_3): 7.18 (d , $J = 8.8$, 1 arom. H); 6.90 (d , $J = 8.8$, 1 arom. H); 5.87 (d , $J = 8.0$, OCHAr); 4.33 (q , $J = 7.2$, OCH_2Me); 4.22 (d , $J = 7.2$, O_2CCHCO_2); 4.18 (app. t , $J = 7.8$, CHCO_2Et); 3.94–3.72 (m , OCH_2Me); 3.82 (*s*, ArOMe); 1.37 (t , $J = 7.2$, OCH_2Me); 0.98 (t , $J = 7.2$, OCH_2Me). ^{13}C NMR (75 MHz, CDCl_3): 170.0 (C=O); 168.3 (C=O); 166.3 (C=O); 160.1 (C); 127.3 (CH, 2 peaks merged); 126.6 (C); 113.9 (CH, 2 peaks merged); 80.0 (OCHAr); 62.7 (OCH_2); 61.5 (OCH_2), 55.2 (OMe); 49.8 (CH); 48.5 (CH); 13.6 (Me). EI-MS: 336 (29, M^+), 318 (2), 307 (1), 289 (8), 273 (1), 263 (9), 245 (5), 233 (2), 216 (10), 200 (40), 189 (17), 173 (22), 154 (32), 145 (18), 135 (81), 127 (100), 99 (93), 92 (7), 77 (22), 63 (6), 55 (13), 43 (6). Anal. calc. for $\text{C}_{17}\text{H}_{16}\text{O}_7$ (336.35): C 60.71, H 5.99; found: C 60.38, H 5.78.

Diethyl Tetrahydro-2-oxo-5-phenylfuran-3,4-dicarboxylate (5c). According to the *G.P.* with dianion **2** (2.0 mmol) in THF (10 ml) and a THF (2 ml) soln. of benzaldehyde (0.3 ml, 2.97 mmol). The crude product, a 71:6:19:4 mixture *t,c,c,t,t,t,c-5c*, was purified by radial chromatography (SiO_2 , 8% AcOEt/hexane): 68:11:18:3 mixture *t,c,c,t,t,t,c-5c* (478 mg, 78%). Pale yellow liquid. ^1H -NMR (400 MHz, CDCl_3): 7.48–7.24 (m , 5 arom. H); 5.97 (*c,t*), 5.91 (*t,c*), 5.65 (*c,c*) and 5.56 (*t,t*) (each d , $J = 8.9$, 7.0, 5.7, and 8.9, resp., OCHAr); 4.33 (q , $J = 7.1$, OCH_2Me of *t,c*); 4.31–4.12 (m , COCHCO and CHCO_2Et of *t,c*, 2 OCH_2Me of *c,t* and *t,t*, and OCH_2Me of *c,c*); 4.09 (*t,t*), 4.02 (*c,t*), 3.95 (*c,c*) (each d , $J = 10.6$, 9.3, and 7.2, resp., COCHCO); 3.92–3.67 (m , OCH_2Me of *t,c*, OCH_2Me and CHCO_2Et of *c,c*, CHCO_2Et of *t,t*); 3.57 (*t*, CHCO_2Et of *c,t*); 1.37 (*t,c*), 1.35 (*c,t* and *t,t*), 1.32 (*c,c*) (each t , $J = 7.2$, 7.2, and 7.2, resp., OCH_2Me); 1.28 (*c,t*), 1.25 (*t,t*), 0.92 (*t,c*), and 0.87 (*c,c*) (each t , $J = 7.0$, 7.1, 7.2, and 7.2, resp., OCH_2Me).

Attempted separation of the diastereoisomers was made by prep. TLC (SiO_2 , 20% AcOEt/hexane; double runs) to give two bands of **5c** (*Fr. 1* and *2*).

Fr. 1 (less polar) yielded *c,t,t,t-5c* (9:91) contaminated with a small amount of *t,c-5c*. IR (neat): 3067m, 3038m, 2985m, 2940m, 2909m, 1789s, 1738s, 1498m, 1458m, 1372m, 1354m, 1305s, 1256s, 1213s, 1199s, 1157s, 1020s, 976m, 918m, 857m, 760m, 701s. ^1H -NMR (300 MHz, CDCl_3): 7.46–7.35 (m , 5 arom. H); 5.96 (*c,t*), 5.54 (*t,t*) (each d , $J = 9.0$ and 8.8, resp., OCHAr); 4.34–4.15 (m , 2 OCH_2Me); 4.07 (*t,t*), 4.00 (*c,t*) (each d , $J = 10.8$ and 9.4, resp., COCHCO); 3.87 (dd , $J = 10.4$, 8.9, CHCO_2Et of *t,t*); 3.55 (app. t , $J = 9.1$, CHCO_2Et of *c,t*); 1.33 (app. t , $J = 7.2$, OCH_2Me); 1.24 (app. t , $J = 7.2$, OCH_2Me). ^{13}C -NMR (75 MHz, CDCl_3): major isomer *t,t-5c*: 169.2 (C=O); 169.1 (C=O); 166.2 (C=O); 136.8 (C); 129.2 (CH); 128.7 (CH); 126.1 (CH); 80.8 (OCH); 62.6 (OCH_2); 62.0 (OCH_2); 51.9 (CH); 50.6 (CH); 13.92 (Me); 13.89 (Me).

Fr. 2 (more polar) yielded a 95:5 mixture of the major *t,c-5c* contaminated with a small amount of *c,c-* and *t,t-5c*. Pale yellow liquid. IR (neat): 3066w, 3036w, 2985m, 2940m, 2907m, 1791s, 1733s, 1607w, 1498m, 1457m, 1400m, 1382m, 1372m, 1314s, 1214s, 1159s, 1097m, 1020s, 964m, 855m, 752m, 700s. ^1H -NMR (300 MHz, CDCl_3): 7.41–7.20 (m , 5 arom. H); 5.89 (d , $J = 7.6$, OCHAr); 4.31 (q , $J = 7.1$, OCH_2Me); 4.20–4.13 (m , COCHCO , CHCO_2Et); 3.89–3.64 (m , OCH_2Me); 1.35 (t , $J = 7.2$, OCH_2Me); 0.90 (t , $J = 7.2$, OCH_2Me). ^{13}C -NMR (75 MHz, CDCl_3): major isomer *t,c-5c*: 169.9 (C=O); 168.1 (C=O); 166.1 (C=O); 134.6 (C); 129.0 (CH); 128.3 (CH, 2 peaks merged); 125.7 (CH, 2 peaks merged); 80.0 (OCHAr); 62.6 (OCH_2); 61.4 (OCH_2); 49.7 (CH); 48.9 (CH); 13.8 (Me); 13.2 (Me). EI-MS: 306 (15, M^+), 278 (0.33), 260 (22), 243 (1), 232 (29), 215 (5), 203 (4),

186 (32), 173 (47), 159 (33), 145 (13), 127 (70), 115 (65), 105 (100), 99 (97), 91 (12), 82 (16), 77 (52), 63 (8), 51 (19), 45 (7). Anal. calc. for $C_{16}H_{18}O_6$ (306.32): C 62.74, H 5.92; found: C 62.56, H 5.90.

Diethyl 2-(tert-Butyl)tetrahydro-5-oxofuran-3,4-dicarboxylate (5d). According to the G.P., with dianion **2** (2.0 mmol) in THF (10 ml) and a THF (2 ml) soln. of pivaldehyde (231 mg, 2.7 mmol). The crude product, a 80:20 mixture of two diastereoisomers, was purified by prep. TLC (SiO_2 , 20% AcOEt/hexane; multiple runs): **5d** (305 mg, 53%) as a 79:21 mixture of two diastereoisomers. Colorless liquid. IR (neat): 2981s, 2910m, 2879m, 1792s, 1737s, 1482m, 1448m, 1407m, 1385m, 1371s, 1330s, 1275s, 1249s, 1196s, 1180s, 1159s, 1095m, 1029s, 1001s, 931m, 861m, 682m. 1H -NMR (300 MHz, $CDCl_3$): 4.51 (app. *d*, *J* = 7.2, CHO of the major diastereoisomer); 4.34–4.06 (*m*, 2 OCH_2Me and CH of the minor diastereoisomer); 3.97 (major), 3.76 (minor) (each *d*, *J* = 6.0 and 6.5, resp., $COCHCO$); 3.80 (app. *t*, *J* = 6.6, $CHCO_2Et$ of the major diastereoisomer); 3.54 (*dd*, *J* = 6.5, 4.6, $CHCO_2Et$ of the minor diastereoisomer); 1.35–1.23 (*m*, 2 OCH_2Me); 1.05 (minor), 1.02 (major) (each *s*, tBu). ^{13}C -NMR (75 MHz, $CDCl_3$): 169.8 ($C=O$); 169.7 ($C=O$); 166.1 ($C=O$); 87.3 (OCH , major), 86.1 (OCH , minor); 62.5 (OCH_2 , major), 61.8 (OCH_2 , minor); 61.7 (OCH_2 , major), 61.3 (OCH_2 , minor); 50.7 (CH , major), 50.3 (CH , minor); 46.7 (CH , major), 46.4 (CH , minor); 34.7 (C , major), 33.3 (C , minor); 25.5 (Me); 13.9 (Me); 13.6 (Me , major), 13.5 (Me , minor). EI-MS: 287 (1.3, $[M+1]^+$), 271 (1), 253 (0.37), 241 (15), 230 (85), 213 (11), 201 (17), 195 (7), 183 (49), 173 (32), 157 (65), 137 (6), 127 (47), 111 (17), 99 (44), 84 (18), 71 (17), 57 (100), 41 (66). Anal. calc. for $C_{14}H_{22}O_6$ (286.33): C 58.73, H 7.75; found: C 58.68, H 8.05.

Diethyl Tetrahydro-2-oxo-5-pentylfuran-3,4-dicarboxylate (5e). According to the G.P., with dianion **2** (5.0 mmol) in THF (25 ml) and a THF (5 ml) soln. of hexanal (0.76 ml, 6.2 mmol). The crude product, a 79:6:15:trace mixture *t,c/c,t,t/c,t,t*-**5e**, was purified by FC (SiO_2 , 10% AcOEt/hexane): 82:6:11:trace mixture *t,c/c,t,t/c,t,t*-**5e** (826 mg, 55%). Colorless liquid. IR (neat): 2958s, 2936s, 2873m, 1790s, 1738s, 1468m, 1371m, 1305s, 1256s, 1177s, 1021s, 858m, 730m. 1H -NMR (300 MHz, $CDCl_3$): 4.74–4.67 (*m*, CHO of *t,c*); 4.41 (*dt*, *J* = 4.1, 8.4, CHO of *t,t*); 4.40–4.35 (*m*, CHO of *c,c*); 4.24–4.08 (*m*, 2 OCH_2Me); 3.89 (*t,t*); 3.88 (*t,c*); 3.67 (*c,c*) (each *d*, *J* = 10.1, 8.0, and 7.3, resp., $COCHCO$); 3.81 (app. *t*, *J* = 8.0, $CHCO_2Et$ of *t,c*); 3.48–3.41 (*m*, $CHCO_2Et$ of *c,c* and *t,t*); 1.84–1.14 (*m*, $(CH_2)_4$, 2 OCH_2Me); 0.82–0.77 (*m*, $(CH_2)_4Me$). ^{13}C -NMR (75 MHz, $CDCl_3$, major isomer *t,c-5e*): 169.8 ($C=O$); 168.9 ($C=O$); 166.4 ($C=O$); 79.1 (OCH); 62.5 (OCH_2); 61.8 (OCH_2); 48.7 (CH); 47.7 (CH); 31.3 (CH_2); 31.2 (CH_2); 25.1 (CH_2); 22.3 (CH_2); 14.0 (Me); 13.9 (Me); 13.8 (Me). EI-MS: 301 (1.4, $[M+1]^+$), 300 (0.89, M^+), 285 (0.55), 273 (0.32), 254 (28), 237 (9), 227 (57), 218 (1.4), 209 (12), 201 (27), 183 (100), 173 (72), 169 (69), 155 (48), 145 (17), 137 (20), 127 (98), 109 (31), 99 (92), 81 (28), 71 (19), 67 (20), 55 (48), 43 (36), 32 (14). Anal. calc. for $C_{15}H_{22}O_6$ (300.36): C 59.99, H 8.05; found: C 59.96, H 7.99.

Attempted separation of the diastereoisomers was made by FC (SiO_2 , 8% AcOEt/hexane) to provide *Fr. 1* and *2* of **5e**.

Fr. 1 (less polar) yielded a 5:29:3:63 mixture *c,t/t,c/c,t,t*-**5e** contaminated with a small amount of the starting material. Pale yellow liquid. 1H -NMR (400 MHz, $CDCl_3$): 4.94 (*c,t*), 4.52 (*t,t*) (each *dt*, *J* = 3.2, 9.0, and 4.1, 8.4, resp., CHO); 4.81 (*t,c*), 4.47 (*c,c*) (each *m*, CHO); 4.35–4.14 (*m*, 2 OCH_2Me); 4.00 (*t,c*), 3.99 (*t,t*), 3.86 (*c,t*), 3.75 (*c,c*) (each *d*, *J* = 8.4, 10.1, 8.0, and 7.3, resp., $COCHCO$); 3.93 (*t,c*), 3.23 (*c,t*) (each *t*, *J* = 7.9 and 9.2, $CHCO_2Et$); 3.56 (app. *dd*, *J* = 10.2, 8.6, $CHCO_2Et$ of *c,c* and *t,t*); 2.00–1.20 (series of *m*, $(CH_2)_4$, 2 OCH_2Me); 0.90 (*m*, $(CH_2)_4Me$).

Fr. 2 (more polar) yielded the major diastereoisomer *t,c-5e* contaminated with a small amount of *c,c-* and *t,t-5e*. Colorless liquid. 1H -NMR (400 MHz, $CDCl_3$): 4.81 (*m*, CHO); 4.29 (*q*, *J* = 7.2, OCH_2Me); 4.24 (*dq*, *J* = 1.4, 7.1, OCH_2Me); 3.99 (*d*, *J* = 8.3, $COCHCO$); 3.92 (*t*, *J* = 7.9, $CHCO_2Et$); 1.96–1.24 (series of *m*, $(CH_2)_4$, 2 OCH_2Me); 0.90 (*m*, $(CH_2)_4Me$).

Diethyl Tetrahydro-2-oxo-5-tridecylfuran-3,4-dicarboxylate (5f). According to the G.P., with dianion **2** (2.0 mmol) in THF (10 ml) and a THF (2 ml) soln. of tetradecanal (571 mg, 2.7 mmol). The crude product, a 86:3:11:trace mixture *t,c/c,t,t/c,t,t*-**5f**, was purified by FC (SiO_2 , 10% AcOEt/hexane): 87:3:10:trace mixture *t,c/c,t,t/c,t,t*-**5f** (513 mg, 62%). Colorless liquid. 1H -NMR (400 MHz, $CDCl_3$): 4.83–4.77 (*m*, CHO of *t,c*); 4.51 (*t,t*), 4.46 (*c,c*) (each *dt*, *J* = 4.0, 8.4, and 5.2, 8.7, resp., CHO); 4.34–4.18 (*m*, 2 OCH_2Me); 3.99 (app. *d*, *J* = 8.0, $COCHCO$ of *t,c* and *t,t*); 3.92 (app. *t*, *J* = 7.9, $CHCO_2Et$ of *t,c*); 3.76 (*d*, *J* = 7.3, $COCHCO$ of *c,c*); 3.59–3.52 (*m*, $CHCO_2Et$ of *c,c* and *t,t*); 1.95–1.18 (*m*, $(CH_2)_{12}$, 2 OCH_2Me); 0.89 (app. *t*, *J* = 6.8, $(CH_2)_{12}Me$).

Attempted separation of the diastereoisomers was performed by FC (SiO_2 , 5% AcOEt/hexane) to provide *Fr. 1* and *2* of **5f**.

Fr. 1 (less polar) yielded a 92:8 mixture of *t,t/c,t,t-5f*. Colorless liquid. 1H -NMR (400 MHz, $CDCl_3$): 4.92 (*m*, CHO of *c,t*); 4.50 (*dt*, *J* = 4.0, 8.2, CHO of *t,t*); 4.30 (*q*, *J* = 7.2, OCH_2Me); 4.23 (*q*, *J* = 7.2, OCH_2Me); 3.98 (*t,t*).

3.84 (*c,t*) (each *d*, *J* = 10.2 and 9.5, resp., COCHCO); 3.54 (*dd*, *J* = 10.2, 8.7, *CHCO*₂Et of *t,t*); 3.22 (*t*, *J* = 9.4, *CHCO*₂Et of *c,t*); 1.94–1.20 (series of *m*, (CH₂)₁₂, 2 OCH₂Me); 0.88 (app. *t*, *J* = 6.6, (CH₂)₁₂Me).

Fr. 2 (more polar) yielded a colorless liquid of a mixture of the starting material and the desired *t,c/c,c* + *t,t*-**5f** as a 81:19 diastereoisomer mixture, which could not be separated by FC. However, the product could be separated from the starting material by distillation at 126°/0.5 Torr. The same diastereoisomer ratio *t,c/c,c* + *t,t*-**5f** was obtained as prior to the distillation. IR (neat): 2925s, 2854s, 1790s, 1738s, 1467m, 1371m, 1303m, 1258m, 1177s, 1097m. ¹H-NMR (400 MHz, CDCl₃; major isomer *t,c*-**5f**): 4.81 (*m*, CHO); 4.33–4.18 (*m*, 2 OCH₂Me); 3.98 (*d*, *J* = 8.0, COCHCO); 3.91 (*t*, *J* = 7.8, *CHCO*₂Et); 1.62–1.22 (*m*, (CH₂)₁₂, 2 OCH₂Me); 0.88 (*m*, (CH₂)₁₂Me). ¹³C-NMR (75 MHz, CDCl₃; the major isomer *t,c*-**5f**): 169.8 (C=O); 168.9 (C=O); 166.4 (C=O); 79.1 (OCH); 62.6 (OCH₂); 61.8 (OCH₂); 48.7 (CH); 47.8 (CH); 31.9 (CH₂); 31.4 (CH₂); 29.7 (CH₂); 29.6 (CH₂, 2 peaks merged); 29.5 (CH₂); 29.4 (CH₂); 29.3 (CH₂, 2 peaks merged); 29.1 (CH₂); 25.5 (CH₂); 22.7 (CH₂); 14.1 (Me, 2 peaks merged); 14.0 (Me). EI-MS: 412 (2, *M*⁺), 367 (7), 339 (100), 311 (1), 293 (6), 281 (39), 247 (2), 229 (7), 218 (4), 201 (6), 183 (16), 173 (17), 155 (8), 145 (9), 127 (22), 109 (7), 99 (20), 95 (11), 81 (13), 69 (13), 55 (27), 43 (31), 32 (40). Anal. calc. for C₂₅H₃₀O₆ (412.58): C 66.96, H 9.77; found: C 66.93, H 10.04.

Diethyl Tetrahydro-2,2-dimethyl-5-oxofuran-3,4-dicarboxylate (5g). According to the *G.P.*, with dianion **2** (2.0 mmol) in THF (10 ml) and a soln. of 1.0M acetone in THF (3.0 ml, 3.0 mmol). The crude product was purified by prep. TLC (SiO₂, 30% AcOEt/hexane): **5g** (230 mg, 45%). Colorless liquid IR (neat): 2985s, 2941m, 1784s, 1738s, 1467m, 1448m, 1378s, 1323s, 1292s, 1220s, 1183s, 1162s, 1115s, 1030s, 953m, 907m, 858m, 693m. ¹H-NMR (300 MHz, CDCl₃): 4.19–4.03 (*m*, 2 OCH₂Me); 4.03 (*d*, *J*_{trans} = 11.6, COCHCO); 3.58 (*d*, *J*_{trans} = 11.6, *CHCO*₂Et); 1.56 (*s*, MeC), 1.21 (*t*, *J* = 7.4, OCH₂Me), 1.19 (*s*, MeC), 1.18 (*t*, *J* = 7.4, OCH₂Me). ¹³C-NMR (75 MHz, CDCl₃): 168.5 (C=O); 168.2 (C=O); 166.3 (C=O); 82.9 (OC); 62.2 (OCH₂); 61.7 (OCH₂); 53.5 (CH); 49.0 (CH); 27.9 (CH); 23.2 (Me); 13.8 (Me); 13.78 (Me). EI-MS: 259 (11, [*M* + 1]⁺), 243 (17), 230 (0.6), 213 (17), 197 (54), 185 (9), 169 (18), 151 (8), 141 (100), 127 (30), 113 (34), 99 (23), 82 (4), 67 (8), 55 (5), 43 (13), 30 (1). Anal. calc. for C₁₂H₁₈O₆ (258.28): C 55.81, H 7.03; found: C 55.82, H 7.35.

Diethyl 2-Oxo-1-oxaspiro[4.5]decane-3,4-dicarboxylate (5h). According to the *G.P.*, with dianion **2** (2.0 mmol) in THF (10 ml) and a THF (2 ml) soln. of cyclohexanone (263 mg, 2.7 mmol). The crude product was purified by FC (SiO₂, 8% AcOEt/hexane): **5h** (344 mg, 58%). M.p. 47–48° (from Et₂O/hexane). White solid. IR (neat): 2983m, 2940s, 1784s, 1738s, 1465m, 1450m, 1376s, 1322s, 1299s, 1265s, 1219s, 1186s, 1125s, 1029s, 960s, 921m, 863m, 720m. ¹H-NMR (300 MHz, CDCl₃): 4.30–4.19 (*m*, 2 OCH₂Me); 4.18 (*d*, *J*_{trans} = 11.5, COCHCO); 3.59 (*d*, *J*_{trans} = 11.5, *CHCO*₂Et); 2.03–1.90, 1.80–1.58 (2 sets of *m*, (CH₂)₈); 1.34 (*t*, *J* = 7.0, OCH₂Me) 1.32 (*t*, *J* = 7.2, OCH₂Me). ¹³C-NMR (75 MHz, CDCl₃): 168.6 (C=O); 168.2 (C=O); 166.4 (C=O); 84.4 (O–C); 62.1 (OCH₂); 61.6 (OCH₂); 53.9 (CH); 48.7 (CH); 36.7 (CH₂); 32.1 (CH₂); 24.5 (CH₂); 22.2 (CH₂); 21.1 (CH₂); 13.9 (Me); 13.8 (Me). EI-MS: 298 (7, *M*⁺), 252 (100), 234 (28), 224 (29), 206 (60), 181 (84), 167 (23), 161 (13), 151 (24), 135 (40), 127 (70), 107 (20), 99 (66), 91 (13), 79 (21), 69 (16), 55 (23), 41 (10). Anal. calc. for C₁₄H₂₂O₆ (298.34): C 60.39, H 7.43; found: C 60.18, H 7.72.

Diethyl Tetrahydro-5-oxo-2,2-diphenylfuran-3,4-dicarboxylate (5i). According to the *G.P.*, with dianion **2** (2.0 mmol) in THF (10 ml) and a THF (2 ml) soln. of benzophenone (457 mg, 2.5 mmol). The crude product was purified by prep. TLC (SiO₂, 8% AcOEt/hexane: double runs) to give a pale yellow viscous liquid of **5i** (307 mg, 41%) as a 86:14 *trans/cis* mixture, which was crystallized from AcOEt/hexane to afford a white solid (115 mg) as a 66:34 *trans/cis* mixture. M.p. 95–96°. IR (neat): 3060m, 3025m, 2955s, 1806s, 1747s, 1727s, 1599w, 1494m, 1448s, 1377s, 1349m, 1310s, 1250s, 1235s, 1219s, 1183s, 1165s, 1110m, 1083m, 1045s, 1026s, 988s, 966m, 928w, 917w, 905w, 892m, 848w, 823w, 755s, 726m, 697s. ¹H-NMR (300 MHz, CDCl₃): 7.68–7.64 (*trans*), 7.52–7.48 (*cis*) (each *m*, 2 arom. H); 7.39–7.05 (*m*, 8 arom. H); 4.65 (*trans*), 4.33 (*cis*) (each *d*, *J* = 9.3 and 6.6, resp., COCHCO); 4.26 (*trans*), 3.62 (*cis*) (each *d*, *J* = 9.3 and 6.6, resp., *CHCO*₂Et); 4.24–4.02 (*m*, OCH₂Me of *cis* isomer); 4.11 (*q*, *J* = 7.3, OCH₂Me of *trans* isomer); 3.90–3.63 (*m*, OCH₂Me); 1.21 (*cis*), 1.17 (*trans*) (each *t*, *J* = 7.0 and 7.3, resp., OCH₂Me); 0.94 (*trans*), 0.80 (*cis*) (each *t*, *J* = 7.0 and 7.3, resp., OCH₂Me). ¹³C-NMR (75 MHz, CDCl₃): 168.9 (C=O, *trans*), 168.8 (C=O, *cis*); 168.0 (C=O, *trans*), 167.8 (C=O, *cis*); 165.8 (C=O, *trans*), 164.7 (C=O, *cis*); 141.0 (C, *trans*), 140.7 (C, *cis*); 139.4 (C, *trans*), 139.0 (C, *cis*); 129.0 (CH); 128.6 (CH); 128.4 (CH); 128.3 (CH); 128.1 (CH); 128.0 (CH); 127.9 (CH); 127.1 (CH); 125.9 (CH); 125.3 (CH); 125.1 (CH); 89.4 (OC, *trans*), 87.5 (OC, *cis*); 62.5 (OCH₂, *trans*), 62.0 (OCH₂, *cis*); 61.9 (OCH₂, *trans*), 61.2 (OCH₂, *cis*); 53.5 (CH, *trans*), 53.1 (CH, *cis*); 49.3 (CH, *trans*), 49.0 (CH, *cis*); 13.9 (Me, *cis*), 13.8 (Me, *trans*); 13.5 (Me, *trans*), 13.3 (Me, *cis*). EI-MS: 382 (2, *M*⁺), 337 (3), 309 (0.8), 291 (2), 273 (0.7), 259 (3), 247 (2), 231 (2), 219 (2), 200 (100), 191 (16), 183 (40), 165 (6), 154 (36), 127 (65), 115 (3), 105 (37), 99 (37), 77 (17), 51 (4). Anal. calc. for C₂₂H₂₂O₆ (382.43): C 69.10, H 5.80; found: C 69.46, H 5.53.

Diethyl Tetrahydro-2-methyl-5-oxo-2-phenylfuran-3,4-dicarboxylate (5j). According to the *G.P.*, with dianion **2** (2.0 mmol) in THF (10 ml) and a THF (2 ml) soln. of acetophenone (0.3 ml, 2.56 mmol). The crude product was purified by prep. TLC (SiO₂, 10% AcOEt/hexane; multiple runs): **5j** (252 mg, 39%). Yellow liquid containing mainly one diastereoisomer (by ¹H- and ¹³C-NMR (strong peaks due to CH and 2 other small signals, presumably arising from CH of the other 2 diastereoisomers)). IR (neat): 3063w, 2985m, 2940m, 2907m, 1789s, 1738s, 1604w, 1498m, 1466m, 1448m, 1380m, 1322s, 1284s, 1212s, 1176s, 1125m, 1028s, 907m, 859m, 793m, 754m, 700s. ¹H-NMR (300 MHz, CDCl₃; major isomer): 7.40–7.23 (m, 5 arom. H); 4.34–4.23 (m, OCH₂Me); 4.14 (d, *J* = 11.0, COCHCO); 3.94 (d, *J* = 11.0, CHCO₂Et); 4.01–3.82 (m, OCH₂Me); 2.07 (s, MeC); 1.33 (t, *J* = 7.2, 2 OCH₂Me). ¹³C-NMR (75 MHz, CDCl₃; major isomer): 169.4 (C=O); 167.4 (C=O); 166.2 (C=O); 138.8 (C); 128.4 (CH); 128.3 (CH); 124.7 (CH); 85.5 (O–C); 62.4 (OCH₂); 61.6 (OCH₂); 55.8 (CH); 48.8 (CH); 27.9 (Me); 13.8 (Me); 13.6 (Me). EI-MS: 320 (5, *M*⁺), 305 (5), 275 (3), 259 (33), 247 (1), 231 (12), 213 (7), 200 (100), 189 (3), 173 (2), 154 (26), 145 (3), 127 (84), 115 (8), 105 (37), 99 (41), 77 (15), 43 (5). Anal. calc. for C₁₇H₂₀O₆ (320.35): C 63.74, H 6.29; found: C 63.84, H 6.63.

Diethyl 2-Ethyltetrahydro-2-methyl-5-oxofuran-3,4-dicarboxylate (5k). According to the *G.P.*, with dianion **2** (2.0 mmol) in THF (10 ml) and a THF (2 ml) soln. of butan-2-one (0.23 ml, 2.7 mmol). The crude product, a 53:10:16:21 mixture of 4 diastereoisomers, was purified by FC (SiO₂, 8% AcOEt/hexane): colorless liquid of **5k** (202 mg, 37% yield) as a mixture of 4 diastereoisomers. The ratio of diastereoisomers was determined by integration of the MeCH₂C signals, i.e., 4 sets of *t* at δ 0.91 (*J* = 7.4), 0.99 (*J* = 7.4), 1.069 (*J* = 7.3), and 1.073 (*J* = 7.3). However, only the ¹H-NMR data of two isomers (*trans* at the 3,4-positions) could be assigned, whereas the remaining two isomers (*cis* at the 3,4-positions) could not clearly be identified. IR (neat; diastereoisomer mixture): 2983s, 2943m, 1784s, 1737s, 1466m, 1384s, 1311s, 1271s, 1223s, 1180s, 1118s, 1029s, 951m, 904m, 861m, 708m. ¹H-NMR (300 MHz, CDCl₃; 2 3,4-*trans* isomers): 4.34–4.17 (m, 2 OCH₂Me, and COCHCO of the minor isomer); 4.16 (d, *J* = 11.7, COCHCO of the major isomer); 3.78 (minor), 3.76 (major) (each d, *J* = 11.1 and 11.7, resp., CHCO₂Et); 2.02 (minor), 1.60 (major) (each m, CCH₂Me); 1.65 (s, MeC of the major isomer); 1.37–1.29 (m, 2 OCH₂Me and MeC of the minor isomer); 1.07 (minor), 0.99 (major) (each *t*, *J* = 7.3 and 7.4, resp., CCH₂Me). ¹³C-NMR (75 MHz, CDCl₃; major isomer): 168.6 (C=O); 168.1 (C=O); 166.4 (C=O); 85.1 (O–C); 62.1 (OCH₂); 61.5 (OCH₂); 53.9 (CH); 49.1 (CH); 29.0 (CH₂); 24.8 (Me); 13.7 (Me, two peaks merged); 7.3 (Me). EI-MS: 273 (0.92, [*M* + 1]⁺), 257 (3), 243 (50), 227 (8), 209 (8), 197 (100), 181 (9), 169 (29), 155 (33), 141 (16), 127 (30), 109 (12), 99 (18), 81 (7), 69 (3), 55 (4), 43 (9). Anal. calc. for C₁₇H₂₀O₆ (272.31): C 57.34, H 7.40; found: C 57.30, H 7.73.

When the colorless liquid of **5k** was left standing at r.t., it crystallized. Upon addition of hexane, a white solid of the major isomer was obtained as a single diastereoisomer. M.p. 49.5–51 °C. IR (nujol): 1781s, 1730s, 1384s, 1374s, 1312s, 1272s, 1221s, 1198s, 1180s, 1160s, 1118s, 1028s, 952m, 906m, 862m, 802m, 710m. ¹H-NMR (400 MHz, CDCl₃): 4.31 (*q*, *J* = 7.1, OCH₂Me); 4.24 (m, ABX₂, OCH₂Me); 4.17 (d, *J* = 11.7, COCHCO); 3.76 (d, *J* = 11.7, CHCO₂Et); 1.68, 1.55 (2 sets of sext., ABX₂, CCH₂Me); 1.66 (s, MeC); 1.35 (*t*, *J* = 7.1, OCH₂Me); 1.32 (*t*, *J* = 7.1, OCH₂Me); 1.00 (*t*, *J* = 7.4, CCH₂Me).

3. Preparation of 17a,b. Diethyl Tetrahydro-3-methyl-2-oxo-5-pentylfuran-3,4-dicarboxylate (**17a**). A THF (5 ml) soln. of a 70:27:3 mixture *c,t*/(*t,t* + *c,c*)/*c,t*-**5e** (1.50 g, 5.0 mmol) was added dropwise at 0 °C to a suspension of NaH (153 mg, 5.10 mmol; 80% dispersion in oil) in THF (10 ml). After stirring at 0 °C for 1 h, MeI (0.5 ml, 0.80 mmol) was added. The mixture was slowly warmed from 0 °C to r.t. overnight (15 h), then quenched with 0.5M HCl (0.5 ml), diluted with H₂O (50 ml), and extracted with AcOEt (3 × 30 ml). The combined extracts were washed with 5% Na₂S₂O₅ soln., H₂O, and brine, dried (Na₂SO₄), and evaporated. The crude product was purified by radial chromatography (SiO₂, 5% AcOEt/hexane) to give *Fr. 1* and 2 of **17a**.

Fr. 1 (less polar) yielded an inseparable 60:40 mixture *c,t,t,t*-**17a** (368 mg, 23%). Colorless liquid. ¹H-NMR (300 MHz, CDCl₃): 4.85 (*dt*, *J* = 9.1, 3.2, CHO of *c,t*); 4.69 (*dddd*, *J* = 9.7, 8.5, 4.1, CHO of *t,t*); 4.30 (*q*, *J* = 7.1, OCH₂Me of *t,t*); 4.27–4.10 (m, 2 OCH₂Me of *c,t*, and OCH₂Me of *t,t*); 3.67 (*t,t*), 2.84 (*c,t*) (each d, *J* = 9.7 and 9.8, resp., CHCO₂Et); 1.96–1.24 (m, (CH₂)₄, 2 OCH₂Me); 1.65 (*c,t*), 1.44 (*t,t*) (each s, Me); 0.93–0.87 (m, (CH₂)₄Me).

Fr. 2 (more polar) yielded pure *c,c*-**17a** (1.0453 g, 67%). Colorless liquid. IR (neat): 2982s, 2957s, 2937s, 2873m, 1799s, 1743s, 1732s, 1464m, 1375m, 1348m, 1327m, 1296s, 1234s, 1203s, 1125s, 1097s, 1063m, 1018s, 949m, 858m, 773m, 731m, 693m. ¹H-NMR (300 MHz, CDCl₃): 4.63–4.55 (m, CHO); 4.27–4.13 (m, 2 OCH₂Me); 3.30 (d, *J* = 6.8, CHCO₂Et); 1.80–1.22 (m, (CH₂)₄, (CH₂)₄Me); 1.65 (s, MeC); 0.91–0.87 (m, (CH₂)₄Me). ¹³C-NMR (75 MHz, CDCl₃): 172.3 (C=O); 169.1 (C=O); 168.8 (C=O); 77.0 (CH); 61.8 (OCH₂); 61.2 (OCH₂); 54.5 (CH); 53.0 (C); 31.3 (CH₂); 30.8 (CH₂); 25.5 (CH₂); 22.3 (CH₂); 21.5 (Me); 13.9 (Me); 13.8 (Me). EI-MS: 315 (20, [*M* + 1]⁺), 269 (27), 251 (1), 241 (10), 223 (9), 215 (4), 197 (45), 169 (100), 151 (19), 141 (36), 123 (29), 113

(45), 95 (19), 81 (11), 69 (8), 55 (8), 41 (10). Anal. calc. for $C_{16}H_{26}O_6$ (314.39): C 61.13, H 8.34; found: C 61.04, H 8.39.

Diethyl Tetrahydro-3-methyl-2-oxo-5-tridecylfuran-3,4-dicarboxylate (17b). As described for **17a**, with a THF (3 ml) soln. of a 66:34:trace mixture *t,c/t,t + c,c/c,t,t-5f* (1.24 g, 3.0 mmol), a THF (6 ml) suspension of NaH (80% dispersion in oil, 93 mg, 3.10 mmol), and MeI (0.32 ml, 5.10 mmol). The crude product, a 75:13:12 mixture of three diastereoisomers, was purified by radial chromatography (SiO_2 , 5% AcOEt/hexane) to give *Fr. 1* and 2 of **17b**.

Fr. 1 (less polar) yielded an inseparable 51:49 mixture *c,t/t,t-17b* (353 mg, 25%). Colorless liquid. IR (neat): 2925s, 2854s, 1785s, 1741s, 1465m, 1380m, 1353m, 1300m, 1208s, 1106m, 1021m, 980m, 860m, 722m. 1H -NMR (300 MHz, $CDCl_3$): 4.84 (*dt*, $J = 3.3, 9.1$, CHO of *c,t*); 4.69 (*ddd*, $J = 9.5, 8.2, 4.2$, CHO of *t,t*); 4.34–4.40 (*m*, 2 OCH_2Me); 3.67 (*t,t*), 2.86 (*c,t*) (each *d*, $J = 9.9$, $CHCO_2Et$); 1.95–1.20 (*m*, $(CH_2)_{12}$, 2 OCH_2Me); 1.64 (*c,t*), 1.44 (*t,t*) (each *s*, Me); 0.88 (app. *t*, $J = 6.6$, $(CH_2)_1Me$).

Fr. 2 (more polar) yielded pure *c,c-17b* (851 mg, 67%). White solid. M.p. 48–49° (from hexane). IR (nujol): 1788s, 1738m, 1721s, 1472s, 1326m, 1237m, 1210s, 1132m, 1121m, 1094m, 1030m, 1008m, 995m. 1H -NMR (400 MHz, $CDCl_3$): 4.58 (*ddd*, $J = 9.2, 6.6, 4.2$, CHO); 4.25 (*q*, $J = 7.1$, OCH_2Me); 4.20 (*q*, $J = 7.1$, OCH_2Me); 3.30 (*d*, $J = 6.6$, $CHCO_2Et$); 1.80–1.24 (*m*, $(CH_2)_{12}$, 2 OCH_2Me); 1.66 (*s*, Me); 0.90 (app. *t*, $J = 6.9$, $(CH_2)_1Me$). ^{13}C -NMR (75 MHz, $CDCl_3$): 172.4 (C=O); 169.2 (C=O); 169.0 (C=O); 77.1 (CH); 62.0 (OCH_2); 61.3 (OCH_2); 54.7 (CH); 53.1 (C); 31.9 (CH_2); 31.0 (CH_2); 29.7 (CH_2); 29.6 (CH_2); 29.6 (CH_2); 29.5 (CH_2); 29.4 (CH_2); 29.3 (CH_2); 29.2 (CH_2); 26.0 (CH_2); 22.7 (CH_2); 21.7 (Me); 14.1 (Me); 14.0 (Me); 13.9 (Me). EI-MS: 427 ($[M + 1]^+$), 381 (13), 353 (9), 336 (7), 309 (19), 281 (100), 253 (2), 235 (8), 197 (4), 187 (17), 169 (7), 141 (24), 123 (6), 113 (31), 95 (12), 81 (10), 69 (10), 57 (14), 43 (23). Anal. calc. for $C_{24}H_{42}O_6$ (426.61): C 67.57, H 9.92; found: C 67.73, H 9.82.

4. Preparation of 18a,b. Diethyl Tetrahydro-2-oxo-5-pentyl-3-[(phenylsulfonyl)methyl]furan-3,4-dicarboxylate (**18a**). A THF (8 ml) soln. of a 82:6:11:trace mixture *t,c/c,t,t/c,t,t-5e* (2.61 g, 8.6 mmol), was added dropwise at 0° to a suspension of NaH (80% dispersion in oil; 264 mg, 8.78 mmol) in THF (18 ml). After stirring at 0° for 1 h, a THF (10 ml) soln. of chloromethyl phenyl sulfide (2.064 g, 13.0 mmol) was added, followed by the addition of a THF (10 ml) soln. of NaI (2.004 g, 13.0 mmol). The mixture was stirred and slowly warmed from 0° to r.t. overnight (15 h), then quenched with 0.5M HCl (5 ml), diluted with H_2O (50 ml), and extracted with AcOEt (3 × 50 ml). The combined extract was washed with 5% $Na_2S_2O_5$ soln., H_2O , and brine, dried (Na_2SO_4), and evaporated. The crude product was purified by FC (SiO_2 , 5% AcOEt/hexane) to give *Fr. 1* and 2 of the corresponding sulfide.

Fr. 1 (less polar) yielded an inseparable 70:30 mixture of *c,t* and *t,t* sulfide (149 mg, 4%). Colorless liquid. IR (neat): 3060w, 2958m, 2934m, 2862m, 1783s, 1743s, 1583m, 1467m, 1440m, 1390m, 1370m, 1353m, 1300m, 1271m, 1231s, 1197s, 1115m, 1097m, 1025s, 944m, 859m, 745m, 692m. 1H -NMR (400 MHz, $CDCl_3$): 7.47–7.39 (*m*, 2 arom. H); 7.34–7.21 (*m*, 3 arom. H); 4.98 (*t,t*), 4.88 (*c,t*) (each *dt*, $J = 3.7, 8.6$ and $3.2, 8.7$, resp., CHO); 4.31–4.00 (*m*, 2 OCH_2Me); 3.88, 3.64 (each *d*, AB , $J = 14.4$, CH_2SPh of *c,t*); 3.84 (*t,t*), 3.61 (*c,t*) (each *d*, $J = 9.0$ and 9.3 , resp., $CHCO_2Et$); 3.73, 3.69 (each *d*, AB , $J = 13.6$, CH_2SPh of *t,t*); 1.92, 1.71 (2 sets of *m*, CH_2); 1.62–1.18 (*m*, 2 OCH_2Me , $(CH_2)_3$); 0.93 (*m*, Me).

Fr. 2 (more polar) yielded pure *c,c* sulfide (3.36 g, 92 %). Pale yellow liquid. IR (nujol): 3059w, 2957m, 2933m, 2872m, 1781s, 1739s, 1583m, 1469m, 1440m, 1370m, 1306m, 1191s, 1125m, 1096m, 1066m, 1017s, 946m, 860m, 746m, 692m. 1H -NMR (400 Hz, $CDCl_3$): 7.43–7.39 (*m*, 2 arom. H); 7.32–7.20 (*m*, 3 arom. H); 4.59 (*ddd*, $J = 9.8, 7.5, 4.1$, CHO); 4.14 (*q*, $J = 7.1$, OCH_2Me); 4.07 (*m*, ABX_3 , OCH_2Me); 3.86 (*d*, $J = 7.5$, $CHCO_2Et$); 3.68 (*d*, $J = 14.1$, 1 H, CH_2SPh); 3.50 (*d*, $J = 14.1$, 1 H, CH_2SPh); 1.79, 1.66 (2 sets of *m*, CH_2); 1.51, 1.37 (2 sets of *m*, CH_2); 1.29 (*m*, CH_2); 1.22 (*t*, $J = 7.1$, OCH_2Me); 1.21 (*t*, $J = 7.1$, OCH_2Me); 0.88 (app. *t*, $J = 6.7$, $(CH_2)_3Me$). ^{13}C -NMR (75 MHz, $CDCl_3$): 170.7 (C=O); 168.5 (C=O); 166.9 (C=O); 134.4 (S–C); 130.8 (CH); 129.1 (CH); 127.4 (CH); 78.0 (CH); 62.3 (OCH_2); 61.2 (OCH_2); 58.5 (C); 49.9 (CH); 38.4 (CH_2); 31.2 (CH_2); 30.8 (CH_2); 25.5 (CH_2); 22.3 (CH_2); 13.9 (Me); 13.8 (Me); 13.6 (Me). EI-MS: 422 ($[M]^+$), 399 (1), 393 (0.25), 377 (3), 365 (0.27), 348 (4), 331 (5), 313 (0.53), 299 (66), 287 (1), 275 (9), 253 (24), 225 (8), 207 (5), 175 (4), 158 (11), 147 (9), 135 (5), 123 (100), 109 (33), 99 (20), 77 (12), 65 (15), 55 (16), 43 (22). Anal. calc. for $C_{22}H_{30}O_6S$ (422.55): C 62.54, H 7.16; found: C 62.78, H 7.18.

The crude sulfide, obtained from the reaction of a 82:6:11:trace mixture *t,c/c,t,t/c,t,t-5e* (1.21 g, 4.0 mmol) with chloromethyl phenyl sulfide (1.01 g, 6.3 mmol) and NaI (900 mg, 6.0 mmol) under the conditions described above, was dissolved in AcOH (25 ml) and cooled to 0°. Aq. H_2O_2 (30% soln., 6.0 ml, 60 mmol) was added dropwise, then the mixture was stirred and slowly warmed from 0° to r.t. overnight (15 h). After usual workup, the crude product, mainly one diastereoisomer (by 1H -NMR), was purified by radial chromatography (SiO_2 ,

8% AcOEt/hexane): **18a** (1.76 g, 97%) as a mixture of diastereoisomers containing mainly the *c,c* isomer and trace amounts of the other isomers. Colorless viscous liquid. IR (neat): 3066m, 2957s, 2934s, 2872m, 1784s, 1745s, 1585m, 1467m, 1448m, 1394m, 1371m, 1327s, 1311s, 1246s, 1196s, 1155s, 1085s, 1070s, 1017s, 949m, 861m, 804m, 750m, 723m, 690m. ¹H-NMR (400 MHz, CDCl₃): 7.92 (app. *d*, *J* = 7.3, 2 arom. H); 7.70 (app. *t*, *J* = 7.4, 1 arom. H); 7.60 (app. *t*, *J* = 7.6, 2 arom. H); 4.95 (*m*, CHO); 4.67 (*d*, *J* = 8.9, CHCO₂Et); 4.20 (*m*, 2 OCH₂CH₃); 3.93, 3.88 (each *d*, *AB*, *J* = 14.8, CH₂SO₂Ph); 1.93, 1.84 (2 sets of *m*, CH₂); 1.35 (*m*, (CH₂)₂); 1.30 (*t*, *J* = 7.1, OCH₂Me); 1.26 (*t*, *J* = 7.2, OCH₂Me); 0.91 (*m*, (CH₂)₄Me). ¹³C-NMR (75 MHz, CDCl₃): 171.2 (C=O); 168.5 (C=O); 166.7 (C=O); 140.6 (SO₂C), 135.0 (CH); 130.1 (CH); 130.0 (CH); 79.7 (OCH); 63.8 (OCH₂); 62.4 (OCH₂); 58.3 (CH₂SO₂Ph); 55.4 (C); 49.4 (CH); 32.0 (CH₂); 31.7 (CH₂); 26.5 (CH₂); 23.1 (CH₂); 14.64 (Me); 14.59 (Me); 14.31 (CH₂). EI-MS 455 (2, *M*⁺), 437 (0.63), 409 (14), 381 (21), 363 (2), 337 (11), 317 (3), 281 (2), 269 (8), 253 (7), 239 (5), 223 (45), 195 (25), 169 (33), 141 (44), 125 (41), 111 (11), 95 (16), 77 (100), 67 (27), 51 (37), 43 (53).

Diethyl Tetrahydro-2-oxo-3-[(phenylsulfonyl)methyl]-5-tridecylfuran-3,4-dicarboxylate (18b). A THF (3 ml) soln. of a diastereoisomer mixture containing mainly *t,c*-**5f** and a small amount of the others isomers (825 mg, 2.0 mmol) was added dropwise at 0° to a suspension of NaH (80% dispersion in oil; 64 mg, 2.1 mmol) in THF (4 ml). After stirring at 0° for 1 h, a THF (6 ml) soln. of chloromethyl phenyl sulfide (478 mg, 3.0 mmol) was added, followed by the addition of NaI (450 mg, 3.0 mmol). The mixture was stirred and slowly warmed from 0° to r.t. overnight (15 h).

The crude product obtained from this reaction was dissolved in AcOH (12 ml) and cooled to 0°. Aq. H₂O₂ (30% soln.; 3.0 ml, 30 mmol) was added dropwise, then the mixture was stirred and slowly warmed from 0° to r.t. overnight (15 h). After usual workup, the crude product was purified by radial chromatography (SiO₂, 8% AcOEt/hexane) to give *Fr. 1* and *2* of **18b**.

Fr. 1 (less polar) yielded an inseparable 73:27 mixture *c,t/t,t*-**18b** (55 mg, 5%). Pale yellow liquid. IR (neat): 3066w, 2925s, 2854s, 1785s, 1746s, 1585w, 1466m, 1448m, 1393m, 1371m, 1356m, 1323s, 1311s, 1203s, 1161s, 1086m, 1023m, 947m, 838m, 857m, 783m, 746m, 723m, 689m. ¹H-NMR (300 MHz, CDCl₃): 7.96 (*c,t*), 7.89 (*t,t*) (each app. *dd*, *J* = 8.3, 1.3 and 8.2, 1.4, resp., 2 arom. H); 7.74–7.55 (*m*, 3 arom. H); 5.02 (*t,t*), 4.97 (*c,t*) (each *dt*, *J* = 3.7, 8.0 and 3.2, 8.9, resp., CHO); 4.35–3.97 (*m*, 2 OCH₂Me and CHCO₂Et of *c,t* and *t,t*; and CH₂SO₂Ph of *t,t*); 4.10, 3.91 (each *d*, *AB*, *J* = 14.7, CH₂SO₂Ph of *c,t*); 2.10–1.20 (*m*, (CH₂)₁₂, 2 OCH₂Me), 0.88 (app. *t*, *J* = 6.6, (CH₂)₁₂Me).

Fr. 2 (more polar) yielded pure *c,c*-**18b** (1.0013 g, 88%). White solid. M.p. 73–74° (AcOEt/hexane). IR (neat): 3064w, 3002m, 1779s, 1721s, 1587w, 1471m, 1447m, 1404m, 1376m, 1345m, 1324s, 1298m, 1259s, 1244s, 1230s, 1159s, 1120m, 1088m, 1071m, 1023m, 1008m, 963m, 867m, 855m, 803m, 748m, 725m, 687m. ¹H-NMR (400 MHz, CDCl₃): 7.95 (app. *dd*, *J* = 7.9, 1.2, 2 arom. H); 7.70 (*t*, *J* = 7.4, 1 arom. H); 7.60 (*t*, *J* = 7.7, 2 arom. H); 4.95 (*m*, CHO); 4.68 (*d*, *J* = 8.9, CHCO₂Et); 4.29–4.12 (*m*, 2 OCH₂Me); 3.94, 3.88 (each *d*, *AB*, *J* = 14.8, CH₂SO₂Ph); 1.95, 1.85 (2 sets of *m*, CH₂); 1.63, 1.46 (2 sets of *m*, CH₂); 1.28 (*m*, (CH₂)₁₀, 2 OCH₂Me); 0.89 (*m*, (CH₂)₄Me). ¹³C-NMR (75 MHz, CDCl₃): 170.5 (C=O); 167.9 (C=O); 166.1 (C=O); 139.9 (SO₂C(arom.)); 134.3 (CH); 129.4 (CH, 2 peaks merged); 127.8 (CH, 2 peaks merged); 79.1 (OCH); 63.1 (OCH₂); 61.7 (OCH₂); 57.7 (CH₂SO₂Ar); 54.7 (C); 48.8 (CH); 31.9 (CH₂); 31.1 (CH₂); 29.62 (CH₂); 29.59 (CH₂, 2 peaks merged); 29.47 (CH₂); 29.40 (CH₂); 29.29 (CH₂); 29.20 (CH₂); 26.1 (CH₂); 22.6 (CH₂); 14.1 (Me); 14.0 (Me); 13.6 (Me). EI-MS: 567 (4, [*M* + 1]⁺), 551 (0.61), 520 (23), 493 (82), 477 (6), 447 (7), 419 (6), 397 (2), 381 (31), 365 (2), 351 (7), 335 (56), 307 (19), 281 (100), 261 (10), 233 (11), 206 (19), 193 (5), 165 (98), 141 (35), 125 (49), 109 (16), 95 (26), 77 (84), 67 (35), 57 (50), 43 (91). Anal. calc. for C₃₀H₄₆O₈S (566.77): C 63.58, H 8.18; found: C 63.59, H 8.39.

5. Preparation of 20a and 12. Tetrahydro-5-oxo-2-pentyl-4-[(phenylsulfonyl)methyl]furan-3-carboxylic Acid (20a). γ -Lactone *c,c*-**18a** (1.5001 g, 3.30 mmol) containing a small amount of the other isomers was refluxed in 48% HBr soln. (20 ml) for 3 h. The resulting mixture was diluted with H₂O (50 ml) and extracted with CH₂Cl₂ (3 $\times$ 30 ml). The combined org. layers was washed with sat. aq. NaHCO₃ soln. (3 $\times$ 30 ml). The basic soln. was acidified to pH 2 with 6M HCl and extracted with CH₂Cl₂ (3 $\times$ 30 ml). The combined org. phase was washed with H₂O and brine, dried (Na₂SO₄), and evaporated and the residue recrystallized from AcOEt/hexane: 32:64:4 mixture *t,c/c,t,t,t*-**20a** (562 mg, 48%). White solid. M.p. 155–157°. IR (nujol): 3282m, 3069w, 1771s, 1717s, 1589w, 1308m, 1283m, 1220m, 1188m, 1163m, 1151m, 1087m, 994m, 984m, 931m, 836m, 790m, 742m, 720m, 685m. ¹H-NMR (400 MHz, CDCl₃): 7.99–7.92 (*m*, 2 arom. H); 7.75–7.68 (*m*, 1 arom. H); 7.65–7.58 (*m*, 1 arom. H); 6.00 (br. s, CO₂H); 4.85 (*m*, CHO of *t,c*); 4.59 (app. *q*, *J* = 6.4, CHO of *c,c*); 4.50 (*dt*, *J* = 3.7, 8.8, CHO of *t,t*); 3.89 (*t*, *J* = 9.1, CHCO₂H of *t,c*); 3.79 (*dd*, *J* = 6.7, 5.4, CHCO₂H of *c,c*); 3.77–3.55 (*m*, 2 H, CHCH₂SO₂Ph and CH₂SO₂Ph of *t,c* and *t,t*; and CH₂SO₂Ph of *c,c*); 3.46 (*ddd*, *J* = 10.8, 6.8, 3.7, CHCH₂SO₂Ph of

c,c); 3.35–3.25 (*m*, 2 H, CHCO_2H and $\text{CH}_2\text{SO}_2\text{Ph}$ of *t,t*); 3.30 (*dd*, $J = 14.4, 10.1$, 1 H, $\text{CH}_2\text{SO}_2\text{Ph}$ of *t,c*); 1.77 (*q*, $J = 7.5$, CH_3 of *c,c*); 2.00–1.25 (*m*, $(\text{CH}_2)_4$ of *t,c* and *t,t*, and 3 CH_3 of *c,c*); 0.93–0.85 (*m*, $(\text{CH}_2)_4\text{Me}$). EI-MS: 355 (3, $[M + 1]^+$), 337 (2), 290 (2), 265 (9), 245 (1), 237 (6), 213 (46), 195 (8), 177 (7), 162 (21), 148 (58), 125 (42), 113 (15), 94 (22), 85 (77), 77 (100), 67 (34), 55 (30), 41 (42). Anal. calc. for $\text{C}_{17}\text{H}_{22}\text{O}_6\text{S}$ (354.43): C 57.61, H 6.26; found: C 57.52, H 6.43.

($\pm$)-*Lichesterinic Acid* (**12**). To an aq. soln. of $\text{LiOH} \cdot \text{H}_2\text{O}$ (263 mg, 6.0 mmol, 1.5 ml) was added a THF (15 ml) soln. of *c,c,t,t*-**18b** (779 mg, 1.40 mmol). The mixture was refluxed for 3 h and then stirred at r.t. overnight. The resulting mixture was diluted with H_2O (50 ml) and extracted with AcOEt (3×30 ml) to remove the unhydrolyzed ester. The aq. phase was then acidified to pH 2 with 6M HCl and extracted with AcOEt (3×30 ml). The combined org. layer was washed with H_2O and brine, dried (Na_2SO_4) and evaporated. The white solid, a mixture of **12** and an unidentified compound (310 mg), was recrystallized from AcOEt : (114 mg, 26%). White solid. M.p. 117.5–118.5° ([23] m.p. 114–115° (AcOH)). IR (nujol): 2740*m*, 2632*m*, 2533*m*, 1732*s*, 1704*s*, 1527*w*, 1422*m*, 1341*m*, 1325*m*, 1206*s*, 1153*m*, 1134*m*, 1044*m*, 963*m*, 936*m*, 890*m*, 760*m*, 714*m*. $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, CDCl_3): 5.14 (*m*, CHO); 2.90 (br. s. CO_2H); 2.26 (*d*, $J = 2.1$, $\text{MeC}=\text{C}$); 2.14, 1.61 (2 sets of *m*, CH_2); 1.48–1.22 (*m*, 11 CH_2); 0.90 (app. *t*, $(\text{CH}_2)_4\text{Me}$). $^{13}\text{C-NMR}$ (75 MHz, CDCl_3): 172.7 ($\text{C}=\text{O}$); 166.3 ($\text{C}=\text{O}$); 146.8 (C); 139.8 (C); 81.4 (OCH); 32.7 (CH_2); 31.9 (CH_2); 29.65 (CH_2); 29.62 (CH_2 , 2 peaks merged); 29.58 (CH_2); 29.50 (CH_2); 29.37 (CH_2); 29.33 (CH_2); 29.22 (CH_2); 24.8 (CH_2); 22.7 (CH_2); 14.1 (Me); 11.0 (Me). Anal. calc. for $\text{C}_{19}\text{H}_{32}\text{O}_4$ (324.47): C 70.34, H 9.94; found: C 70.29, H 9.61.

6. ($\pm$)-*Rocellaric Acid* (**15**) and ($\pm$)-*Dihydroprotolichesterinic Acid* (**16**). To a soln. of $\text{LiOH} \cdot \text{H}_2\text{O}$ (188 mg, 4.50 mmol) in H_2O (0.5 ml) was added a THF (4.5 ml) soln. of the pure *c,c*-**17b** (473 mg, 1.10 mmol). The mixture was stirred at r.t. overnight. After usual workup as described before, the crude product obtained (464 mg) was treated with 48% HBr soln. (6 ml) and refluxed for 5 h. The resulting mixture was diluted with H_2O (20 ml) and extracted with AcOEt (3×30 ml). The combined org. layers were washed with H_2O and brine, dried (Na_2SO_4), and evaporated. The solid was crystallized from AcOEt /hexane: 64:36 mixture **15/16** (289 mg, 80%). White solid. $^1\text{H-NMR}$ (300 MHz, CDCl_3): 4.70 (*q*, $J = 6.4$, CHO of the minor isomer); 4.48 (*dt*, $J = 8.7, 3.8$, CHO of the major isomer); 3.16 (minor), 2.70 (major) (each *dd*, $J = 9.2, 6.4$ and 11.1, 9.4, resp., CHCO_2H); 3.08–2.92 (*m*, CHMe); 1.88–1.63 (*m*, CH_2); 1.60–1.20 (*m*, 11 CH_2); 1.37 (major), 1.30 (minor) (each *d*, $J = 7.0$ and 7.4, CHMe); 0.88 (app. *t*, $J = 6.6$, $(\text{CH}_2)_4\text{Me}$).

Base-Catalyzed Isomerization of 16 to 15. A soln. of 1.56M BuLi in hexane (1.5 ml, 2.34 mmol) was added dropwise to a soln. of Pr_2NH (0.36 ml, 2.5 mmol) in THF (4 ml) at 0° under Ar. After stirring at 0° for 30 min, a THF (1.5 ml) soln. of a 64:36 mixture **15/16** (305 mg, 0.94 mmol) was added dropwise. The mixture was stirred at 0° for 1 h and then quenched with AcOH . The mixture was allowed to reach r.t. and acidified to pH 2 with 1M HCl. Usual workup gave a brownish crystalline 89:11 mixture **15/16**. Fractional crystallization from AcOEt afforded pure **15** (219 mg, 72%). Colorless crystals. M.p. 98–99° [24]. IR (nujol): 1747*s*, 1715*s*, 1471*s*, 1455*s*, 1434*m*, 1398*m*, 1361*m*, 1314*m*, 1256*m*, 1222*m*, 1206*m*, 1172*m*, 1146*m*, 1126*m*, 1103*m*, 1015*m*, 973*m*, 944*m*, 894*m*, 718*m*, 698*m*, 671*m*. $^1\text{H-NMR}$ (300 MHz, CDCl_3): 8.85 (br., CO_2H); 4.49 (*ddd*, $J = 9.1, 8.6, 4.0$, CHO); 2.99 (*dq*, $J = 11.4, 7.1$, CHMe); 2.71 (*dd*, $J = 11.1, 9.5$, CHCO_2H); 1.77 (*m*, CH_2); 1.60–1.21 (*m*, 11 CH_2); 1.37 (*d*, $J = 7.2$, CHMe); 0.88 (app. *t*, $J = 6.6$, $(\text{CH}_2)_4\text{Me}$). $^{13}\text{C-NMR}$ (75 MHz, CDCl_3): 176.7 ($\text{C}=\text{O}$); 176.1 ($\text{C}=\text{O}$); 79.4 (OCH); 53.9 (CH); 39.8 (CH); 34.9 (CH_2); 31.9 (CH_2); 29.7 (CH_2); 29.6 (CH_2); 29.57 (CH_2); 29.47 (CH_2); 29.36 (CH_2); 29.32 (CH_2); 29.20 (CH_2); 25.3 (CH_2); 22.7 (CH_2); 14.5 (Me); 14.1 (Me). EI-MS: 326 (5, M^+), 308 (3), 290 (1), 281 (20), 263 (3), 253 (23), 235 (11), 207 (3), 194 (2), 168 (3), 154 (10), 143 (10), 132 (17), 123 (8), 114 (18), 97 (28), 87 (23), 81 (20), 69 (44), 55 (51), 41 (100), 32 (5). Anal. calc. for $\text{C}_{19}\text{H}_{30}\text{O}_4$ (336.57): C 69.90, H 10.50; found: C 70.09, H 10.42.

Compound **16** could not be separated from the residue in pure form.

Methyl Esters of ($\pm$)-Rocellaric Acid (15) and ($\pm$)-Dihydroprotolichesterinic Acid (16). To a soln. of a 64:36 mixture **15/16** (258 mg, 0.79 mmol) in dry MeOH (3 ml) was added a soln. of dicyclohexylcarbodiimide (DCC; 260 mg, 1.26 mmol) in dry MeOH (1 ml). The mixture was stirred at r.t. overnight. The precipitates were then filtered off. After evaporation, the crude product, a 80:20 mixture of methyl esters of **15** and **16**, was purified by radial chromatography (SiO_2 , 2% AcOEt /hexane) to give *Fr. 1* and 2 of methyl esters of **15** and **16**.

Fr. 1 (less polar) yielded the methyl ester of **15** (180 mg, 67%). White solid. M.p. 40–41° (hexane) [23]. IR (nujol): 1783*s*, 1743*s*, 1435*m*, 1320*m*, 1281*m*, 1265*m*, 1252*m*, 1203*m*, 1171*m*, 1105*m*, 1122*m*, 1065*m*, 998*m*, 980*m*, 968*m*, 937*m*, 724*m*. $^1\text{H-NMR}$ (300 MHz, CDCl_3): 4.45 (app. *dt*, $J = 4.1, 8.5$, CHO); 3.78 (*s*, CO_2Me); 2.96 (*dq*, $J = 11.5, 7.2$, CHMe); 2.66 (*dd*, $J = 11.1, 9.5$, CHCO_2Me); 1.73 (*m*, CH_2); 1.58–1.20 (*m*, 11 CH_2); 1.32 (*d*, $J = 7.2$, CHMe); 0.88 (app. *t*, $J = 6.6$, $(\text{CH}_2)_4\text{Me}$). $^{13}\text{C-NMR}$ (75 MHz, CDCl_3): 176.7 ($\text{C}=\text{O}$); 171.1 ($\text{C}=\text{O}$); 79.5 (OCH); 54.1 (CH); 52.5 (OMe); 39.8 (CH); 34.8 (CH_2); 31.8 (CH_2); 29.60 (CH_2); 29.57 (CH_2 , 2 peaks merged);

29.53 (CH₂); 29.42 (CH₂); 29.38 (CH₂); 29.36 (CH₂); 29.32 (CH₂); 29.28 (CH₂); 29.21 (CH₂); 29.15 (CH₂); 25.2 (CH₂); 22.6 (CH₂); 14.4 (Me); 14.0 (Me). EI-MS: 340 (6, *M*⁺), 322 (4), 308 (8), 294 (14), 281 (60), 267 (80), 253 (4), 235 (15), 207 (9), 182 (6), 168 (15), 154 (44), 146 (40), 129 (82), 109 (28), 101 (77), 81 (30), 69 (100), 55 (53), 41 (89).

Fr. 2 (more polar) yielded the methyl ester of **16** (22 mg, 8%) [24]. White solid. M.p. 50.0–50.5° (hexane). IR (nujol): 1770s, 1724s, 1464s, 1345m, 1220m, 1205m, 1181s, 1126m, 1092m, 1071m, 1016m, 986m, 964m, 917m, 802m, 720m. ¹H-NMR (300 MHz, CDCl₃): 4.70 (*q*, *J* = 6.4, CHO); 3.75 (*s*, CO₂Me); 3.11 (*dd*, *J* = 9.4, 7.4, CHCO₂Me); 2.97 (*dq*, *J* = 9.4, 7.4, CHMe); 1.70–1.62 (*m*, CH₂); 1.57–1.20 (*m*, 11 CH₂); 1.22 (*d*, *J* = 7.6, CHMe); 0.88 (*app. t*, *J* = 6.7, (CH₂)₁₂Me). ¹³C-NMR (75 MHz, CDCl₃): 177.3 (C=O); 170.5 (C=O); 79.4 (OCH); 52.1 (CH); 50.0 (Me); 37.1 (CH₂); 34.7 (CH₂); 31.9 (CH₂); 29.62 (CH₂); 29.59 (CH₂, 2 peaks merged); 29.55 (CH₂); 29.44 (CH₂); 29.35 (CH₂); 29.30 (CH₂); 29.17 (CH₂); 25.3 (CH₂); 22.6 (CH₂); 14.1 (Me); 11.9 (Me).

7. (±)-*Nephromopsinic Acid* (**14**). Pure *c,c*-**17b** (400 mg, 0.94 mmol) was refluxed in 48% HBr soln. (10 ml) for 5 h. The resulting mixture was diluted with H₂O (50 ml) and extracted with AcOEt (3 × 30 ml). The combined org. layer was washed with H₂O and brine, dried (Na₂SO₄), and evaporated. The residue was crystallized from AcOEt/hexane: 62:38 mixture **23/14** (265 mg, 87%). White solid. ¹H-NMR (400 MHz, CDCl₃): 4.72 (*m*, CHO of the minor isomer); 4.46 (*dt*, *J* = 5.1, 8.7, CHO of the major isomer); 3.35 (major), 3.24 (minor) (each *dd*, *J* = 7.4, 5.2 and 9.8, 8.3, resp., CHCO₂H); 3.06 (*dq*, *J* = 9.8, 7.1, CHMe of the minor isomer); 2.96 (*m*, CHMe of the major isomer); 1.92–1.24 (series of *m*, 12 CH₂ of both isomers, and CHMe of the minor isomer); 1.34 (*d*, *J* = 7.1, CHMe of the major isomer); 0.90 (*app. t*, *J* = 6.8, 3 H, (CH₂)₁₂Me).

Methyl Ester of (±)-Nephromopsinic Acid (**14**). To a soln. of the 38:62 mixture **14/23** (258 mg, 0.79 mmol) in dry MeOH (4 ml) and dry CH₂Cl₂ (0.5 ml) was added a soln. of DCC (280 mg, 1.35 mmol) in dry MeOH (1 ml). After stirring at r.t. overnight, the precipitates were filtered off and washed with AcOEt. The filtrate was evaporated, and the crude product purified by FC (SiO₂, 5% AcOEt/hexane): methyl ester of (±)-rocellaric acid (**15**; 46 mg, 15%); the formation of (±)-rocellaric acid methyl ester may be due to the equilibration at C(α) and C(β) of the initially formed methyl ester of **23** and methyl ester of **14** (85 mg, 28%). White solid. M.p. 62–62.5° (AcOEt/hexane) [19e]. IR (nujol): 1781s, 1734s, 1429m, 1385m, 1338m, 1249m, 1205s, 1168m, 1133m, 1094m, 1076m, 1005s, 982m, 930m, 739m, 723m. ¹H-NMR (300 MHz, CDCl₃): 4.65 (*m*, CHO); 3.77 (*s*, CO₂Me); 3.18 (*dd*, *J* = 9.8, 8.3, CHCO₂Me); 3.05 (*dq*, *J* = 10.0, 7.0, CHMe); 1.60–1.22 (*m*, (CH₂)₁₂Me); 1.29 (*d*, *J* = 7.1, CHMe); 0.88 (*app. t*, *J* = 6.6, (CH₂)₁₂Me). ¹³C-NMR (75 MHz, CDCl₃): 177.5 (C=O); 170.1 (C=O); 77.5 (OCH); 52.3 (CH); 51.7 (Me); 36.3 (CH); 31.9 (CH₂); 31.2 (CH₂); 29.63 (CH₂); 29.60 (CH₂, 2 peaks merged); 29.57 (CH₂); 29.55 (CH₂); 29.45 (CH₂); 29.37 (CH₂); 29.31 (CH₂); 29.16 (CH₂); 25.6 (CH₂); 22.6 (CH₂); 14.4 (Me); 14.1 (Me).

8. (±)-*Phaseolinic Acid* (**13**). Pure *c,c*-**17a** (746 mg, 2.37 mmol) was refluxed in 48% HBr soln. (12 ml) for 5 h. The resulting mixture was diluted with H₂O (30 ml) and extracted with AcOEt (3 × 30 ml). The combined org. layer was washed with H₂O and brine, dried (Na₂SO₄), and evaporated. The solid was recrystallized from AcOEt/hexane: 38:62 mixture **13/22** (450 mg, 89%). ¹H-NMR (300 MHz, CDCl₃): 4.70 (*m*, CHO of the minor isomer); 4.44 (*dt*, *J* = 8.4, 5.1, CHO of the major isomer); 3.50 (*br.*, COOH); 3.33 (major), 3.22 (minor) (each *dd*, *J* = 7.3, 5.2 and 9.6, 8.3, resp., CHCO₂H); 3.03 (*dq*, *J* = 9.9, 7.1, CHMe of the minor isomer); 2.94 (*quint.*, *J* = 7.2, CHMe of the major isomer); 1.92–1.25 (*m*, (CH₂)₁₂, and CHMe); 0.89 (*m*, (CH₂)₁₂Me).

Methyl Ester of (±)-Phaseolinic Acid (**13**). To a soln. of a 38:62 mixture **13/22** (405 mg, 1.90 mmol) in dry MeOH (4 ml) was added a soln. of DCC (613 mg, 3.0 mmol) in dry MeOH (2 ml). After stirring at r.t. overnight, the precipitate was filtered off and washed with AcOEt. The filtrate was evaporated to give the crude product, which was purified by radial chromatography (SiO₂, 2% AcOEt/hexane): methyl ester of **13** (178 mg, 41%) as a colorless liquid and methyl ester of **22** (110 mg, 26% yield) as a colorless liquid. Methyl ester of **13** (less polar) [25]: IR (neat): 2956s, 2936s, 2861m, 1781s, 1740s, 1457m, 1438m, 1381m, 1340m, 1248m, 1205s, 1182s, 1133m, 1114m, 1075m, 1051m, 1004s, 929m, 738m. ¹H-NMR (300 MHz, CDCl₃): 4.66 (*ddd*, *J* = 9.9, 8.2, 3.3, CHO); 3.78 (*s*, CO₂Me); 3.19 (*dd*, *J* = 10.0, 8.2, CHCO₂Me); 3.06 (*dq*, *J* = 10.0, 7.1, CHMe); 1.60–1.48 (*m*, CH₂); 1.46–1.24 (*m*, 3 CH₂); 1.30 (*d*, *J* = 7.1, CHMe); 0.90 (*app. t*, *J* = 6.8, (CH₂)₁₂Me). ¹³C-NMR (75 MHz, CDCl₃): 177.5 (C=O); 170.1 (C=O); 77.5 (OCH); 52.2 (OMe); 51.6 (CH); 36.3 (CH); 31.3 (CH₂); 31.1 (CH₂); 25.2 (CH₂); 22.3 (CH₂); 14.3 (Me); 13.8 (Me). EI-MS: 229 (0.92, [*M* + 1]⁺), 308 (3), 210 (0.86), 197 (4), 182 (5), 169 (12), 157 (34), 141 (4), 129 (77), 113 (13), 97 (39), 88 (10), 81 (10), 69 (100), 59 (35), 55 (31), 41 (52), 32 (5). Anal. calc. for C₁₂H₂₀O₄ (228.30): C 63.14, H 8.83; found: C 63.01, H 8.92.

Methyl ester of **22** (more polar): IR (neat): 2955s, 2862m, 1781s, 1738s, 1463m, 1439m, 1397m, 1380m, 1343m, 1271m, 1199s, 1177s, 1128m, 1099m, 1038m, 1016m, 995m, 931m, 879m, 797m, 772m, 729m. ¹H-NMR (300 MHz, CDCl₃): 4.40 (m, CHO); 3.70 (s, CO₂Me); 3.31 (dd, *J* = 7.5, 5.3, CHCO₂Me); 2.90 (m, CHMe); 1.75–1.22 (series of m, (CH₂)₄Me); 1.19 (d, *J* = 7.2, CHMe); 0.85 (m, (CH₂)₄Me). ¹³C-NMR (75 MHz, CDCl₃): 177.0 (C=O); 170.0 (C=O); 78.8 (OCH); 51.4 (OMe); 50.3 (CH); 38.8 (CH); 31.2 (CH₂); 30.6 (CH₂); 25.3 (CH₂); 22.2 (CH₂); 13.7 (Me); 10.1 (Me). EI-MS: 229 (9, [*M* + 1]⁺), 211 (2), 197 (8), 184 (5), 169 (51), 157 (14), 141 (12), 129 (29), 113 (29), 101 (46), 97 (22), 85 (16), 81 (28), 69 (100), 59 (47), 55 (40), 41 (63).

REFERENCES

- [1] C. M. Thompson, in 'Dianion Chemistry in Organic Synthesis', CRC Press, 1994.
- [2] N. R. Long, M. W. Rathke, *Synth. Commun.* **1981**, *11*, 687.
- [3] M. Pohmakotr, V. Reutrakul, T. Phongpradit, A. Chansri, *Chem. Lett.* **1982**, 687.
- [4] K. Furata, A. Misumi, A. Mori, N. Ikeda, H. Yamamoto, *Tetrahedron Lett.* **1984**, *25*, 669.
- [5] K. Furata, N. Ikeda, H. Yamamoto, *Tetrahedron Lett.* **1984**, *25*, 675.
- [6] K. K. Mahalanabis, M. Mumtaz, V. Snieckus, *Tetrahedron Lett.* **1982**, *23*, 3971.
- [7] K. K. Mahalanabis, M. Mumtaz, V. Snieckus, *Tetrahedron Lett.* **1982**, *23*, 3975.
- [8] M. P. Cooke Jr., *Tetrahedron Lett.* **1981**, *22*, 381.
- [9] P. J. Garratt, R. Zahler, *Tetrahedron Lett.* **1979**, *73*; K. G. Bilyard, P. J. Garratt, A. J. Underwood, R. Zahler, *Tetrahedron Lett.* **1979**, 1815.
- [10] P. J. Garratt, J. R. Porter, *Tetrahedron Lett.* **1987**, *28*, 351; P. J. Garratt, M. Pielke, J. R. Porter, *Tetrahedron Lett.* **1987**, *28*, 589.
- [11] C. W. Doecke, P. J. Garratt, *J. Chem. Soc., Chem. Commun.* **1981**, 873; K. G. Bilyard, P. J. Garratt, *Tetrahedron Lett.* **1981**, *22*, 1755; J.-G. Jun, B. P. Mundy, *Bull. Korean Chem. Soc.* **1987**, *8*, 310; E. J. Corey, W.-G. Su, *Tetrahedron Lett.* **1987**, *28*, 5241.
- [12] C. Girard, R. Bloch, *Tetrahedron Lett.* **1982**, *23*, 3683.
- [13] T. J. Donohoe, R. R. Harji, R. P. C. Cousins, *Chem. Commun.* **1999**, 141.
- [14] E. Lee, S. J. Choi, H. Kim, H. O. Han, Y. K. Kim, S. J. Min, S. H. Son, S. M. Lim, W. S. Jang, *Angew. Chem., Int. Ed.* **2002**, *41*, 176; A. S. Kende, Y. Fujii, J. S. Mendoza, *J. Am. Chem. Soc.* **1990**, *112*, 9645; A. S. Kende, J. S. Mendoza, Y. Fujii, *Tetrahedron* **1993**, *49*, 8015; A. Misumi, K. Iwanaga, K. Furata, H. Yamamoto, *J. Am. Chem. Soc.* **1985**, *107*, 3343.
- [15] B. K. Park, M. Nakagawa, A. Hirota, M. Nakayama, *J. Antibiot.* **1988**, *41*, 751; Y. Masaki, H. Arasaki, A. Itoh, *Tetrahedron Lett.* **1999**, *40*, 4829 and ref. cit. therein; J. Lertvorachon, P. Meepowpan, Y. Thebtaranonth, *Tetrahedron* **1998**, *54*, 14341.
- [16] M. M. Murta, M. B. M. de Azevedo, A. Greene, *J. Org. Chem.* **1993**, *58*, 7537 and ref. cit. therein; A. Ghatak, S. Sarkar, S. Ghosh, *Tetrahedron* **1997**, *53*, 17335 and ref. cit. therein.
- [17] C. J. Cavallito, D. M. Fruehauf, *J. Am. Chem. Soc.* **1948**, *70*, 3724; F. D' Onofrio, R. Margarita, L. Parlanti, G. Piancatelli, M. Shraga, *Chem. Commun.* **1998**, 185 and ref. cit. therein.
- [18] S. B. Mahato, K. A. I. Siddiqui, G. Bhattacharya, T. Ghosal, K. Miyahara, M. Sholichin, T. Kawasaki, *J. Nat. Prod.* **1987**, *50*, 245; S. Drioli, F. Celluga, C. Forzato, P. Nitti, G. Pitacco, E. Valentin, *J. Org. Chem.* **1998**, *63*, 2385; T. P. Loh, P. L. Lye, *Tetrahedron Lett.* **2001**, *42*, 3511; P. A. Jacobi, P. Herradura, *Tetrahedron Lett.* **1996**, *37*, 8297.
- [19] M. Asano, T. Azumi, *Ber. Dtsch. Chem. Ges.* **1935**, *68*, 995; E. E. van Tamelen, R. S. Bach, *J. Am. Chem. Soc.* **1958**, *80*, 3079; S. Huneck, G. Follmann, *Z. Naturforsch. B* **1967**, *22*, 666; A. Forster, J. Fitremann, P. Renaud, *Tetrahedron Lett.* **1998**, *39*, 7097 and ref. cit. therein; J. Mulzer, L. Kattner, A. R. Strecker, C. Schroder, J. Buschmann, C. Lehmann, P. Luger, *J. Am. Chem. Soc.* **1991**, *113*, 4218.
- [20] C. H. Bruckner, H. U. Reissig, *J. Org. Chem.* **1998**, *53*, 2440; M. P. Sibi, J. Ji, *Angew. Chem., Int. Ed.* **1997**, *36*, 274; J. Mulzer, N. Salimi, H. Hartl, *Tetrahedron: Asymmetry* **1993**, *4*, 457; M. Bella, R. Margarita, C. Orlando, M. Orsini, L. Parlanti, G. Piancatelli, *Tetrahedron Lett.* **2000**, *41*, 561; C. Boehm, O. Reiser, *Org. Lett.* **2001**, *3*, 1315.
- [21] S. Huneck, G. Follmann, *Z. Naturforsch. B* **1967**, *22*, 666; P. K. Mandal, S. C. Roy, *Tetrahedron* **1999**, *44*, 11395.
- [22] R. E. Ireland, R. H. Muller, A. K. Willard, *J. Am. Chem. Soc.* **1976**, *98*, 2868; D. A. Evans, C. H. Heathcock, in 'Asymmetric Synthesis', Vol. 3, Part B, Ed. J. D. Morrison, Academic Press, New York, 1984.

- [23] T. Martin, C. M. Rodriguez, V. S. Martin, *J. Org. Chem.* **1996**, *61*, 6450; M. P. Sibi, P. K. Deshpande, A. J. Loggia, *Synlett* **1996**, 343.
- [24] P. K. Mandal, S. C. Roy, *Tetrahedron* **1999**, *55*, 11395.
- [25] S. Drioli, F. Felluga, C. Forzato, P. Nihi, G. Pitacco, E. Valentin *J. Org. Chem.* **1998**, *63*, 2385.

Received June 27, 2002



Pergamon

SCIENCE @ DIRECT®

Tetrahedron Letters 44 (2003) 6717–6720

TETRAHEDRON
LETTERS

Vicinal dianions of diethyl α -aroylsuccinates: a general synthetic route to α -aroyl- and α -arylidene- γ -butyrolactones

Manat Pohmakotr,* Laddawan Sampaongoen, Arisara Issaree, Patoomratana Tuchinda and Vichai Reutrakul

Department of Chemistry, Faculty of Science, Mahidol University, Rama 6 Road, Bangkok 10400, Thailand

Received 29 May 2003; revised 14 June 2003; accepted 27 June 2003


Abstract—Vicinal dianions derived from diethyl α -aroylsuccinates were found to react with carbonyl compounds β -regioselectively to afford α -aroyl- γ -butyrolactones, which were converted into α -arylidene- γ -butyrolactones by reduction with H_2 /Pd-C followed by elimination employing methanesulfonyl chloride in pyridine. The method provides a general and convenient route to α -aroyl- and α -arylidene- γ -butyrolactones.

© 2003 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Carbon–carbon bond forming reactions based on the reactions of dianions are of interest, because high regio- and stereoselectivities towards electrophiles have been achieved.¹ Among these dianions, the vicinal dianions of succinic acid derivatives were extensively demonstrated to be useful reagents for the preparation of various classes of compounds.² In the course of our study on using succinic acid derivatives as versatile building blocks for synthesis of some natural products containing the γ -butyrolactone nucleus including lignans, we have recently reported the syntheses of ($\pm$)-lichesterinic acid, ($\pm$)-phaseolinic acid, ($\pm$)-nephromopsinic acid and ($\pm$)-dihydroprotolichesterinic acid by making use of the vicinal dianion derived from triethyl ethanetricarboxylate.³ In continuation of our above results, we wish to report herein the reactions of vicinal dianions of α -aroylsuccinic esters with carbonyl compounds. It could be envisaged that these vicinal dianions would react with carbonyl compounds β -

regioselectively to provide α -aroyl- γ -butyrolactones, which would be useful as the precursors for many synthetic manipulations. In this communication, the preparation of α -arylidene- γ -butyrolactones⁴ from α -aroyl- γ -butyrolactones is also reported.

The vicinal dianion **2a** was readily generated by treatment of α -benzoylsuccinic ester **1a**⁵ with lithium diisopropylamide (LDA, 2.1 equiv.) in tetrahydrofuran (THF) at -78°C for 1 h. The reaction of the vicinal dianion **2a** with benzaldehyde (1.1 equiv.) in the presence of ZnCl_2 (1.1 equiv.) at -78°C for 2 h, followed by slowly warming up to rt overnight afforded the expected α -aroyl- γ -butyrolactone **3a** in 74% yield as a mixture of diastereomers after quenching with 2N HCl. The formation of γ -butyrolactone **3a** revealed that the vicinal dianion **2** combined with benzaldehyde regioselectively at the β -carbon to furnish the β -hydroxy adduct which underwent lactonisation upon acidic



Scheme 1.








Keywords: dianions; diethyl α -aroylsuccinates; α -arylidene- γ -butyrolactones; α -aroyl- γ -butyrolactones.

* Corresponding author. Tel.: 066-02-2015158; fax: 066-02-6445126; e-mail: scmpk@mahidol.ac.th

work-up. Exclusive β -regioselectivities of the vicinal dianion **2a** with other aromatic aldehydes and isobutyraldehyde, as well as acetone and cyclohexanone (Table 1, entries 1–3 and 10–12) were observed (Scheme 1). Moderate to good yields of the corresponding γ -butyrolactones **3** as diastereomeric mixtures were obtained. The reactions of vicinal dianions **2b** and **2c** with aromatic

aldehydes under the same conditions gave moderate yields of γ -butyrolactones **3** as mixtures of diastereomers (Table 1, entries 4–9). The 3,4-*trans*-4,5-*cis*-isomer (TC-isomer) of γ -butyrolactones **3a–i** could be obtained in pure form by preparative thin-layer chromatography (silica gel). The relative stereochemistries of the TC-isomer of **3a** was concluded from NOE experiments.⁶

Table 1. Preparation of α -aroyl- γ -butyrolactones **3** and α -arylidene- γ -lactones **5**

Entry	1	Electrophile	Ar ¹	Ar ²	% Yields		
					3 ^{a, b, c}	4 ^d (diastereomeric ratio)	5 ^e
1	1a	Benzaldehyde	Ph	Ph	3a, 74 (61)	4a, quant. (90 : 10)	5a, 60 ^f
2	1a	Piperonal	Ph		3b, 71 (63)	4b, 61 (84 : 16)	5b, 92
3	1a	4-Methoxybenzaldehyde	Ph	4-MeOPh	3c, 65 (52)	4c, 65 (88 : 12)	5c, 91
4	1b	Benzaldehyde		Ph	3d, 50 (43)	4d, quant. ^d	5d, 75 ^f
5	1b	Piperonal			3e, 47 (37)	4e, 93 ^e	5e, 90
6	1b	4-Methoxybenzaldehyde		4-MeOPh	3f, 51 (43)	4f, quant. (90 : 10)	5f, 75 ^f
7	1c	Benzaldehyde	4-MeOPh	Ph	3g, 64 (55)	4g, 80 (88 : 12)	5g, 95
8	1c	Piperonal	4-MeOPh		3h, 65 (56)	4h, 87 ^d	5h, 91
9	1c	4-Methoxybenzaldehyde	4-MeOPh	4-MeOPh	3i, 57 (50)	— ^g	— ^g
10	1a	Acetone			3j (50)	 4i, 83 (65 : 35)	 5i, 83
11	1a	Cyclohexanone			3k (70)	— ^g	— ^g
12	1a	Isobutyraldehyde			3l, 63	— ^g	— ^g

^a Isolated yields.

^b Yields of the isolated 3,4-*trans*-4,5-*cis*-isomers of **3a–i** and the *trans*-isomers of **3j** and **3k** are given in parentheses.


^c Obtained as mixtures of diastereomers.

^d The ratio of diastereomers was not determined.

^e Obtained as a single diastereomer.

^f Overall yields based on compounds **3a**, **3d** and **3f**.

^g The reactions were not carried out.



Scheme 2.

Having obtained functionalized γ -butyrolactones **3** in an efficient way, we next demonstrated the synthetic utility of these γ -butyrolactones as precursors for syntheses of α -arylidene- γ -butyrolactones **5**. These synthetic transformations could be simply accomplished by successive reduction and elimination reactions. Thus, TC-3a was subjected to a catalytic hydrogenation (H_2 /Pd-C/EtOAc) to furnish alcohol **4a** as a 90:10 mixture of diastereomers, which was further treated with methanesulfonyl chloride in pyridine at rt for 3 h followed by heating at 60°C for 1 h to give *E*-benzylidene- γ -butyrolactone **5a** in 60% overall yield (Scheme 2). As shown in Table 1, compounds **5b–i** were prepared in good overall yields as *E*-isomers.⁷ The explanation for the formation of the *E*-isomer as the sole product could be due to the fact that elimination of the initially formed mesylate group of compound **4** proceeded via an E_2 -elimination followed by a conjugate addition–elimination of pyridine to the initially formed α -arylidene- γ -butyrolactones to lead to the thermodynamically more stable *E*-isomer. An E_{1cb} mechanism may also be responsible for these results. The *cis*-stereochemistry at C-4 and C-5 was confirmed by the NOE experiments of compound **3h**.⁸

In summary, we have shown that the vicinal dianions derived from α -aroylsuccinic esters react with carbonyl compounds regioselectively at the β -carbon in the presence of $ZnCl_2$ to furnish α -aroyl- γ -butyrolactones in moderate yields. These compounds could be used as useful precursors for the preparation of α -arylidene- γ -butyrolactones. Thus, our method described herein provides a general synthetic route to α -arylidene- γ -butyrolactones.


Acknowledgements

We thank the Thailand Research Fund for financial support (BRG/22/2544) to M.P. and the award of a Senior Research Scholar to V.R. Thanks are also made to the Higher Education Development Project: Postgraduate Education and Research Program in Chemistry for support. We are grateful to Professor Paul Knochel, LMU, Munich, Germany, for the HRMS and CHN determination of some compounds.


References

- Thompson, C. M. *Dianion Chemistry in Organic Synthesis*; CRP Press: Boca Raton, 1994.
- (a) Lim, S.-M.; Lang, W.-S. *Angew. Chem., Int. Ed. Engl.*

- 2002, *41*, 176–178; (b) Kende, A. S.; Mendoza, J. S.; Fujii, Y. *Tetrahedron* 1993, *49*, 8015–8038; (c) Izawa, T.; Ogino, Y.; Nishiyama, S.; Yamamura, S.; Kato, K.; Takita, T. *Tetrahedron* 1992, *48*, 1573–1580; (d) Kende, A. S.; Fujii, Y.; Mendoza, J. S. *J. Am. Chem. Soc.* 1990, *112*, 9645–9646; (e) Mitsumi, A.; Iwanaga, K.; Furuta, K.; Yamamoto, H. *J. Am. Chem. Soc.* 1985, *107*, 3343–3345.
- Pohmakotr, M.; Harnying, W.; Tuchinda, P.; Reutrakul, V. *Helv. Chim. Acta* 2002, *85*, 3793–3813.
- For some recent syntheses, see: (a) Reddy, G. S.; Neelakantan, P.; Iyengar, D. S.; *Synth. Commun.* 2002, *32*, 2601–2604; (b) Mali, R. S.; Babu, K. N. *Helv. Chim. Acta* 2002, *85*, 3525–3530; (c) Consorti, C.; Ebeling, G.; Dupont, J. *Tetrahedron Lett.* 2002, *43*, 753–755; (d) Grigg, R.; Savic, V. *Chem. Commun.* 2000, 2381–2382; (e) Jiaang, W.-T.; Wang, C.-L.; Tseng, A.; Chen, S.-T. *Heterocycles* 2000, *53*, 1569–1572; (f) Rossi, R.; Bellina, F.; Bechini, C.; Mannina, L. *Synthesis* 1997, 1061–1066; (g) Ishibashi, H.; Ito, K.; Tabuchi, M.; Ikeda, M. *Heterocycles* 1991, *32*, 1279–1282; (f) Lee, E.; Hur, C.-U.; Jeong, Y.-C.; Rhee, Y.-H.; Chang, M.-H. *J. Chem. Soc., Chem. Commun.* 1991, 1314–1315; (g) Jackson, W. R.; Perlmuter, P.; Smallridge, A. J. *Aust. J. Chem.* 1988, *41*, 251–261; (h) Bachi, M. D.; Bosch, E. *Tetrahedron Lett.* 1986, *27*, 641–644; (i) Tanaka, K.; Unema, H.; Yamgishi, N.; Ono, N.; Kaji, A. *Chem. Lett.* 1978, 653–656; (j) Janecki, T.; Blaszezyk, E. *Synthesis* 2001, 403–408; (k) Castulik, J.; Mazal, C. *Tetrahedron Lett.* 2001, *41*, 2741–2744.
- α -Aroylsuccinic esters **1** were prepared by reacting α -*N,N*-dimethylaminonitriles derived from aromatic aldehydes with diethyl fumarate in ethanol employing NaOEt as a base followed by hydrolysis of the resulting adducts with $CuSO_4$.⁹ Alternatively, these compounds could also be achieved by conjugate addition of aromatic aldehydes to diethyl fumarate catalysed by Stetter's catalyst [3-benzyl-5-(2-dihydroxy-ethyl)-4-methylthiazolium chloride] in ethanol at 80°C for 15 h.¹⁰




- Irradiation of H-4 resulted in 7.9% enhancement of H-5, but there was no effect on H-3. The enhancement of 8.5% of H-4 was observed, when H-5 was irradiated, but there was no enhancement of H-3.



7. The chemical shifts of the benzyldiene protons of compounds **5** appeared as doublets ($J=1.5$ – 1.8 Hz) at δ 7.6–7.75 ppm, comparable to the chemical shifts of the *E*-isomers of some related compounds reported in the literature, see for examples: (a) Hwang, E.-I.; Yun, B.-S.; Kim, Y.-K.; Kwon, B.-M.; Kim, H.-G.; Lee, H.-B.; Jeong, W.-J.; Kim, S.-U. *J. Antibiot.* **2000**, *53*, 903–911; (b) Banerji, J.; Das, B.; Chatterjee, A.; Shoolery, J. N. *Phytochemistry* **1984**, *23*, 2323–2327; (c) Stevens, D. R.; Whiting, D. A. *J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1* **1992**, 633–637.
8. Enhancements of 9.8 and 12.2% of H-4 and H-5 of **5h**

were observed upon irradiation of H-5 and H-4, respectively.



9. (a) Albright, J. D. *Tetrahedron* **1983**, *39*, 3207–3233 and references cited therein; (b) Reutrakul, V.; Nimgirawath, S.; Panichanun, S.; Ratananukul, P. *Chem. Lett.* **1979**, 399–400.
10. (a) Stetter, H. *Angew. Chem., Int. Ed. Engl.* **1976**, *15*, 639–712; (b) Stetter, H.; Kuhlmann, H. *Org. React.* **1991**, *40*, 407–438.



Pergamon

SCIENCE @ DIRECT®

Tetrahedron Letters 44 (2003) 7937–7940

TETRAHEDRON
LETTERS

Vicinal dianions of diethyl α -aroylsuccinates: preparation of functionalized-2,3-dihydrofurans and -furans, and diaxial 2,4-diaryl-3,7-dioxabicyclo[3.3.0]octanes

Manat Pohmakotr,* Arisara Issaree, Laddawan Sampaongoen, Patoomratana Tuchinda and Vichai Reutrakul

Department of Chemistry, Faculty of Science, Mahidol University, Rama 6 Road, Bangkok 10400, Thailand


Received 17 July 2003; revised 19 August 2003; accepted 1 September 2003

Abstract—Vicinal dianions of diethyl α -aroylsuccinates react with aromatic aldehydes to provide functionalized 2,3-dihydrofurans as the major products together with γ -butyrolactones after treatment of the adducts obtained with a catalytic amount of *p*-toluenesulfonic acid in refluxing toluene. *cis*-2,3-Dihydrofurans are used as precursors for the preparation of tetrasubstituted furans and diaxial 2,4-diaryl-3,7-dioxabicyclo[3.3.0]octanes.

© 2003 Published by Elsevier Ltd.


Substituted 2,3-dihydrofurans and furans are important classes of compounds due to their presence in a wide range of biologically active synthetic and natural products.¹ Moreover, some of them have been shown to be useful synthetic intermediates.² Therefore, efficient and general synthetic routes to these heterocycles^{3,4} are of interest. As part of our program devoted to the development of synthetic routes to these classes of compounds, a general method for the synthesis of substituted 2,3-dihydrofurans and furans based on the chemistry of vicinal dianions derived from α -aroylsuccinic esters was investigated. We

have recently described that these vicinal dianions react with carbonyl compounds in the presence of ZnCl_2 exclusively at the β -carbon to provide α -aroyl- γ -butyrolactones, which were demonstrated as useful intermediates for the preparation of naturally occurring α -arylidene- γ -butyrolactones.⁵ In connection with these results, we wish to report the preparation of functionalized-2,3-dihydrofurans and -furans as well as diaxial 2,4-diaryl-3,7-dioxabicyclo[3.3.0]octanes utilizing the vicinal dianions of diethyl α -aroylsuccinates as shown in Schemes 1 and 2.



Scheme 1.

* Corresponding author. Tel.: +66-022015158; fax: +66-026445126; e-mail: scmpk@mahidol.ac.th



Scheme 2.

The reaction of the vicinal dianion **2a** derived from **1a** by employing LDA (2 equiv.) in THF at -78°C for 1 h with benzaldehyde (1 equiv.) at -78°C for 2 h followed by quenching the reaction mixture with glacial acetic acid at the same temperature provided the crude adduct **3a**. Without purification, this was treated with a catalytic amount of *p*-toluenesulfonic acid in refluxing toluene for 2 h to afford the expected dihydrofuran **4a**⁶ in 71% yield as a mixture of *cis*- and *trans*-isomers together with γ -butyrolactone **5a** (13% yield). *cis*-**4a** was obtained in 59% yield as the major isomer after chromatography on silica gel. Under the standard conditions, the vicinal dianions **2a–c** reacted with aromatic aldehydes to give moderate yields of the desired dihydrofurans **4a–k** as mixtures of *cis*- and *trans*-isomers together with 5–15% yields of the corresponding γ -butyrolactones **5**. In all cases, the *cis*-isomers were obtained as the major isomers, and in most cases could be isolated pure by chromatography as summarized in Table 1. The relative *cis* and *trans* stereochemistries of compounds **4** were established by the coupling constants between H-2 and H-3 (J_{cis} =

10.9–11.0 Hz and J_{trans} = 6.8–7.1 Hz) and the results of NOE experiments.⁷

Having succeeded in preparing in one-step the dihydrofurans **4** possessing aryl substituents, we further illustrated the synthetic utility of our method by the preparation of 2,5-diaryl-3,4-dicarboethoxyfurans, which are important precursors for syntheses of lignans^{2a,b,8} and 2,4-diaryl substituted 3,7-dioxabicyclo[3.3.0]octanes **9**. Thus, conversion of *cis*-**4** into furan **6** could be achieved smoothly by dehydrogenation employing 2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone (DDQ) in refluxing benzene for 5 h.⁹ Furans **6a–f** were obtained in good yields (Table 2). Dehydrogenation of *trans*-**4** was found to proceed slower than *cis*-**4** under the standard conditions. Thus, when a mixture of *cis*- and *trans*-**4b** was treated with DDQ in benzene under reflux for 5 h, the *cis*-isomer **4b** was completely converted into furan **6b**, while the *trans*-isomer **4b** was still present in the mixture as shown by thin-layer chromatography. The reaction was complete after refluxing for 20 h and **6b** was obtained in 92%

Table 1. Preparation of 2,3-dihydrofurans **4**

Entry	1	Electrophile	Ar ¹	Ar ²	% Yields ^a					5 ^b
					4	<i>cis</i> -4	<i>trans</i> -4	<i>cis</i> -4+ <i>trans</i> -4 (<i>cis:trans</i>)		
1	1a	Benzaldehyde	Ph	Ph	4a	59	12	—	—	13
2	1a	Piperonal	Ph	Piperonyl	4b	41	10	—	—	5
3	1a	4-Methoxybenzaldehyde	Ph	4-MeOPh	4c	50	13	—	—	11
4	1a	Isobutyraldehyde	Ph	<i>i</i> -Pr	4d	—	—	63 (66:34)	— ^c	—
5	1b	Benzaldehyde	Piperonyl	Ph	4e	41	7	—	—	7
6	1b	Piperonal	Piperonyl	Piperonyl	4f	26	—	13 (80:20)	—	8
7	1b	4-Methoxybenzaldehyde	Piperonyl	4-MeOPh	4g	30	—	11 (74:26)	—	10
8	1b	Isobutyraldehyde	Piperonyl	<i>i</i> -Pr	4h	—	—	55 (67:33)	— ^c	—
9	1c	Benzaldehyde	4-MeOPh	Ph	4i	53	— ^c	—	—	15
10	1c	Piperonal	4-MeOPh	Piperonyl	4j	39	11	—	—	11
11	1c	4-Methoxybenzaldehyde	4-MeOPh	4-MeOPh	4k	37	— ^c	—	—	13

^a Isolated yields. All compounds were fully characterized by IR, MS, 300 MHz ¹H and 75 MHz ¹³C NMR spectra as well as by elemental analyses or HRMS.

^b Contained mainly the 3,4-*trans*-4,5-*cis*-isomer.

^c Could not be isolated.

Table 2. Preparation of compounds 6–9

cis-4	Ar ¹	Ar ²	% Yields ^a			
			6	7	8	9
cis-4a	Ph	Ph	6a, 85	7a, 85	8a, 83	9a, 70
cis-4b	Ph	Piperonyl	6b, 95	7b, 86	8b, 89	9b, 82
cis-4c	Ph	4-MeOPh	6c, 90	7c, 88	8c, 82	9c, 75
cis-4e	Piperonyl	Ph	6b, 93	— ^b	— ^b	— ^b
cis-4f	Piperonyl	Piperonyl	6d, 94	7d, 86	8d, 80	9d, 74
cis-4i	4-MeOPh	Ph	6c, 96	— ^b	— ^b	— ^b
cis-4j	4-MeOPh	Piperonyl	6e, 95	7e, 89	8e, 84	9e, 75
cis-4k	4-MeOPh	4-MeOPh	6f, 93	7f, 83	8f, 82	9f, 76

^a Isolated yields. All compounds were fully characterized by IR, MS, 300 MHz ¹H and 75 MHz ¹³C NMR spectra as well as by elemental analyses or HRMS.

^b The reactions were not performed.

yield. On the other hand, tetrahydrofurotetrahydrofurans **9** were prepared in good overall yields by a simple three-step synthesis starting from *cis*-dihydrofurans **4**. Catalytic hydrogenation (10% Pd on C) of *cis*-**4a** in ethyl acetate at rt afforded a good yield (85%) of the all-*cis*-**7a** as the sole isomer. Reduction of **7a** with LiAlH₄ in THF at rt for 30 min gave **8a** in 83% yield after chromatography on silica gel. Treatment of **8a** with *p*-toluenesulfonyl chloride in pyridine¹⁰ at rt overnight furnished the expected tetrahydrofurotetrahydrofuran **9a** in 70% yield. The ¹H and ¹³C NMR data of **9a** were consistent with reported values.¹¹ Thus, the formation of **9a** as the sole product and in good yield confirmed the all-*cis*-stereochemistry in **7a**. Under the same reaction sequence and conditions, tetrahydrofurotetrahydrofurans **7b–f** were prepared in good yields from *cis*-2,3-dihydrofurans **4b**, **4c**, **4f**, **4j** and **4k**, respectively.

In summary, our results demonstrate that the vicinal dianions derived from diethyl α -aroylsuccinates react with aldehydes regioselectively at the β -carbon to provide a mixture of *cis*- and *trans*-2,3-dihydrofurans as the major products along with γ -butyrolactones. This method provides an easy entry to 2,5-diaryl substituted dihydrofurans, of which both aryl groups can be varied by using appropriate α -aroylsuccinic esters and aromatic aldehydes. Furthermore, *cis*-2,3-dihydrofurans have been proved to be very useful for the preparation of 2,5-diaryl-3,4-dicarboethoxyfurans and diaxial 2,4-diaryl-3,7-dioxabicyclo[3.3.0]octanes.

Acknowledgements


We thank the Thailand Research Fund for financial support (BRG/22/2544) to M.P. and the award of a Senior Research Scholar to V.R. A.I. thanks the Ministry of University Affairs for a scholarship. Thanks are also made to the Higher Education Development Project: Postgraduate Education and Research Program in Chemistry (PERCH) for support. We are grateful to Professor Paul Knochel, LMU, Munich, Germany, for the HRMS and CHN determination of some compounds.

References

- (a) Dean, F. M. In *Advances in Heterocyclic Chemistry*; Katritzky, A. R., Ed.; Academic: New York, 1982; Vol. 30, pp. 167–238; (b) Dean, F. M.; Sargent, M. V. *Comprehensive Heterocyclic Chemistry*; Bird, C. W., Cheeseman, G. W. H., Eds.; Pergamon: New York, 1984; Vol. 4, Part 3, pp. 531–598; (c) Fraga, B. M. *Nat. Prod. Rep.* **1992**, *9*, 217–242; Merritt, A. T.; Ley, S. V. *Nat. Prod. Rep.* **1992**, *9*, 243–287; (d) Mortensen, D. S.; Rodriguez, A. L.; Carlson, K. E.; Sun, J.; Katzenellenbogen, B. S.; Katzenellenbogen, J. A. *J. Med. Chem.* **2001**, *44*, 3838–3848; (e) Mortensen, D. S.; Rodriguez, A. L.; Sun, J.; Katzenellenbogen, B. S.; Katzenellenbogen, J. A. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2001**, *11*, 2521–2524; (f) Dikshit, D. K.; Singh, S.; Singh, M. M.; Kamboj, V. P. *Indian J. Chem. B* **1990**, *29B*, 954–960; (g) Peterson, J. R.; Horsley, D. B.; Brozik, J. A.; Rogers, R. D. *Acta Cryst., Sect. C* **1992**, *48*, 1164–1167.
- (a) Garzino, F.; Méou, A.; Brun, P. *Eur. J. Org. Chem.* **2003**, 1410–1414; (b) Garzino, F.; Méou, A.; Brun, P. *Synthesis* **2003**, 598–602; (c) Garzino, F.; Méou, A.; Brun, P. *Tetrahedron Lett.* **2002**, *43*, 5049–5051; (d) Aldous, D. J.; Dalencon, A. J.; Steel, P. G. *Org. Lett.* **2002**, *4*, 1159–1162; (e) Garzino, F.; Méou, A.; Brun, P. *Tetrahedron Lett.* **2002**, *41*, 9803–9807; (f) Yang, F. Z.; Trost, M. K.; Fristad, W. E. *Tetrahedron Lett.* **1987**, *28*, 1493–1496; (g) Wu, A.; Wang, M.; Pan, X. *Synth. Commun.* **1997**, *27*, 2087–2091; (h) Schneiders, G. E.; Stevenson, R. *J. Org. Chem.* **1981**, *46*, 2969–2971.
- For some recent syntheses of dihydrofurans, see: (a) Trost, B. M.; Rhee, Y.-H. *J. Am. Chem. Soc.* **2003**, *125*, 7482–7483; (b) Calo, V.; Scordari, F.; Nacci, A.; Schingaro, E.; D'Accolti, L.; Monopoli, A. *J. Org. Chem.* **2003**, *68*, 4406–4409 and references cited therein; (c) Zhang, Y.; Raines, A. J.; Flowers, II, R. A. *Org. Lett.* **2003**, *5*, 2363–2365; (d) Antonioletti, R.; Malancona, S.; Cattruzza, F.; Bovicelli, P. *Tetrahedron* **2003**, *59*, 1673–1678; (e) Antonioletti, R.; Malancona, S.; Bovicelli, P. *Tetrahedron* **2002**, *58*, 8825–8831; (f) Feldman, K. S.; Wroblewski, M. L. *J. Org. Chem.* **2000**, *65*, 8659–8668; (g) Davies, H. M. L.; Ahmed, G.; Calvo, R. L.; Churchill, M. R.; Churchill, D. G. *J. Org. Chem.* **1998**, *63*, 2641–2645; (h) Garrido, J. L.; Alonso, I.; Carretero, J. C. *J. Org. Chem.* **1998**, *63*, 9406–9413; (i) Doyle, M. P.

Forbes, D. C.; Protopopova, M. N.; Stanley, S. A.; Vasbinder, M. M.; Xavier, K. R. *J. Org. Chem.* **1997**, *62*, 7210–7215; (j) Alonso, I.; Carretero, J. C.; Garrido, J. L.; Magro, V.; Pedregal, C. *J. Org. Chem.* **1997**, *62*, 5682–5683; (k) Hagiwara, H.; Sato, K.; Suzuki, T.; Ando, M. *Tetrahedron Lett.* **1997**, *38*, 2103–2106; (l) Roy, S. C.; Mandel, P. K. *Tetrahedron* **1996**, *52*, 2193–2198.

4. (a) For a review on recent syntheses of furans, see: Hou, X. L.; Cheung, H. Y.; Hon, T. Y.; Kwan, P. L.; Lo, T. H.; Tong, S. Y.; Wong, H. N. C. *Tetrahedron* **1998**, *54*, 1955–2020; (b) Rao, H. S. P.; Jothilingam, S. *J. Org. Chem.* **2003**, *68*, 5392–5394; (c) Nishibayashi, Y.; Yoshikawa, M.; Inada, Y.; Milton, M. D.; Hidai, M.; Uemura, S. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2003**, *42*, 2681–2684; (d) Kim, J. T.; Kellin, A. V.; Gevorgyan, V. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2003**, *42*, 98–101; (e) Ma, S.; Zhang, J. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2003**, *42*, 184–186; (f) Aurrecoechea, J. M.; Pe'rez, E. *Tetrahedron Lett.* **2003**, *44*, 3263–3266; (g) Yavari, I.; Anary-Abbasinejad, M.; Alizadeh, A. *Tetrahedron Lett.* **2003**, *43*, 4503–4505; (h) Aurrecoechea, J. M.; Pe'rez, E. *Tetrahedron Lett.* **2001**, *42*, 3839–3841; (i) Nair, V.; Vinod, A. U. *Chem. Commun.* **2000**, 1019–1020; (j) Ma, S.; Zhang, J. *Chem. Commun.* **2000**, 117–118; (k) Pei, W.; Pei, J.; Li, S.; Ye, X. *Synthesis* **2000**, 2069–2077.
5. Pohmakotr, M.; Sampaongoen, L.; Issaree, A.; Tuchinda, P.; Reutrakul, V. *Tetrahedron Lett.* **2003**, *44*, 6717–6720.
6. Acid- or Lewis acid-catalyzed formation of dihydrofurans from γ -hydroxy carbonyl compounds, see: (a) Box, V. G. S.; Brown, D. P. *Heterocycles* **1991**, *32*, 1273–1277; (b) Reissig, H. U.; Holzinger, H.; Glomsda, G. *Tetrahedron* **1989**, *45*, 3139–3150; (c) Mukaiyama, T.; Hayashi, M.; Ichikawa, J. *Chem. Lett.* **1986**, 1157–1160; (d) Reissig, H. U.; Reichelt, I.; Lorey, H. *Liebigs Ann. Chem.* **1986**, 1924–1939.
7. NOE experiments for *cis*-**4b** and *trans*-**4b** were carried out. The results are as shown below. Upon irradiation of H-2 and H-3, *cis*-**4b** showed the NOE effects of H-3 (12.6%) and H-2 (10.5%), but displayed no enhancements in case of *trans*-**4b**.



The coupling constants J_{cis} of compounds **4** are larger than J_{trans} .^{4f}

8. For a recent review, see: Ward, R. S. *Nat. Prod. Rep.* **1999**, *16*, 75–96.
9. Dehydrogenation of dihydrofurans to furans using DDQ, see: (a) Garzino, F.; Méou, A.; Brun, P. *Helv. Chim. Acta* **2002**, *85*, 1989–1998; (b) Chambers, J. J.; Kurrasch-Orbaugh, D. M.; Parker, M. A.; Nichols, D. E. *J. Med. Chem.* **2001**, *44*, 1003–1010; (c) Axelle, A.; Frédérique, T.; Gérald, G.; Jean-Yves, M. *Synthesis* **1999**, 1241–1245; (d) Hirota, T.; Matsushita, T.; Sasaki, K.; Kashino, S. *Heterocycles* **1995**, *41*, 2565–2574; (e) Clawson, P.; Lunn, P. M.; Whiting, D. A. *J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1* **1990**, 153–161.
10. Preparation of tetrahydrofurans from 1,4-diols employing *p*-toluenesulfonyl chloride or methanesulfonyl chloride in pyridine, see: (a) Brown, R. C. D.; Bataille, C. J. R.; Hinks, J. D. *Tetrahedron Lett.* **2001**, *41*, 473–475; (b) Brown, R. C. D.; Bataille, C. J. R.; Bruton, G.; Hinks, J. D.; Swain, N. A. *J. Org. Chem.* **2001**, *66*, 6719–6728; (c) Dantzig, A.; LaLonde, R. T.; Ramdayal, F.; Shepard, R. L.; Yanai, K.; Zhang, M. *J. Med. Chem.* **2001**, *44*, 180–185; (d) Yamaguchi, S.; Tanaka, T.; Kinoshita, Y. *J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1* **2001**, 2158–2160; (e) Ohmizu, H.; Ogiku, T.; Iwasaki, T. *Heterocycles* **2000**, *52*, 1399–1409; (f) Ogiku, T.; Yoshida, S.; Ohmizu, H.; Iwasaki, T. *J. Org. Chem.* **1995**, *60*, 1148–1153; (g) Tomioka, K.; Koga, K. *Heterocycles* **1979**, *12*, 1523–1528.
11. Pelter, A.; Ward, R. S.; Collins, P.; Venkateswarlu, R.; Kamashi, C. *Tetrahedron Lett.* **1992**, *33*, 4361–4364.

Highly diastereoselective alkylation of vicinal dianions of chiral succinic acid derivatives: a new general strategy to (*R*)- β -arylmethyl- γ -butyrolactones

Manat Pohmakotr,^{*} Darunee Soorukram, Patoomratana Tuchinda, Samran Prabpai, Palangpon Kongsaree and Vichai Reutrakul

Department of Chemistry, Faculty of Science, Mahidol University, Rama 6 Road, Bangkok 10400, Thailand

Received 12 December 2003; revised 8 March 2004; accepted 2 April 2004

Abstract—The vicinal dianions derived from chiral succinic acid derivatives, 1,4-bis[(4*R*,5*S*)-3,4-dimethyl-2-oxo-5-phenylimidazolidin-1-yl]butane-1,4-dione and 1,4-bis[(4*S*,5*R*)-3,4-dimethyl-2-oxo-5-phenylimidazolidin-1-yl]butane-1,4-dione react with arylmethyl bromides with high diastereo- and regio-selectivity to provide the corresponding chiral α -arylmethylated succinic acid derivatives; the (*R*)-products are converted into (*R*)- β -arylmethyl- γ -butyrolactones and (*R*)- α -arylmethyl- γ -butyrolactones.
© 2004 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Succinic acid derivatives are of importance because they can serve as four-carbon building blocks in organic synthesis. Having considered the basic skeleton of many classes of compounds such as lignans¹ possessing a γ -butyrolactone or tetrahydrofuran nucleus, it was found that such compounds consisting of a four-carbon unit could be considered as a carbon backbone derived from succinic acid derivatives. Therefore, considerable attention has been focused on the synthetic utilities of succinic acid derivatives.² In connection with our recent reports on the synthetic utilities of vicinal dianions derived from α -arylsuccinic esters as useful reagents for the synthesis of α -arylidene-paraconic esters and furofurans,³ it is of interest to extend our investigation on new synthetic strategies to chiral γ -butyrolactone frameworks, especially some bioactive naturally occurring γ -butyrolactone lignans. We therefore studied the generation and diastereoselective alkylation of vicinal dianions derived from chiral succinic acid derivatives.⁴ This study is focused on a new general diastereoselective synthesis of chiral β -arylmethylated γ -butyrolactones, which are versatile intermediates for the asymmetric syntheses of lignans. Several synthetic approaches for the optically active β -arylmethyl- γ -butyrolactones have been published.⁵ The vicinal dianion **2a** was generated by reacting

chiral succinic acid derivative **1a** with 2 equiv of LDA in THF at -78°C for 1 h. Treatment of **2a** with 1 equiv of benzyl bromide at -78°C for 5 h afforded the benzylated product **3a** in 50% yield as a single diastereomer, together with the recovered starting material **1a** in 41% yield. A better yield of **3a** (75%) was obtained, when 2.2 equiv of benzyl bromide were employed under the same conditions. It is noteworthy that the reaction using 1 or 2 equiv of benzyl bromide gave only the monobenzylated product **3a**.^{6,7} The (*S*)-configuration at the new stereocenter of compound **3a** was confirmed by converting into the corresponding known (*S*)- α -benzylsuccinic acid.⁸ When the reaction was carried out in the presence of DMPU and slowly warmed up from -78°C to room temperature overnight, a complex mixture of products was obtained as revealed by TLC and ¹H NMR data. Having the standard conditions, we next investigated the reactions of the vicinal dianion **2a** with methyl iodide and allyl bromide. The products **3b** and **3c** were also obtained as a single diastereomer in moderate yields as indicated in Table 1 (entries 2 and 3, Scheme 1).

Similarly, the vicinal dianion **2b** could be generated from **1b** and reacted with arylmethyl bromides (2.2 equiv) at -78°C for 5 h to give arylmethylated products **4a–c** in moderate yields (Table 1, entries 4–6). The reaction proceeded with high diastereo- and regio-selectivities; all compounds **4a–c** were obtained as a single diastereomer. The configuration of the new chiral center of **4b** was proved to be (*R*) by single crystal X-ray diffraction

Keywords: Vicinal dianion; Chiral succinic acid; γ -butyrolactone.



^{*} Corresponding author. Tel.: +66-02-2015158; fax: +66-02-6445126; e-mail: scmpk@mahidol.ac.th

Table 1. Alkylation of vicinal dianions **2a** and **2b**


Entry	1	RX	3^b or 4^b , R =	Yield (%) ^a
1	1a	PhCH ₂ Br	3a , PhCH ₂	75
2	1a	MeI	3b , Me	48
3	1a	CH ₂ =CHCH ₂ Br	3c , CH ₂ =CHCH ₂	49
4	1b	3,4-MeOPhCH ₂ Br	4a , 3,4-MeOPhCH ₂	53
5	1b	3-MeOPhCH ₂ Br	4b , 3-MeOPhCH ₂	67
6	1b	3,4-CH ₂ (O) ₂ PhCH ₂ Br	4c , 3,4-CH ₂ (O) ₂ PhCH ₂	67

^a Isolated yields. All compounds were fully characterized by ¹H NMR, ¹³C NMR, MS, and CHN analyses or HRMS.

^b The specific rotation values, [α]_D²⁵ of **3a–c** and **4a–c** are as follows: **3a**, +127.84 (*c* 0.51, MeOH); **3b**, +117.45 (*c* 0.55, CHCl₃); **3c**, +107.50 (*c* 0.64, CHCl₃); **4a**, –45.02 (*c* 0.31, CHCl₃); **4b**, –64.57 (*c* 0.70, CHCl₃); **4c**, +46.85 (*c* 0.29, CHCl₃).


**Scheme 1.****Figure 1.** Crystal structure of compound **4b**.

analysis⁹ (Fig. 1), which suggested the simple model for the stereochemical course of the benzylation of the vicinal dianion **2b** shown in Figure 2.

**Figure 2.** Proposed models for the stereochemical course of the alkylation of the vicinal dianions **2a** and **2b**.

Based on the evidence that Li-chelated (*Z*)-enolates were formed upon treatment of 1-acyl-2-imidazolidinones with LDA,¹⁰ the vicinal dianion intermediate **2b** is proposed to exist in the (*Z,Z*)-configuration possessing the defined six-membered ring chelate structure **2b-A**. In the formation of **4a–c**, the arylmethyl bromides would approach from the *Re*-face of the vicinal dianion **2b-A** to avoid the steric repulsion with phenyl and methyl groups leading to an intermediate **2b-B**. The second arylmethylation of **2b-B** does not occur due to the steric hindrance between the α -arylmethyl and the chiral auxiliary phenyl groups. As similar model **2a-A** may also be applied to the alkylation of the vicinal dianion **2a**, in which the alkylating agent approaches from the *Si*-face (Fig. 2).

Having established that highly diastereoselective alkylation of the vicinal dianion **2b** furnishes the single diastereomer of compounds **4a–c** possessing the (*R*)-configuration at the α -carbon, we turn our attention to the preparation of (+)- β -arylmethyl- γ -butyrolactones. This could be accomplished by a hydrolysis–anhydride



Scheme 2.

formation–reduction sequence, starting from chiral succinic acid derivatives **4** (Scheme 2).

Thus, hydrolyses of **4a–c** employing LiOH (5 equiv) in aqueous THF under reflux for 40–42 h provided the corresponding succinic acid derivatives **5a–c** in good yields after acidic work-up.¹¹ Treatment of these acids with excess Ac₂O at 0 °C afforded the corresponding acid anhydrides **6** in quantitative yields. Reduction of **6** with NaBH₄ in THF at 0–5 °C for 1 h afforded the mixtures of the expected (*R*)-β-arylmethyl-γ-butyrolactones **7**¹² and (*R*)-α-arylmethyl-γ-butyrolactones **8**,¹² which could be separated by chromatography on silica gel.

In conclusion, we have described a general entry to an enantioselective synthesis of (*R*)-β-arylmethyl-γ-butyrolactones. The method involves highly regio- and diastereoselective arylmethylations of the vicinal dianions derived from chiral succinic acid derivatives, 1,4-bis[(4*R*,5*S*)-3,4-dimethyl-2-oxo-5-phenylimidazolidin-1-yl]butane-1,4-dione and 1,4-bis[(4*S*,5*R*)-3,4-dimethyl-2-oxo-5-phenylimidazolidin-1-yl]butane-1,4-dione. It is anticipated that the methodology described herein will find a number of useful applications in asymmetric synthesis of lignans.


Acknowledgements

We thank the Thailand Research Fund for financial support (BRG/22/2544) to M.P. and the award of a Senior Research Scholar to V.R. D.S. thanks the Development and Promotion of Science and Technology Talent Project (DPST) for a scholarship. Thanks are also made to the Higher Education Development Project: Postgraduate Education and Research Program in Chemistry (PERCH) for support. We are grateful to Professor Paul Knochel, LMU, Munich, Germany, for the HRMS and CHN determination of some compounds.



References and notes

1. Ayres, D. C.; Loike, J. D. *Lignans: Chemical, Biological and Clinical Properties*; Cambridge University Press: Cambridge, 1990; Ward, R. S. *Nat. Prod. Rep.* **1999**, *16*, 75–96.
2. For examples, see: (a) Csa'ky, A. G.; Plumet, J. *Chem. Soc. Rev.* **2001**, *30*, 313–320; (b) Sibi, M. P.; Liu, P.; Ji, J.; Hajra, S.; Chen, J. *J. Org. Chem.* **2002**, *67*, 1738–1745; (c) Sibi, M. P.; Hasegawa, H. *Org. Lett.* **2002**, *4*, 3347–3349; (d) Langer, T.; Illich, M.; Helmchen, G. *Synlett* **1996**, 1137–1139; (e) Beckett, R. P.; Crimmin, M. J.; Davis, M. H.; Spavold, Z. *Synlett* **1993**, 137–138.
3. (a) Pohmakotr, M.; Sampaongoen, L.; Issaree, A.; Tuchinda, P.; Reutrakul, V. *Tetrahedron Lett.* **2003**, *44*, 6717–6720; (b) Pohmakotr, M.; Issaree, A.; Sampaongoen, L.; Tuchinda, P.; Reutrakul, V. *Tetrahedron Lett.* **2003**, *44*, 7937–7940.
4. Syntheses based on vicinal anion of (–)-dimenthyl succinate, see: (a) Lee, E.; Choi, S.-J.; Kim, H.; Han, H.-O.; Kim, Y.-K.; Min, S.-I.; Son, S.-H.; Lim, S.-M.; Jang, W.-S. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2002**, *41*, 176–179; (b) Kende, A. S.; Fujii, Y.; Mendoza, J. S. *J. Am. Chem. Soc.* **1990**, *112*, 9645–9646; (c) Misumi, A.; Iwanaga, K.; Furuta, K.; Yamamoto, H. *J. Am. Chem. Soc.* **1985**, *107*, 3343–3345.
5. (a) Bolm, C.; Palazzi, C.; Francio, G.; Leitner, W. *Chem. Commun.* **2002**, 1588–1589; (b) Doyle, M. P.; Hu, W.; Valenzuela, M. V. *J. Org. Chem.* **2002**, *67*, 2954–2959, and references cited therein; (c) Caro, Y.; Masaguer, C. F.; Ravina, E. *Tetrahedron: Asymmetry* **2001**, *12*, 1723–1726; (d) Takekawa, Y.; Shishido, K. *J. Org. Chem.* **2001**, *66*, 8490–8503; (e) Kamlage, S.; Sefkow, M.; Zimmermann, N.; Peter, M. G. *Synlett* **2002**, 77–80; (f) Kamlage, S.; Sefkow, M.; Pool-Zobel, B. L.; Peter, M. G. *Chem. Commun.* **2001**, 331–332; (g) Sibi, M. P.; Liu, P.; Johnson, M. D. *Can. J. Chem.* **2000**, *78*, 133–138; (h) Chenevert, R.; Mohammadi Ziarani, G.; Caron, D.; Dasser, M. *Can. J. Chem.* **1999**, *77*, 223–226; (i) Brinksmas, J.; Deen, H. V. D.; Oeveren, A. V.; Feringa, B. L. *J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1* **1998**, 4159–4163; (j) Charlton, J. L.; Chee, G. *Can. J. Chem.* **1997**, *75*, 1076–1083; (k) Gagnon, R.; Gagnon, G.; Groussain, E.; Pedragosa-Moreau, S.; Richardson, P. F.; Roberts, S. M.; Willetts, A. J.; Alphand, V.; Letreton, J.; Furstoss, R. *J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1* **1995**, 2527–2528; (l) Lemoult, S. C.; Richardson, P. F.; Roberts, S. M. *J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1* **1995**, 89–91; (m) Itoh, T.; Chika, J.; Takagi, Y.; Nishiyama, S. *J. Org. Chem.* **1993**, *58*, 5717–5723; (n) Morimoto, T.; Chiba, M.; Achiwa, K. *Tetrahedron* **1993**, *49*, 1793–1806; (o) Koch, S. S. C.; Chamberlin, A. R. *J. Org. Chem.* **1993**, *58*, 2725–2737; (p) Filho, H. C. A.; Filho, U. F. L.; Pinheiro, S.; Vasconcellos, M. L. A. A.; Costa, P. R. *Tetrahedron: Asymmetry* **1994**, *5*, 1219–1220; (q) Takano, S.; Ohashi, K.; Sugihara, T.; Ogasawara, K. *Chem. Lett.* **1991**, 203–206; (r) Morimoto, T.; Chiba, M.; Achiwa, K. *Tetrahedron Lett.* **1990**, *31*, 261–264; (s) Morimoto, T.; Chiba, M.; Achiwa, K. *Heterocycles* **1990**, *30*, 363–366; (t) Shao, L.; Miyata, S.; Muramatsu, H.; Kawano, H.; Ishii, Y.; Saburi, M.; Uchida, Y. *J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1* **1990**, 1441–1445; (u) Yoda, H.; Kitayama, H.; Katagiri, T.; Takabe, K. *Tetrahedron* **1990**, *48*, 3313–3322.
6. Treatment of **1a** with 1 equiv of LDA, followed by reacting with 1 or 2 equiv of benzyl bromide under the standard conditions provided a low yield of the expected product **3a**.
7. Attempts to prove the presence of the vicinal dianion **2a** by quenching with D₂O were unsuccessful. No deuterium incorporation was observed as revealed by ¹H NMR and MS. In spite of these results, it was still assumed that the

vicinal dianion **2a** was generated under the conditions described. This may be due to a strong H-bonded complex between diisopropylamine and the dilithiated derivative. Such interaction effecting incomplete deuteration of the generated lithium derivative was reported by Seebach (Laube, T.; Dunitz, J. D.; Seebach, D. *Helv. Chim. Acta*, **1985**, 68, 1373–1393). The reaction of the vicinal dianion **2a** with 2.2 equiv of benzyl bromide at -78°C to room temperature overnight (12–16 h) afforded dibenzylated product **9** in 20–30% yields together with 30–40% yields of the chiral auxiliary, (4*S*,5*R*)-(+)-1,5-dimethyl-4-phenyl-2-imidazolidinone and compound **11**. The formation of **9** supported the presence of the vicinal dianion **2a**. Compound **9** was obtained as a single diastereomer and its structure is proposed as shown below. The results also indicated that the vicinal dianion **2a** slowly decomposed during warming from -78°C to rt to provide **10** and **11**.



9, $[\alpha]_D^{25} = +146.3$ (*c* 1.226, CHCl_3)




8. $[\alpha]_D^{31}$ (observed) -20.19 (*c* 2.08, EtOAc). Lit. $[\alpha]_D^{25} -27$ (*c* 2, EtOAc); Cohen, S. G.; Milovanovic, A. *J. Am. Chem. Soc.* **1968**, 90, 3495–3502.
9. Crystal data for **4b**: $\text{C}_{34}\text{H}_{38}\text{N}_4\text{O}_5$, MW = 582.70, orthorhombic, space group $P2_12_12_1$, $a = 8.1187(5)$, $b = 10.1120(5)$, $c = 38.5830(5)$ Å, $V = 3167.5(3)$ Å³, $Z = 4$, $D_{\text{calc}} = 1.222$ Mg/m³. A total of 2,115 unique reflections (1,724 observed, $|F_o| > 4\sigma|F_o|$) were measured at room temperature from a $0.30 \times 0.15 \times 0.15$ mm³ colorless crystal using graphite monochromated Mo K α radiation ($\lambda = 0.71073$ Å) on a Bruker–Nonius kappaCCD diffractometer. The crystal structure was solved by direct methods using SIR-97, and then all atoms except hydrogen atoms were refined anisotropically on F^2 using SHELXL-97 to give a final *R*-factor of 0.0493 and $wR = 0.1130$ (all data). Atomic coordinates, bond lengths, bond angles, and thermal parameters have been deposited with the Cambridge Crystallographic Data Centre, 12 Union Road, Cambridge CB2 1EZ, ENGLAND (CCDC 216625).
10. Kise, N.; Ueda, T.; Kumada, K.; Terao, Y.; Ueda, N. *J. Org. Chem.* **2000**, 65, 464–468, and references cited therein.
11. The chiral auxiliary was recovered in 85–95% yields and could be reused without loss of diastereoselectivity.
12. Specific rotation values for **7a–c** and **8a–c**. **7a**: $[\alpha]_D^{28} +8.75$ (*c* 0.32, CHCl_3); Lit.⁵ⁱ: $[\alpha]_D^{24} +8.3$ (*c* 1.33, CHCl_3). **7b**: $[\alpha]_D^{31} +7.31$ (*c* 0.74, CHCl_3); Lit.^{5k}: $[\alpha]_D^{30} +6.41$ (*c* 2.08, CHCl_3). **7c**: $[\alpha]_D^{30} +5.12$ (*c* 1.13, CHCl_3); Lit.^{5j}: $[\alpha]_D^{20} +5.2$ (1.14, CHCl_3). **8a**: $[\alpha]_D^{28} -58.00$ (*c* 0.20, CHCl_3). **8b**: $[\alpha]_D^{31} -53.78$ (*c* 0.48, CHCl_3). **8c**: $[\alpha]_D^{28} -51.34$ (*c* 0.26, CHCl_3).

SYNTHETIC UTILITIES OF VICINAL DIANIONS OF SUCCINIC ACID DERIVATIVES

MANAT POHMAKOTR

Department of Chemistry, Faculty of Science, Mahidol University, Rama 6 Road,
Bangkok 10400, Thailand. E-mail: scmpk@mahidol.ac.th

Carbon-carbon bond formations based on the reactions of dianions are of interest, because high regio- and stereoselectivities towards electrophiles have been achieved. Among these dianions, the vicinal dianions of succinic acid derivatives have been extensively demonstrated to be useful reagents for the preparation of various classes of compounds. In the course of our study on using succinic acid derivatives as versatile 4-carbon building blocks for synthesis of some natural products containing the γ -butyrolactone nucleus, including lignans; we investigated the reactions of the vicinal dianions **1**, **2** and **3**, which could be obtained by treatment of triethyl ethanetricarboxylate, diethyl α -aroylsuccinates and (4*S*,5*R*)-3,4-(dimethyl-2-oxo-5-phenylimidazolidin-1-yl)butane-1,4-dione with 2 equivalents of lithium diisopropylamide in tetrahydrofuran at -78°C for 1h. The vicinal dianions **1** and **2** reacted with carbonyl compounds regioselectively at β -carbon to furnish the corresponding β -hydroxy adducts which underwent lactonisation to provide γ -butyrolactones **4** and **5**, respectively, upon acidic work-up. These γ -butyrolactones were found to be versatile inter-mediate for preparation of various types of compounds. Thus, γ -butyrolactones of type **4** were converted into ($\pm$)-lichesterinic acid, ($\pm$)-phaseolinic acid, ($\pm$)-nephromopsinic acid and ($\pm$)-dihydroprotolichesterinic acid. Furthermore, α -aroyl- γ -butyrolactones **5** were used as starting materials for syntheses of α -arylidene- γ -butyrolactones **6**, 2,6-diaryl-3,7-dioxabicyclo [3.3.0]octane-4,8-diones **7**, thuriferic acid ethyl ester and analogues **8**, and picrodophyllone **9**. Highly diastereoselective alkylation of chiral vicinal dianion **3** was also investigated. The method provided a new general strategy to (*R*)- β -aryl-methyl- γ -butyrolactones **10**, which are important precursors for syntheses of some lignan natural products.



OC-O14

Synthetic Approach to Tetrasubstituted Dihydrofurans and Tetrahydrofurans

Arisara Issaree, Manat Pohmakotr, Patoomratana Tuchinda and Vichai Reutrakul

Department of Chemistry, Faculty of Science, Mahidol University, Rama VI Rd, Bangkok 10400, Thailand.

Objective

To search for a new general synthetic route to tetrasubstituted dihydrofurans and tetrahydrofurans, which are important classes of compounds for preparation of some lignan natural products.

Methods


α -Aroyl succinic ester **1** in THF was added to a solution of lithium diisopropylamide at -78°C for 1h. The dianion **2** obtained was reacted with aromatic aldehyde at -78°C for 2h to give dihydrofuran **3** after quenching with glacial acetic acid and refluxing with *p*-TsOH in toluene for 2h. Dihydrofuran **3** could be smoothly converted to furan **4** by treatment with DDQ in refluxing benzene. Moreover, tetrahydrofuran **5** could be synthesized by carrying out a catalytic hydrogenation.

Results

The reaction of the dianion **2** with aromatic aldehydes afforded the expected dihydrofuran **3** in moderate to good yield as a mixture of two diastereomers which consisted of *cis*-dihydrofuran as the major isomer. Compound **3** underwent dehydrogenation reaction to furan **4** in high yield by employing DDQ. Catalytic hydrogenation of compound **3** gave tetrahydrofuran **5** in good yield. Synthetic study for preparing 2,5-diaryl-3,4-dimethyltetrahydrofuran **6** from tetrahydrofuran **5** will be investigated.

Conclusion

This method can be used as a general method to prepare tetrasubstituted dihydrofurans of the type **3** and tetrahydrofurans of the type **5**.



Keywords: vicinal dianion, α -aroyl succinic ester, furan, dihydrofuran, tetrahydrofuran

Selected References:

1. Sampaogoen, L. (2002). Vicinal dianion of diethyl α -aroyl succinate: preparation of α -arylidene- β -carboethoxy- γ -lactones. M.Sc. Thesis in Organic Chemistry, Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.
2. Ward, R.S. (1999). Lignans, neolignans and related compounds. *Nat. Prod. Rep.* 16, 75-96.

OC-O15

Dianions of α -Aroylsuccinic Esters: Synthesis of Thuriferic acid and Analogues

Taweechote Komutkul, Manat Pohmakotr, Patoomratana Tuchinda and
Vichai Reutrakul


Department of Chemistry, Faculty of Science, Mahidol University, Rama VI Rd,
Bangkok 10400, Thailand.

Objective

To demonstrate the synthetic utilities of dianions derived from α -aroylsuccinic esters for preparing thuriferic acid and analogues.

Methods

α -Aroylsuccinic ester **1** could be doubly deprotonated by using 2 equivalents of LDA in THF at -78°C for 1 h to give dianion **2**, which reacted with aromatic aldehydes in the presence of zinc chloride to give γ -lactones **3** as a mixture of two diastereomers. Treatment of γ -lactones **3** with NaH in THF and a solution of PhSCH_2Cl in the presence of NaI at 0°C to room temperature overnight gave γ -lactones **4**, which were readily oxidized with H_2O_2 in glacial acetic acid to give γ -lactones **5**. Treatment of γ -lactones **5** with SnCl_4 in CHCl_3 gave the crude products **6**, which were subjected to elimination of the phenylsulfonyl group by using DBU to provide thuriferic acid ethyl esters **7**.



Results

The reaction of the vicinal dianion **2** with aromatic aldehydes led to γ -lactones **3** as a mixture of *trans,cis* (TC) and *trans,trans* (TT) diastereomers which consisted of the TC-isomer as the major isomer. Alkylation of γ -lactones **3** with PhSCH_2Cl followed by oxidation gave γ -lactones **5** in high yield. Lewis acid-catalyzed rearrangement of γ -lactones **5** gave the crude products **6**, which were reacted with DBU to lead to the desired thuriferic acid ethyl esters **7**.

Conclusion

The reactions of the vicinal dianion **2** derived from α -aroylsuccinic ester with aromatic aldehydes provided γ -lactones **3**, which could be used as the starting materials for preparation of thuriferic acid ethyl esters **7**.

Keywords: vicinal dianion, γ -lactone, thuriferic acid ethyl ester

Selected References:

1. Thompson, C.M. (1994). *Dianion Chemistry in Organic Synthesis*, CRC Press.
2. Peterson, J.R., Do, H.D. & Roger, R.D. (1991). Anticancer agent development; 6. Application of the heterocycles annulation-rearrangement strategy in the synthesis of a podophyllotoxin. *Synthesis* 275-277.
3. San feliciaiano, A., Lopez, J.L., Medarde, M., Miguel Del Corral, J.M., Pascual-Teresa de, B. & Puebla, P. (1988). Thuriferic acid. A novel lignan type from *Juniperus thurifera*. *Tetrahedron* 44(23), 7255-7260.

OC-P21

Dianions of α -Aroylsuccinic Esters: Synthesis of a Podophyllotoxin Precursor


Taweechote Komutkul, Manat Pohmakotr, Patoomratana Tuchinda and Vichai Reutrakul
Department of Chemistry, Faculty of Science, Mahidol University, Rama VI Rd, Bangkok 10400, Thailand.

Objectives

To study the generation and application of dianions derived from α -aroylsuccinic esters

Methods

α -Aroylsuccinic ester **1** could be doubly deprotonated by using 2.1 equivalents of LDA in THF at -78°C for 1 h to give the dianion **2** which reacted with 3,4,5-trimethoxybenzaldehyde which was activated by using zinc chloride. The γ -lactone **3** was obtained as a mixture of *cis,trans* (CT) and *trans,trans* (TT) diastereomers. Alkylation and lewis acid rearrangement of the γ -lactone **3** led to the γ -oxo ester **5**.



Results

The reaction of the vicinal dianion **2** with 3,4,5-trimethoxybenzaldehyde led to the γ -lactone **3** as a mixture of two diastereomers which consisted of the CT-isomer as the major isomer. Alkylation followed by Lewis acid-catalyzed rearrangement of γ -lactone **3** gave the expected γ -oxo ester **5**, which is a podophyllotoxin precursor.

Conclusion

The γ -oxo ester **5** could be synthesized from the γ -lactone **3**, which was derived from the reaction of the vicinal dianion **2** with 3,4,5-trimethoxybenzaldehyde. The γ -oxo ester **5** (R = H) could be used as the starting material for synthesis of podophyllotoxin and derivatives as appeared in the literature.

Keywords: vicinal dianion, γ -lactone, γ -oxo ester

Selected references:

1. Thomson, C.M. (1994). Dianion Chemistry in Organic Synthesis. CRC Press.
2. Peterson, J.R., Do, H.D., & Rogers, R.D. (1991). Anticancer Agent Development; 6. Application of the Heterocycle Annulation-Rearrangement Strategy in the Synthesis of a Podophyllotoxin. *Synthesis*, 275-277.
3. Ward, R.S. (1992). Synthesis of Podophyllotoxin and Related Compounds. *Synthesis*, 719-730.

OC-P24

Reaction of Vicinal Dianion Derived from Triethyl Ethanetricarboxylate

Tipwan Mophuang, Wacharee Harnying, Manat Pohmakotr, Patoomratana Tuchinda and Vichai Reutrakul

Department of Chemistry, Faculty of Science, Mahidol University, Rama VI Rd, Bangkok 10400, Thailand.


Objective

To study the reactions of vicinal dianion derived from triethyl ethanetricarboxylate: synthetic study towards synthesis of methylenolactocin.

Methods

The dianion **2** could be generated by reacting triester **1** with 2 equivalents of LDA in THF at -78°C for 1 h under argon atmosphere. The dianion **2** was treated with a solution of carpronal- dehyde and stirred at -78°C for 2 h, quenched with glacial acetic acid and the crude product obtained was then treated with a catalytic amount of *p*-TsOH to provide the γ -lactone **3**. Treatment of γ - lactone **3** with NaH in THF (0°C for 1 h) and a solution of chloromethyl phenyl sulfide in the presence of NaI at 0°C to room temperature overnight gave a crude product, which was oxidized with 30% H_2O_2 in a glacial acetic acid to give γ -lactone **6**. Hydrolysis of γ -lactone **6** with 48% HBr gave compound **7**. Elimination of the phenylsulfonyl group of compound **7** to the expected methylene- nolactocin **8** under various conditions (LDA, sat. NaHCO_3) were studied. All attempts led to unsatisfactory results.

Results



The reaction of dianion **2** with carpronaldehyde gave γ -lactone **3** as a mixture of *trans,cis* (TC) *trans,trans* (TT) *cis,cis* (CC) and *cis,trans* (CT) diastereomers which consisted of the TC-isomer as the major isomer in 60% combined yield. Alkylation of γ -lactone **3** with chloromethyl phenyl sulfide followed by oxidation gave γ -lactone **6** in 52% yield. Hydrolysis of γ -lactone **6** with 48% HBr gave compound **7** in 70% yield. Elimination of phenylsulfonyl group of compound **7** were to methylenolactocin **8** was studied.

Conclusion

The reaction of vicinal dianion **2** derived from triethyl ethanetricarboxylate **1** with carpronaldehyde afforded the expected γ -lactone **3** as a mixture of diastereomers, which could be used as the starting material for the study of synthesis of natural product methylenolactocin **8**.

Keywords: vicinal dianion, γ -lactones, methylenolactocin.

Selected references:

Thomson, C.M. (1994). Dianion Chemistry in Organic Synthesis. CRC Press.

OC-P19

**Reactions of Vicinal Dianions Derived from
 α -Aroylsuccinic Esters: Synthesis of Some
2,6-Diaryl-3,7-dioxabicyclo[3.3.0]octane-4,8-diones**

Tipwan Mophuang, Manat Pohmakotr, Patoomratana Tuchinda and Vichai Reutrakul

Department of Chemistry, Faculty of Science, Mahidol University, Rama VI Rd, Bangkok 10400, Thailand.

Objective


2,6-Diaryl-3,7-dioxabicyclo[3.3.0]octane-4,8-diones were synthesized from trisubstituted paraconic esters obtained from the reactions of dianions derived from α -aroyl succinic esters with aromatic aldehydes.

Methods

α -Aroylsuccinic esters **1** were deprotonated with 2 equivalents of LDA in THF at -78°C for 1 h followed by addition of aromatic aldehydes in the presence of zinc chloride to give products **3**. *Trans,cis*-**3** was treated with NaH and methyl iodide to give compounds **4**. Compounds **5** were obtained from **3** by treatment with $\text{CeCl}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ in *i*-PrOH under an oxygen atmosphere at 80°C . Treatment of **4** or **5** with NaBH_4 gave compounds **6**, which were cyclized to bislactones **7** by treatment with *p*-TsOH in refluxing toluene.

Results

The dianions **2** could be generated by treatment of α -aroylsuccinic esters **1** with 2 equivalents of LDA in THF at -78°C for 1 h and reacted with aromatic aldehydes in the presence of zinc chloride to give γ -lactones **3** as a mixture of four diastereomers, which consisted of *trans,cis*-(TC) as a major isomer. Methylation of TC-**3** gave products CC-**4**. Hydroxylation of TC-**3a** with molecular oxygen catalyzed by $\text{CeCl}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ gave compound **5a**. No trace of compound **5b** was observed under the same conditions. This may be due to the insolubility of the starting material **3b** in *i*-PrOH. Reduction of compounds **4** or **5** with NaBH_4 gave **6**, which underwent lactonization to afford bislactones **7** upon treatment **6** with *p*-TsOH.

**Conclusion**

Compounds of type 2,6-diaryl-3,7-dioxabicyclo[3.3.0]octane-4,8-diones could be synthesized by employing synthetic utilities of dianions of α -aroylsuccinic esters.

Keywords: α -aroylsuccinic ester, vicinal dianion, γ -lactone, bislactone

Selected References:

- Thompson, C.M. (1994). *Dianion Chemistry in Organic Synthesis*, CRC Press.
- Christoffers, J. & Werner, T. (2002). Cerium-catalyzed α -oxidation of β -dicarbonyl compounds with molecular oxygen. *Synlett*, 119-121.

OC-P24

Synthetic Approach to Furofuran Lignans

Attapol Pinsa, Manat Pohmakotr, Patoomratana Tuchinda and Vichai Reutrakul


Department of Chemistry, Faculty of Science, Mahidol University, Rama VI Rd, Bangkok 10400, Thailand.

Objective

To develop a new general synthetic route to furofuran lignans including gmelinol, an antimalarial agent, which was isolated from the heartwood of *Gmelina arborea*.

Methods

The synthetic route of furofuran lignans was summarized as shown in Scheme 1.



Results

α -Aroylsuccinic esters **1** were deprotonated by using 2 equivalents of LDA to give vicinal dianions **2**. The reaction of vicinal dianions **2** with aromatic aldehydes in the presence of ZnCl_2 led to γ -lactones **3** as a mixture of four diastereomers, which consisted of *trans,cis* (TC) as the major isomer. Methylation of TC-**3** with NaH and MeI gave CC-**4**. TC-**3** was hydroxylated by using $\text{CeCl}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ in *i*-PrOH under flush of oxygen at 50°C , producing CC-**5**. Compounds **4** and **5** was then selectively reduced with $\text{NaBH}_4/\text{CeCl}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ to give compounds **6**, which were cyclized to bislactones **7** by treatment with *p*-TsOH. Reduction of compounds **7** by using LiAlH_4 and followed by cyclization with MsCl in pyridine provided furofuran lignans **9**.

Conclusion

The reactions of the vicinal dianions **2** derived from α -arylsuccinic esters with aromatic aldehydes provided γ -lactones **3**, which could be used as the starting materials for the preparation of furofuran lignans **9**.

Keywords: vicinal dianion, α -arylsuccinic ester, γ -lactone, bislactone, furofuran lignan

Selected References

1. Mophuang, T., (2003). Reaction of vicinal dianion derived from α -arylsuccinic ester: synthesis of some 2,6-diaryl-3,7-dioxabicyclo[3.3.0]octane-4,8-diones. *M.Sc. Thesis in Organic Chemistry, Faculty of Graduate Studies, Mahidol University*.
2. Christoffers, J., Werner, T., Unger, S., Frey, W. (2003). Preparation of acyloins by cerium-catalyzed, direct hydroxylation of β -dicarbonyl compounds with molecular oxygen. *Eur. J. Org. Chem.*, 425-431.

OC-P7

Isolation and Structure Identification of Bioactive Compounds from *Phyllanthus taxodiifolius*

Anawat Kunkiao,^a Patoomratana Tuchinda,^a Manat Pohmakotr,^a Vichai Reutakul,^a Chalobon Yoosook,^b Samaisukh Sophasan^c and Thawatchai Santisukd^d

^aDepartment of Chemistry, Faculty of Science, Mahidol University, Rama VI Rd, Bangkok 10400, Thailand

^bDepartment of Microbiology, Faculty of Science, Mahidol University, Rama VI Rd, Bangkok 10400, Thailand

^cDepartment of Physiology, Faculty of Science, Mahidol University, Rama VI Rd, Bangkok 10400, Thailand

^dThe Forest Herbarium, Royal Forest Department, Bangkok 10900, Thailand

Objective

To isolate and identify the chemical constituents from the arial part of *Phyllanthus taxodiifolius*

Methods


Air-dried, finely powdered arial part of *Phyllanthus taxodiifolius* were successively extracted with methanol. After evaporation of methanol, the partitions between various organic layers and water were carried out. Removal of solvents afforded the hexane, ethyl acetate, *n*-butanol and water extracts, respectively. The isolation of the chemical constituents was performed mainly by column chromatography and recrystallization.

Results

The investigation of the arial part of *Phyllanthus taxodiifolius* has led to the isolation of glochidone (1), glochidonol (2), cleistanthin A (3), cleistanthin methyl ether (4) and cleistanthoside A (5). The structures were assigned by spectroscopic techniques.

Conclusion

Compounds 1-5 are known compounds. Compounds 3 and 4 showed cytotoxic and anti-HIV activities.



Keywords: *Phyllanthus taxodiifolius*, Cytotoxic and anti-HIV activities

Selected References

1. Sastry, K. V. & Venkata Rao, E. (1983). Isolation and structure of cleistanthoside A. *J. Med. Chem.*, 47, 227-229.
2. Govindachari, T.R. Sathe, S. S. & Viswanathan N. (1969). Chemical constituents of *cleistanthus colinus*. *Tetrahedron*, 25, 2815-2821.
3. Wilium A. Ayer, J. Richard, Flanagan and Torsten Reffstrup. (1984). Metabolites of bird's nest fungi "New triterpenoid carboxylic acids from *Cyathus* and *Cyathus pygmaeus*". *Tetrahedron*, 40(11), 2069-2082.