1. Abstract

Abstract

In this research, the novel pentaerythritol tetrakis(6'-hydroxyhexanoate), as a star-core macroinitiator was prepared by using ε -caprolactone (CL) caped with the hydroxyl groups of pentaerythritol (PTOL) in the ratio of 4:1, resulting in a colorless oil and moderate yield (43% in overall steps) of the final product. The chemical structure of star-core macroinitiator was identified by IR, NMR and ESI-mass spectroscopy. The well-defined star-shaped poly(\varepsiloncaprolactone), PCL could be synthesized using a 4-arm star-core macroinitiator via the ringopening polymerization (ROP) of CL in bulk using stannous octoate as catalyst. The effects of differing molecular architectures on the polymer properties of linear and star-shaped PCLs are being investigated. Low molecular weight PCLs (PCL_hexanol, PCL_PTOL PCL macroinitiator) were synthesized and characterized to confirm their molecular architectures. The ¹H-NMR showed that the average number of OH groups initiating polymerization, as calculated from the average degree of the polymerization per arm (DP_n/arm), was close to the actual OH functionalities. The star-shaped PCLs had lower melting temperatures, degrees of crystallinity and decomposition temperatures than the linear PCL. This could be attributed to their shorter chain lengths and greater number of free chain ends which disrupts the orderly folded chain pattern in the crystal. This offers the possibility of being able to adjust the crystallinity by varying the shape of the polymer molecules, thus providing a useful means of controlling polymer properties and can be utilized and optimized for each application. Structure-property studies of high molecular weight PCLs have shown that the molecular architecture can have effects on the mechanical and rheological properties and in vitro hydrolytic biodegradation. In conclusion, the problem of the insolubility of PTOL in CL monomer and steric hindrance could be overcome by using the novel star-core macroinitiator leading to the synthesis of star-shaped PCLs with interesting properties which were different to linear PCL.

บทคัดย่อ

ในงานวิจัยนี้ เพนทะอีรีทรีทอลเตตระคีซ(6'-ไฮดรอกซีเฮกซะโนเอท) ตัวริเริ่มชนิดแมกโครที่มีแกน เป็นรูปดาวตัวใหม่ ถูกเตรียมขึ้นโดยใช้เอปไซลอน-คาโพรแลคโทนจับกับหมู่ไฮดรอกซิลของเพนทะอีรีทรี ทอล (พีทีโอแอล) ในอัตราส่วนสี่ต่อหนึ่ง ได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายเป็นของเหลวหนืดไม่มีสี เปอร์เซ็นต์ผลผลิตปาน กลางประมาณ 43 เปอร์เซ็นต์จากขั้นตอนการสังเคราะห์ทั้งหมด สามารถพิสูจน์โครงสร้างทางเคมีของตัวเริ่ม ชนิดแมกโครที่มีแกนรูปดาวได้โดยไออาร์ เอ็นเอ็มอาร์ และอีเอสไอ-แมสสเปกโทรสโกปี สารประกอบที่ได้ถูก นำไปใช้สังเคราะห์พอลิเอปไซลอน-คาโพรแลคโทน (พีซีแอล) รูปร่างแบบดาว ผ่านปฏิกิริยาการพอลิเมอไรเซ ชันแบบเปิดวงในบัลค์โดยใช้สแตนนัส ออกโทเอทเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา หลังจากนั้นได้ทำการศึกษาผลของ โครงสร้างโมเลกุลที่แตกต่างกันที่มีต่อสมบัติของพีซีแอลที่มีรูปร่างเป็นโซ่ตรงและรูปดาว พีซีแอลน้ำหนัก โมเลกุลต่ำที่มีโครงสร้างแตกต่างกันได้ถูกสังเคราะห์และวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะเพื่อยืนยันโครงสร้างโมเลกุล จากเทคนิคโปรตอน เอ็นเอ็มอาร์แสดงว่าจำนวนหมู่ไฮดรอกซิลที่ริเริ่มปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันซึ่งคำนวณ จากดีกรีการพอลิเมอไรเซชันเฉลี่ยต่อแขน มีค่าใกล้เคียงกับหมู่ไฮดรอกซิลที่แท้จริง พีซีแอลที่มีโครงสร้างรูป ดาวมีค่าอุณหภูมิการหลอมเหลว ดีกรีความเป็นผลึกและอุณหภูมิการสลายตัวต่ำกว่าโครงสร้างแบบโซ่ตรง แสดงให้เห็นว่าสายโซ่ที่สั้นลงและการเพิ่มของจำนวนปลายสายโซ่จะขัดขวางการจัดเรียงตัวของผลึก จึง สามารถปรับความเป็นผลึกโดยการเปลี่ยนแปลงรูปร่างโมเลกุลของพอลิเมอร์ได้ ทั้งนี้มีความเป็นไปได้ที่จะ ปรับความเป็นผลึกโดยการเปลี่ยนรูปร่างโมเลกุลของพอลิเมอร์ ซึ่งจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการควบคุม สมบัติของพอลิเมอร์ให้เหมาะสมในการนำไปใช้ประโยชน์ จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและ สมบัติของพีซีแอลที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างโมเลกุลมีผลต่อสมบัติเชิงกล สมบัติรีโอโลยี และสมบัติการสลายตัวทางชีวภาพแบบไฮโดรไลติกภายนอกร่างกาย จากผลการศึกษาทั้งหมดสามารถสรุป ได้ว่าปัญหาการละลายของพีทีโอแอลในซีแอลมอนอเมอร์และผลของความเกะกะ ทำให้สามารถใช้ตัวริเริ่ม ชนิดแมกโครที่มีแกนเป็นรูปดาวตัวใหม่เพื่อสังเคราะห์พีซีแอลที่มีโครงสร้างรูปดาวที่มีสมบัติที่น่าสนใจ แตกต่างจากพีซีแอลที่มีโครงสร้างเป็นโซ่ตรง