



รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

โครงการ: การออกแบบสารยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ เอชไอวี-1 ด้วยคอมพิวเตอร์: การวิเคราะห์คอนฟอร์เมชันทางโครงสร้างและการศึกษาโมเลกุลาร์ด็อกกิ้งของกลุ่มสารอนุพันธ์อีฟาเวเรนซ์ที่แสดงกัมมันตภาพในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบชนิดกลายพันธุ์

Computer-aided inhibitor design of HIV-1 RT inhibitors: Structural conformational analysis and molecular docking study of efavirenz derivatives, active against mutant type HIV-1 RT

โดย ผศ.ดร. พรพรรณ พิงโพธิ์ และคณะ

พฤษภาคม 2550

สัญญาเลขที่ MRG4880001

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

โครงการ: การออกแบบสารยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ เอชไอวี-1 ด้วยคอมพิวเตอร์: การวิเคราะห์คอนฟอร์เมชันทางโครงสร้างและการศึกษาโมเลกุลาร์ด็อกกิ้งของกลุ่มสารอนุพันธ์อีฟาเวเรนซ์ที่แสดงกัมมันตภาพในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบชนิดกลายพันธุ์

Computer-aided inhibitor design of HIV-1 RT inhibitors: Structural conformational analysis and molecular docking study of efavirenz derivatives, active against mutant type HIV-1 RT

คณะผู้วิจัย

1. ผศ.ดร. พรพรรณ พึ่งโพธิ์

2. รศ.ดร.สุภา หารหนองบัว

สังกัด

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สนับสนุนโดย

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

(ความเห็นในรายงานผลการวิจัยเป็นของผู้วิจัย สกอ. และ สกว. ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป)

Abstract

Project Code : MRG4880001

Project Title : Computer-aided inhibitor design of HIV-1 RT inhibitors: Structural conformational analysis and molecular docking study of efavirenz derivatives, active against mutant type HIV-1 RT

Investigator : Asst.Dr.Pornpan Pungpo, Department of Chemistry, Faculty of Science, Ubonratchathani

E-mail Address : pornpan_ubu@yahoo.com

Project Period : 1 June 2005 – 31 May 2007

Conformational analysis, molecular docking and 3D-QSAR analyses were performed for efavirenz derivatives against WT and K103N. In the conformational analysis, the 3D PES of efavirenz derivatives based on DFT calculations could be informative for better understanding the sidechain flexibility and preferable conformation of these derivatives. Consecutively, molecular docking approach using Autodock 3.05 program reveals a good ability to reproduce the X-ray bound conformation with rmsd less than 0.6 Å for both WT and K103N enzymes. The predicted binding orientations of efavirenz derivatives give additional information to probe the inhibitor-enzyme interactions. Based on the molecular docking alignment of conformations, the high predictive 3D-QSAR models were produced by using CoMFA and CoMSIA approaches. The CoMFA and CoMSIA models reveal the importance of steric and electrostatic interactions through contour maps. Moreover, the CoMSIA models also enhance the understanding of electron donor and acceptor requirements for ligands in HIV-1 RT binding pockets. The integrated results obtained from structure-based and ligand-based design approaches lead to better understanding of the structural requirements for the higher activity of HIV-1 RT inhibitors in the class of efavirenz compounds. Accordingly, the obtained information can be a gainful guideline to design and predict novel and highly potent compounds against WT and K103N HIV-1 RT.

Keywords: HIV-1 RT inhibitors, Efavirenz, Conformational analysis, molecular docking, CoMFA, CoMSIA

บทคัดย่อ

รหัสโครงการ : MRG4880001

ชื่อโครงการ : การออกแบบสารยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ เอชไอวี-1 ด้วยคอมพิวเตอร์: การวิเคราะห์คอนฟอร์เมชันทางโครงสร้างและการศึกษาโมเลกุลาร์ด็อกกิ้งของกลุ่มสารอนุพันธ์อีฟาวิเรนซ์ที่แสดงกัมมันตภาพในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบชนิดกลายพันธุ์

ื่อนักวิจัย และสถาบัน : ผศ.ดร. พรพรรณ พิงโพธิ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต.ศรีโค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

E-mail Address : pornpan_ubu@yahoo.com

ระยะเวลาโครงการ : 1 มิถุนายน 2548 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2550

การศึกษานี้ได้ทำการวิเคราะห์คอนฟอร์เมชันด้วยการคำนวณทางเคมีควอนตัม การคำนวณโมเลกุลาร์ด็อกกิ้ง และการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและค่ากัมมันตภาพในเชิงสามมิติของสารอนุพันธ์อีฟาวิเรนซ์ที่ออกฤทธิ์สูงในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 ทั้งชนิดดั้งเดิมและชนิดกลายพันธุ์ (K103N) จากการศึกษาพบว่าแผนภาพพลังงานศักย์ในเชิงสามมิติของการวิเคราะห์คอนฟอร์เมชันด้วยการคำนวณทางเคมีควอนตัมทำให้เข้าใจถึงคอนฟอร์เมชันที่เป็นไปได้ของสารอนุพันธ์อีฟาวิเรนซ์ นอกจากนี้การคำนวณโมเลกุลาร์ด็อกกิ้งด้วยโปรแกรม Autodock 3.05 สามารถอธิบายถึงอันตรกิริยาที่สำคัญของสารอนุพันธ์อีฟาวิเรนซ์ในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 และจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและค่ากัมมันตภาพในเชิงสามมิติของสารอนุพันธ์อีฟาวิเรนซ์ในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 ด้วยระเบียบวิธีการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบสนามของโมเลกุล (CoMFA) และวิธีวิเคราะห์เปรียบเทียบดัชนีความเหมือนเชิงโมเลกุล (CoMSIA) พบว่าแบบจำลองที่ได้จากทั้งสองวิธีสามารถทำนายกัมมันตภาพในการยับยั้งที่สอดคล้องกับค่าที่ได้จากการทดลอง และสามารถชี้ให้เห็นถึงความต้องการทางโครงสร้างเพื่อให้ตัวยับยั้งมีกัมมันตภาพในการยับยั้งสูงขึ้นของตัวยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 ทั้งชนิดดั้งเดิมและชนิดกลายพันธุ์ได้ ข้อมูลที่ได้จากการคำนวณทางเคมีควอนตัมและการจำลองแบบโมเลกุลสามารถนำมาใช้ในการออกแบบโมเลกุลของตัวยับยั้งในกลุ่มของสารอนุพันธ์อีฟาวิเรนซ์ให้มีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 ได้ ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาตัวยับยั้งเพื่อใช้เป็นยาต้านโรคเอดส์ต่อไป

คำหลัก: HIV-1 RT inhibitors, Efavirenz, Conformational analysis, molecular docking, CoMFA, CoMSIA

กิตติกรรมประกาศ

โครงการวิจัยนี้สามารถดำเนินการได้ด้วยดีด้วยความเอื้อเฟื้อและช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ และผู้ร่วมงานหลายท่าน ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งและขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษาและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยที่ให้การสนับสนุน ทุนวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัย ของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2548 (MRG4880001) และขอขอบคุณ รศ.ดร.สุภา หารหนองบัว ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ นักวิจัยพี่เลี้ยงที่ให้การสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการการวิจัยคำปรึกษาและคำแนะนำภายใต้โครงการนี้ตลอดมาเป็นอย่างดี

ขอขอบคุณ Prof. Dr. Peter Wolschann มหาวิทยาลัยเวียนนา ประเทศออสเตรีย ที่ได้ให้คำปรึกษาและสนับสนุนด้านต่าง ๆ สำหรับการวิจัยโครงการนี้ตลอดมา

ขอขอบคุณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ที่ได้ให้การสนับสนุนในด้านอุปกรณ์ การคำนวณทางคอมพิวเตอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์สมรรถภาพสูง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (HPC-NECTEC) ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเวียนนา ที่ได้เอื้อเฟื้อการคำนวณบนเครื่องคลัสเตอร์คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม SYBYL

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
Abstract	ก
บทคัดย่อ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
บทที่ 1 บทนำ	1
บทที่ 2 ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	5
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย	14
บทที่ 4 ผลการศึกษา	19
บทที่ 5 สรุปและวิจารณ์	32
บทที่ 6 เอกสารอ้างอิง	34
ภาคผนวก	39

บทที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญและที่มาของหัวข้อการวิจัย


ในปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ (Acquired immunodeficiency syndrome, AIDS) เป็นหนึ่งในปัญหาที่สำคัญอย่างยิ่งของสาธารณสุขทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย เนื่องจากยังไม่มียาชนิดใดที่สามารถใช้ในการรักษาโรคเอดส์ให้หายขาดได้ โรคเอดส์เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (Human immunodeficiency virus, HIV) ในวงจรชีวิตของไวรัส HIV มีเอนไซม์หลายชนิดที่สำคัญในการดำรงชีวิต เอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 (HIV-1 Reverse Transcriptase, HIV-1 RT) เป็นหนึ่งในเอนไซม์สำคัญที่ช่วยในการจำลองแบบ (replication) ในขั้นตอนการรวม viral RNA genome เข้าไปใน proviral DNA จึงทำให้เอนไซม์ชนิดนี้เป็นเป้าหมายสำคัญในการใช้ ยารักษาเพื่อต้านโรคเอดส์ การรักษาในปัจจุบันสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสชนิดนี้ได้โดยใช้สารยับยั้งในกลุ่ม 2', 3' dideoxynucleoside เช่น 3'-azido-2',3'-dideoxy thymidine (AZT) ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเอดส์และผู้ที่ติดเชื้อเอดส์ อย่างไรก็ตามพบว่าตัวยาชนิดนี้สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อเอดส์ได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากในปัจจุบันพบว่าไวรัสเอชไอวี-1 เริ่มมีฤทธิ์ต้านทาน (resistance) ต่อยา AZT อีกทั้งยังมีผลข้างเคียงต่อผู้ป่วย ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ได้คิดค้นสังเคราะห์ยาจำนวนมากมายหลายชนิดที่มีกลไกการออกฤทธิ์ที่แตกต่างจาก AZT พบว่าสารประกอบในกลุ่ม nonnucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs) เช่น 1-[(2-Hydroxyethoxy)-methyl]-6-(phenylthio)thymine (HEPT), tetrahydroimidazo [4,5,1-jk]benzodiazepine-2(1H)-thione (TIBO หรือ ทีโบ) และ dipyrindodiazepinone หรือ nevirapine ซึ่งเรียกว่า สารยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 กลุ่มแรก (the first generation NNRTIs) เป็นกลุ่มที่น่าสนใจมากเนื่องจากมีกัมมันตภาพ (activity) ที่ยับยั้งจำเพาะ (specific) ต่อ HIV-1 RT โดยไม่มีผลยับยั้งต่อ HIV-2 หรือ HIV ชนิดอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีกัมมันตภาพยับยั้งได้ที่มีความเข้มข้นต่ำจึงไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียงต่อผู้ป่วย มีกลไกในการจับกับเอนไซม์ที่ตำแหน่ง allosteric site อีกทั้งมี selectivity ค่อนข้างสูงโดยจะไม่มีผลต่อ DNA polymerase ของเซลล์ปกติจึงมีความเป็นพิษค่อนข้างต่ำ ดังนั้นสารในกลุ่ม NNRTI จึงเป็นสารที่ถูกนำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยร่วมกับ AZT สารยับยั้ง nevirapine เป็นสาร ตัวแรกในกลุ่ม NNRTI ที่ได้รับการรับรองให้นำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ โดยใช้ในการรักษาผู้ป่วยร่วมกับ ยา AZT อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพของการใช้ยาในกลุ่มนี้กลับลดลงมากเนื่องจากปัญหาการต้านทานยาของไวรัส (drug resistance) ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากการได้รับการรักษาด้วยยาในกลุ่ม NNRTI ไประยะหนึ่ง ทำให้ไวรัสเกิดการกลายพันธุ์ (mutation) อย่างรวดเร็วหลังจากได้รับการรักษาด้วยยาในกลุ่ม NNRTI ไประยะหนึ่ง การกลายพันธุ์เป็นผลเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของกรดอะมิโนที่อยู่ล้อมรอบ binding pocket ซึ่งส่งผลอย่างมากต่อการแสดงกัมมันตภาพของยา โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการกลายพันธุ์ของกรดอะมิโนบริเวณโพรงจับที่ตำแหน่ง Tyr181 Tyr 188 และ Lys103 ทำให้ประสิทธิภาพของยาชนิดนี้ลดลงอย่างรวดเร็ว จึงได้มีความพยายามในการพัฒนาตัวยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 กลุ่มที่สองขึ้นมาใหม่ (the second generation NNRTIs) โดยสารยับยั้งในกลุ่มนี้มีโครงสร้างที่มีความยืดหยุ่น (resilience) ต่อเอนไซม์การถ่ายแบบชนิดกลายพันธุ์ (Y181C, Y188C และ K103N) ได้มากกว่าสารยับยั้งในกลุ่มแรก จึงทำให้ตัวยับยั้งในกลุ่มนี้แสดงกัมมันตภาพในการยับยั้งสูงต่อเอนไซม์ การถ่ายแบบทั้งชนิดดั้งเดิมและชนิดกลายพันธุ์ เช่น สารอนุพันธ์ในกลุ่มของ efavirenz กลุ่ม carboxanilides และ กลุ่ม quinoxaline โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารประกอบในกลุ่ม efavirenz เป็นสารยับยั้งที่ถูกนำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์โดยสารยับยั้งในกลุ่มนี้แสดงกัมมันตภาพสูงทั้งเอนไซม์ชนิดดั้งเดิม (WT) และชนิดกลายพันธุ์ (K103N) การรักษาในปัจจุบันได้พยายามแก้ปัญหาการต้านทานยาของไวรัสที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยการใช้ยาที่มีประสิทธิภาพสูงหลายกลุ่มร่วมกันในการรักษา (The highly active anti-retroviral therapy, HAART) เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาการต้านทานยาของยากกลุ่มนี้เมื่อมีการใช้ยาชนิดเดียว (monotherapy) ในการรักษาโรคเอดส์

Efavirenz เป็นสารยับยั้งในกลุ่ม second generation NNRTI ที่ได้รับการรับรองให้นำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ ในปัจจุบัน มีชื่อทางการค้าว่า SUSTIVA สารในกลุ่มนี้มีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 ชนิดดั้งเดิม (WT) และชนิดกลายพันธุ์ (Y181C, Y188C และ K103N) จากข้อมูลทางโครงสร้างผลึกระหว่างตัวยับยั้งกับเอนไซม์โดยวิธี X-ray crystallography ทำให้เข้าใจมากขึ้นถึงผลที่ได้ชี้แนะกลไกการยับยั้งที่น่าจะเป็นไปได้และพบว่าโครงสร้างผลึกการจับกันระหว่างสารยับยั้ง efavirenz และเอนไซม์การถ่ายแบบ เอชไอวี-1 คล้ายกับตัวยับยั้ง NNRTI ในกลุ่ม first generation NNRTIs เช่น HEPT TIBO และ nevirapine อย่างไรก็ตามปัญหาการต้านทานยาของเอนไซม์การถ่ายแบบก็ยังคงอยู่ อีกทั้งกลไกในการยับยั้งของสารยับยั้งและกลไกในการต้านทานยาของเอนไซม์ HIV-1 RT ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดและยังเป็นปัญหาที่ยังต้องการคำอธิบาย ดังนั้น ขบวนการศึกษาและพัฒนาเพื่อหายาตัวใหม่ที่มีกัมมันตภาพในการต้านทานการดื้อยาของเอนไซม์จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินต่อไป จากการสืบค้นข้อมูลของงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่างานวิจัยในกลุ่มของ สุภา หารหนองบัวและคณะ ได้ทำการศึกษาการออกแบบโมเลกุลโดยการคำนวณบนพื้นฐานของเคมีควอนตัมของสารยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 ในกลุ่มของ first generation NNRTIs คือ HEPT TIBO และ nevirapine ผลจากการศึกษาทำให้ได้ข้อมูลทางโครงสร้างของตัวยับยั้งในกลุ่ม NNRTI ที่มีความสำคัญในการที่จะอธิบายความจำเพาะของตัวยับยั้งเอนไซม์ในกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดี และสามารถเสนอโครงสร้างของตัวยับยั้งใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงได้ สำหรับสารยับยั้ง efavirenz ยังไม่มีการศึกษาวิจัยสมบัติทางโครงสร้างของโมเลกุลตัวยับยั้งของสารกลุ่มนี้ในด้านโครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์มาก่อน ทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาสมบัติทางโครงสร้างของตัวยับยั้ง HIV-1 RT ในกลุ่มสารอนุพันธ์ efavirenz โดยอาศัยระเบียบวิธี Computer-Aided Molecular Design บนพื้นฐานของเคมีควอนตัม (Quantum

chemistry) และ การจำลองแบบ (Molecular Modeling) โดยในเบื้องต้นผู้วิจัยได้ทำการศึกษาทางด้าน Ligand based drug design คือได้หาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับกัมมันตภาพในการยับยั้ง (Quantitative Structure-Activity Relationships, QSAR) ของสารในกลุ่ม efavirenz โดยใช้ระเบียบวิธี 2D-และ 3D-QSAR และหาโครงสร้างสำคัญของสารยับยั้งในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 ทั้งชนิดดั้งเดิม (WT) และชนิดกลายพันธุ์ (K103N) ผลจากการศึกษาสามารถชี้ให้เห็นถึงชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของอันตรกิริยาสเตอริก อิเล็กโตรสแตติกและไฮโดรโฟบิก รวมถึงอิทธิพลของการเกิดพันธะไฮโดรเจนของโมเลกุลที่มีต่อการออกทางฤทธิ์ทางชีวภาพ ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ในการออกแบบสารยับยั้งตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 ทั้งชนิดดั้งเดิม (WT) และชนิดกลายพันธุ์ (K103N)

สำหรับงานวิจัยในโครงการนี้จะดำเนินการต่อเนื่องจากงานที่ได้ทำไปแล้วโดยมีเป้าหมายหลักในการศึกษาการคำนวณโครงสร้างคอนฟอร์เมชันของตัวยับยั้ง efavirenz และศึกษา อันตรกิริยาระหว่างสารยับยั้งในกลุ่มอนุพันธ์ efavirenz และเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี -1 ด้วยวิธี molecular docking ซึ่งนับว่าเป็นการศึกษาทางด้าน Structure-based drug design โดยคาดหวังว่าเมื่อนำเอาผลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีดังกล่าวนี้ และผลที่ได้จากการศึกษาทางด้าน Ligand based drug design ที่ได้ดำเนินการศึกษามาแล้วมาพิจารณาร่วมกัน ข้อมูลสำคัญที่เป็นพื้นฐานช่วยเพิ่มความเข้าใจในการเกิดอันตรกิริยาระหว่างตัวยับยั้งและเอนไซม์ (inhibitor-enzyme interaction) ตลอดจนอธิบายกลไกที่เกิดการต้านทานของเอนไซม์ที่เป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งที่พบของตัวยับยั้ง และจะเป็นแนวทางในการออกแบบโครงสร้าง (molecular design) ของสารยับยั้งชนิดใหม่ที่มีให้มิตักยภาพสูงขึ้นในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ เอชไอวี-1 ทั้งชนิดดั้งเดิม (WT) และชนิดกลายพันธุ์ (K103N)



รูปที่ 1 โครงสร้างของตัวยับยั้ง Efavirenz

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาโครงสร้างคอนฟอร์เมชันของสารยับยั้ง efavirenz และสร้างแผนภาพพลังงานศักย์ของโมเลกุลเพื่ออธิบายสมบัติทางโครงสร้างที่สัมพันธ์กับกัมมันตภาพในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1
2. ศึกษาอันตรกิริยาระหว่างสารยับยั้งในกลุ่มอนุพันธ์ efavirenz และโพรงการจับ (binding pocket) ของเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 ทั้งชนิดดั้งเดิม (WT) และชนิดกลายพันธุ์ (K103N) โดยการคำนวณโมเลกุลาร์ด็อกกิง (molecular docking calculation)
3. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและกัมมันตภาพในการยับยั้งของสารอนุพันธ์ในกลุ่ม efavirenz โดยใช้ระเบียบวิธี 3D-QSAR และหาโครงสร้างสำคัญของสารยับยั้งในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 ทั้งชนิดดั้งเดิม (WT) และชนิดกลายพันธุ์ (K103N)
4. ออกแบบสารประกอบในกลุ่มอนุพันธ์ efavirenz ที่มีศักยภาพสูงในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ เอชไอวี-1 ทั้งชนิดดั้งเดิม (WT) และชนิดกลายพันธุ์ (K103N)

3. ขอบเขตของการวิจัย

งานวิจัยนี้เป็นงานทางด้าน computer-aided molecular design โดยทำการศึกษาคอนฟอร์เมชันและการออกแบบโครงสร้างของสารอนุพันธ์ efavirenz เพื่อใช้ยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 RT โดยในการศึกษาคอนฟอร์เมชันสารอนุพันธ์ efavirenz จะใช้ระเบียบวิธีการคำนวณทางเคมีควอนตัม และสร้างแผนภาพพลังงานศักย์ของโมเลกุลเพื่ออธิบายสมบัติทางโครงสร้างที่สัมพันธ์กับกัมมันตภาพในการยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 RT สำหรับวิธีการออกแบบโครงสร้างของสารยับยั้งที่ใช้ในงานวิจัยนี้มี 2 วิธีคือ วิธี structure based drug design ซึ่งใช้วิธีการคำนวณ molecular docking และ ligand-based drug design โดยใช้ระเบียบวิธี 3D-QSAR คือ วิธีวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบสนามโมเลกุล (Comparative Molecular Field Analysis, CoMFA) และวิธี การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบดัชนีความเหมือนเชิงโมเลกุล (Comparative Similarity Index Analysis, CoMSIA)

บทที่ 2

บททวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ปี 1995 Kroeger และคณะ ได้ใช้ระเบียบวิธีการคำนวณทางเคมีควอนตัม โดยใช้ระเบียบวิธี AM1, HF/3-21G*, HF/6-31G* และวิธีการคำนวณ molecular docking ในการศึกษาการเกิดอันตรกิริยาของสารยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 RT ทั้งสามชนิด ได้แก่ 2-cyclopropyl-4-methyl-5,11-dihydro-5H-dipyrido[3,2-b :2',3'-c][1,4] diazepin-6-one (nevirapine), alpha-anilino-2,6-dibromophenylacetamide (alpha-APA), และ 8-chloro-tetrahydro-imidazo(4,5,1-jk)(1,4)-benzodiazepin-2(1H)-thione (TIBO) ใน binding pocket ของเอนไซม์ HIV-1 RT จากการศึกษาพบว่า binding mode ของสารยับยั้ง nevirapine, alpha-APA และ TIBO ใน binding pocket ของเอนไซม์ HIV-1 RT มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน โดยสารยับยั้งทั้งสามจะเกิดอันตรกิริยาแบบ π -Stacking กับวงอะโรมาติกของ binding pocket

ปี 1995 Young และคณะ ได้ทำการสังเคราะห์และตรวจวัดประสิทธิภาพในการยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 RT ของสารประกอบ 1,4-dihydro-2H-3,1-benzoxazin-2-ones (DMP-266) จากการศึกษาพบว่า DMP-266 สามารถยับยั้งเอนไซม์ชนิดดั้งเดิม โดยให้ค่า IC_{50} เท่ากับ 1.5 nM แต่ประสิทธิภาพในการยับยั้งของ DMP-266 จะลดลงอย่างมากเมื่อเอนไซม์เกิดการกลายพันธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกลายพันธุ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของกรดอะมิโนใน binding pocket มากกว่าหนึ่งตำแหน่ง

ปี 1996 Hopkins และคณะ ได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างผลึกของเอนไซม์ HIV-1 RT ที่จับกับ MKC-442, TNK-651 และ HEPT ซึ่งเป็นสารยับยั้งในกลุ่ม NNRTI และทำการเปรียบเทียบ binding mode ของสารยับยั้งทั้งสามชนิดใน binding pocket ของเอนไซม์ HIV-1 RT พบว่าการเกิดอันตรกิริยาของสารยับยั้ง HEPT กับ Tyr181 ใน binding pocket ของเอนไซม์ HIV-1 RT เป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มศักยภาพในการยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 RT ของ HEPT ให้ดีขึ้น

ปี 1997 Font และคณะ ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและกัมมันตภาพในการยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 RT ของสารอนุพันธ์ quinoline โดยใช้ระเบียบวิธี QSAR และการคำนวณโดยระเบียบวิธี AM1 semiempirical จากการศึกษาพบว่าถ้าคาร์บอนตำแหน่งที่ 6 ของวง quinoline ถูกแทนที่ด้วยหมู่ electron-withdrawing จะทำให้ลดระดับชั้นพลังงาน LUMO ของสารประกอบ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเกิดอันตรกิริยาแบบ charge transfer ระหว่างวงอะโรมาติกของ quinoline และเอนไซม์ HIV-1 RT

ปี 1998 Vig และคณะ ได้ทำการสังเคราะห์และออกแบบสารอนุพันธ์ phenethylthiazolyl thiourea (PETT) เพื่อเป็นสารยับยั้งในกลุ่ม NNRTI ที่มีศักยภาพสูงในการยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 RT

โดยวิธีที่ใช้ศึกษาคือ วิธีการคำนวณ molecular docking ซึ่งศึกษาอันตรกิริยาระหว่างสารยับยั้ง PETT และ binding pocket ของเอนไซม์ HIV-1 RT และจากการศึกษาพบว่าสารอนุพันธ์ PETT ที่ได้ออกแบบขึ้นมาใหม่สามารถยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 RT ได้ดีกว่า AZT หรือ zalcitabine โดยให้ค่า IC_{50} น้อยกว่า 1 nM และค่า selectivity indices มากกว่า 100,000

ปี 1998 Sudbeck และคณะ ได้ใช้วิธี structure-based drug design ในการศึกษาสารยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 RT ในกลุ่มของ NNRT ที่มีศักยภาพสูงในการยับยั้งซึ่งได้แก่ สารอนุพันธ์ของ dihydroalkoxybenzylloxypyrimidine (DABO) และได้ทำการตรวจสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 RT ของสารยับยั้งในกลุ่มนี้ด้วย จากการศึกษพบว่า 5-isopropyl-2-[(methylthiomethyl)thio]-6-(benzyl)-pyrimidin-4-(1H)-one สามารถยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 RT ได้ในระดับความเข้มข้นนาโนโมลาร์ แต่ไม่สามารถวัดผลข้างเคียงได้ที่มีความเข้มข้นนี้

ปี 1998 Hsiou และคณะ ทำการศึกษาโครงสร้างผลึกของ S-4-isopropoxycarbonyl-6-methoxy-3-(methylthiomethyl)-3, 4-dihydroquinolin-2(1H)-thione (HBY 097) ที่จับกับเอนไซม์ HIV-1 RT ทั้งชนิดดั้งเดิมและชนิดกลายพันธุ์ จากการศึกษพบว่า HBY 097 ซึ่งเป็นสารยับยั้งในกลุ่ม NNRT มีความจำเพาะเจาะจงต่อเอนไซม์ HIV-1 RT ชนิดกลายพันธุ์ และมี binding mode ที่แตกต่างไปจากสารยับยั้งในกลุ่ม NNRT ซึ่งปกติ binding mode ของสารยับยั้งในกลุ่ม NNRT มีลักษณะ butterfly-like shape นอกจากนี้ binding mode ของ HBY 097 ในเอนไซม์ HIV-1 RT ทั้งชนิดดั้งเดิมและชนิดกลายพันธุ์นั้นไม่แตกต่างกัน จากการศึกษาทางโครงสร้างผลึกของ HBY 097 ชี้ให้เห็นว่าสารยับยั้งที่มีความยืดหยุ่น สามารถยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 RT ชนิดกลายพันธุ์ได้ดี

ปี 1999 Barreca และคณะ ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและกัมมันตภาพในการยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 RT ของสารอนุพันธ์ TIBO โดยวิธี CoMFA และใช้การคำนวณ flexible docking เพื่อยืนยัน binding mode ของ TIBO ใน binding pocket ของเอนไซม์ HIV-1 RT และจากการศึกษาโดยวิธี CoMFA ให้ความสัมพันธ์ระหว่างค่า binding energies และความสามารถในการยับยั้ง (inhibitory potency) ที่ดี ดังนั้นแบบจำลองที่ได้สามารถทำนายกัมมันตภาพในการยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 RT ได้ดี โดยมีค่า r^2 เท่ากับ 0.90

ปี 1999 Lawtrakul และคณะ ได้ทำการศึกษาคอนฟอร์เมชันของสารยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 RT ในกลุ่มของสาร 1-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-6-(phenylthio)thymine (HEPT) โดยคำนวณด้วยระเบียบวิธี semiempirical (AM1, PM3 และ MNDO), *ab initio* (HF/6-31G**) และ DFT (B3LYP/6-31G**) ศึกษาอันตรกิริยาของสารยับยั้ง HEPT และเอนไซม์ HIV-1 RT ด้วยวิธีการคำนวณ molecular docking จากการศึกษพบว่ามียองศาการบิดเบี้ยวของพันธะที่มีพลังงานต่ำสุด โดยคอนฟอร์เมชันที่หนึ่งมี α dihedral angle อยู่ระหว่าง $65-76^\circ$ และคอนฟอร์เมชันที่สองมี α dihedral angle อยู่ระหว่าง $244-250^\circ$ นอกจากนี้พบว่าพันธะไฮโดรเจนระหว่างหมู่ hydroxyl ของ HEPT และ

กรดอะมิโน K103 ซึ่งจากการศึกษาทางโครงสร้างผลึกไม่พบอันตรกิริยานี้ ทั้งนี้เนื่องจากการในการ simulation ไม่มีโมเลกุลของน้ำเข้ามาเกี่ยวข้อง

ปี 1999 Hannongbua และคณะ ใช้วิธี CoMFA ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง โครงสร้างและกัมมันตภาพในการยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 RT ของสารอนุพันธ์ TIBO พบว่าแบบจำลองที่ได้มีความน่าเชื่อถือทางสถิติและสามารถทำนายกัมมันตภาพในการยับยั้งได้ ซึ่งให้ค่า r^2_{cv} เท่ากับ 0.771 โดยตัวอธิบายเชิงโครงสร้างที่สำคัญคือ สมบัติเชิงอิเล็กทรอนิกส์และสมบัติเชิงโมเลกุล นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของโครงสร้างที่สำคัญในการยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 RT ของสารยับยั้ง แต่อย่างไรก็ตามแบบจำลองนี้ ไม่สามารถอธิบายอิทธิพลที่มีผลต่อ hydrophobic ได้ เพราะมีความสัมพันธ์ระหว่าง C_2 และ $\log P$ สูง

ปี 1999 Patel และคณะ สังเคราะห์และตรวจวัดประสิทธิภาพในการยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 RT ของสารอนุพันธ์ efavirenz พบว่าสารอนุพันธ์ efavirenz ที่มีหมู่แทนที่ 5,6-difluoro (4f) สามารถยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 RT ได้ทั้งชนิดดั้งเดิมและชนิดกลายพันธุ์ นอกจากนี้ยังจะใช้เป็นต้นแบบในการสังเคราะห์สารยับยั้งในกลุ่ม second generation NNRTI ต่อไป

ปี 1999 Patel และคณะ สังเคราะห์และตรวจวัดกัมมันตภาพในการยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 RT ของสารอนุพันธ์ efavirenz โดยตำแหน่งที่ 5 และ 6 ในวง benzoxazinones ถูกแทนที่ด้วย fluoro (5a-d) และ nitro (5e-h) ตามลำดับ จากการทดลองพบว่าสารอนุพันธ์ efavirenz ที่สังเคราะห์ขึ้นมาใหม่นี้มีกัมมันตภาพในการยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 RT ที่ดีกว่า efavirenz ที่เป็นสารต้นแบบ

ปี 2000 Corbett และคณะ สังเคราะห์และตรวจวัดกัมมันตภาพในการยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 RT ของสารอนุพันธ์ efavirenz ได้แก่ DPC 082, DPC 083, DPC 961 และ DPC 963 จากการศึกษาพบว่าสารเหล่านี้มีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 RT ชนิดดั้งเดิมได้ในระดับความเข้มข้นนาโนโมลาร์ โดยมีค่า $IC(90)$ เท่ากับ 2.0, 2.1, 2.0 และ 1.3 nM ตามลำดับ นอกจากนี้ยังสามารถยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 RT ชนิดกลายพันธุ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของกรดอะมิโนตำแหน่งเดียวหรือหลายตำแหน่งได้

ปี 2000 Patel และคณะ สังเคราะห์และตรวจวัดกัมมันตภาพในการยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 RT ของสารประกอบในกลุ่ม 3,3-disubstituted quinoxalinones ซึ่งเป็นสารอนุพันธ์ของ efavirenz จากการศึกษาพบว่าสารประกอบ N-allyl (6b and 6f), N-cyclopropylmethyl (6a, 6g, 6h, and 6k) และ N-carboalkoxy (6m-6y) มีกัมมันตภาพในการยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 RT ได้ดีกว่า efavirenz และ GW420867X

ปี 2000 Pungpo และ Hannongbua ใช้วิธี CoMFA ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง โครงสร้างและกัมมันตภาพในการยับยั้งของสารอนุพันธ์ dipyrindiazepinone (nevirapine) เพื่อใช้เป็นสารยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 RT ทั้งชนิดดั้งเดิมและชนิดกลายพันธุ์ ผลที่ได้พบว่าแบบจำลองที่ได้จากการคำนวณด้วยวิธี CoMFA มีความสามารถในการทำนาย (predictive ability) ที่มีต่อเอนไซม์

ชนิดดั้งเดิมและชนิดกลายพันธุ์เท่ากับ 0.624 และ 0.726 ตามลำดับ จาก CoMFA contour maps แสดงให้เห็นว่า steric และ electrostatic interactions ที่เกี่ยวข้องกับการยับยั้งเอนไซม์ชนิดดั้งเดิมมีค่าเท่ากับ 58.5% และ 41.5% ตามลำดับ ในขณะที่เอนไซม์ชนิดกลายพันธุ์ให้ค่าว่า steric และ electrostatic interactions ไม่แตกต่างกัน

ปี 2000 Ren และคณะ [10] ได้ทำการศึกษาสมบัติทางโครงสร้างผลึกของ efavirenz และ nevirapine ที่จับกับเอนไซม์ HIV-1 RT ชนิดดั้งเดิมและชนิดกลายพันธุ์ (K103N) efavirenz เป็นสารยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 RT ในกลุ่ม second-generation NNRT จากการศึกษพบว่า efavirenz สามารถยับยั้งและมีความยืดหยุ่น (resilience) ต่อเอนไซม์ HIV-1 RT ชนิดกลายพันธุ์ (K103N) ได้ดีกว่าสารยับยั้งในกลุ่ม first-generation NNRT เช่น nevirapine

ปี 2001 Markwalder และคณะ สังเคราะห์และตรวจวัดกัมมันตภาพในการยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 RT ของสารอนุพันธ์ efavirenz จากการศึกษพบว่าสารอนุพันธ์ efavirenz ที่สังเคราะห์ขึ้นมาใหม่มีประสิทธิภาพต่ำในการยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 RT เมื่อเปรียบเทียบกับสาร efavirenz ต้นแบบ

ปี 2001 Cocuzza และคณะ สังเคราะห์และตรวจวัดกัมมันตภาพในการยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 RT ของสารอนุพันธ์ efavirenz โดยในการสังเคราะห์จะแบ่งสารอนุพันธ์ออกเป็นสองกลุ่ม โดยกลุ่มแรกทำการแทนที่หมู่ cyclopropane ด้วย heterocyclic ที่มีขนาดเล็ก ส่วนอีกกลุ่มแทนที่ acetylenic side chain ด้วยหมู่ alkyloxy จากการศึกษพบว่าสารอนุพันธ์ของ efavirenz ทั้งสองกลุ่มออกฤทธิ์เท่ากัน ในการยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 RT ชนิดดั้งเดิมและชนิดกลายพันธุ์ (K103N)

ปี 2001 Cocuzza คณะสังเคราะห์และตรวจวัดกัมมันตภาพในการยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 RT ของสารประกอบในกลุ่มของ 4,1-benzoxazepinone ซึ่งเป็นสารอนุพันธ์ของ efavirenz พบว่า cis-3-alkyl benzoxazepinones มีความสามารถในการยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 RT มากกว่าโครงสร้างที่เป็น trans isomers นอกจากนี้สารในกลุ่ม 4,1-benzoxazepinone ยังสามารถยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 RT ชนิดดั้งเดิมและชนิดกลายพันธุ์ (K103N) ได้

ปี 2001 Hannongbua และคณะ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและกัมมันตภาพในการยับยั้งของสารอนุพันธ์ HEPT โดยใช้วิธี CoMFA พบว่าแบบจำลองที่ได้จากการคำนวณด้วยวิธี CoMFA มีความสามารถในการทำนายสูง โดยมีค่า r^2_{cv} เท่า 0.858 และจาก contour maps แสดงให้เห็นว่า steric และ electrostatic interactions มีความสำคัญในการเกิดอันตรกิริยาของ HEPT กับเอนไซม์ HIV-1 RT โดย steric interactions จะเกิดระหว่างโมเลกุลของ HEPT กับวงอะโรมาติกของกรดอะมิโน Tyr181 ซึ่งถ้าคาร์บอนตำแหน่งที่ 5 ของ HEPT มีหมู่แทนที่ขนาดปานกลางจะช่วยให้ออกฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ดีขึ้น

ปี 2001 Hannongbua และคณะ ศึกษาคอนฟอร์เมชันของ (+)-(S)-4,5,6,7-tetrahydro-8-chloro-5-methyl-6-(3-methyl-2-butenyl)-imidazo[4,5,1-jk][1,4]benzodiazepine-2(1H)-thione (8-chloro-TIBO) ด้วยระเบียบวิธี ab initio และ DFT ทำการเปลี่ยนแปลงค่า dihedral angles ของ side

chain 2 มุม แล้วหา potential energy surface เพื่ออธิบายคอนฟอร์เมชันของ heterocyclic ring จากนั้นพิจารณาคอนฟอร์เมชันที่มีพลังงานต่ำสุดที่ได้จากการคำนวณเปรียบเทียบกับโครงสร้างที่ได้จาก X-ray crystallography พบว่ามีความสอดคล้องกัน โดยส่วนที่มีการเบี่ยงเบนเกิดจากอันตรกิริยากับ binding pocket ของเอนไซม์

ปี 2001 Hannongbua และคณะ ได้ศึกษาคอนฟอร์เมชันของ nevirapine บนพื้นฐานการคำนวณเคมีควอนตัม ได้แก้ระเบียบวิธี semi-empirical (MNDO, AMI และ PM3) *ab initio* (HF/3-21G และ HF/6-31G**) และระเบียบวิธี DFT (B3LYP/6-31G**) จากการศึกษพบว่าคอนฟอร์เมชันที่เสถียรที่สุดของ nevirapine ที่คำนวณได้จากวิธีเหล่านี้ เหมือนกับของ nevirapine ที่จับกับเอนไซม์ HIV-1 RT ที่ได้จากการทดลอง นอกจากนี้ยังคำนวณ ^1H -NMR and ^{13}C -NMR spectra ของโครงสร้างที่เสถียรของ nevirapine ด้วยวิธี DFT (B3LYP/6-31G**) พบว่าผลที่ได้จากการคำนวณสอดคล้องกับผลที่ได้จากการทดลอง

ปี 2001 Cobett และคณะ สังเคราะห์และตรวจวัดกัมมันตภาพในการยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 RT ของสารประกอบ 3,3a-dihydropyrano[4,3,2-de]quinazolin-2(1H)-ones และ 2a,5-dihydro-2H-thieno[4,3,2-de]quinazolin-4(3H)-thione ซึ่งเป็นสารอนุพันธ์ของ efavirenz จากการศึกษพบว่าสารประกอบที่สังเคราะห์ได้ในการทดลองนี้ สามารถยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 RT ได้ทั้งชนิดดั้งเดิมและชนิดกลายพันธุ์ (K103N และ K103N/L100I)

ปี 2003 Chen และคณะ ได้เปรียบเทียบการศึกษาสมบัติทางด้านโครงสร้างของ HEPT และ TIBO ที่คำนวณโดยวิธี 3D-QSAR และวิธีการคำนวณ molecular docking โดยวิธี molecular docking ใช้ศึกษาอันตรกิริยาระหว่างสารยับยั้ง HEPT และ TIBO กับ binding pocket ของเอนไซม์ HIV-1 RT และจากการศึกษาพบว่า HEPT และ TIBO เกิดอันตรกิริยากับ binding pocket ของเอนไซม์ HIV-1 RT ในลักษณะที่เหมือนกัน โดยจะสร้างพันธะไฮโดรเจนกับกรดอะมิโน Lys101 และเกิดอันตรกิริยาแบบ hydrophobic กับกรดอะมิโน Tyr181, Tyr188 และ Tyr318 ของเอนไซม์ HIV-1 RT สำหรับการคำนวณ 3D-QSAR ด้วยวิธี CoMFA และ CoMSIA พบว่าได้แบบจำลองที่ดีในการทำนายกัมมันตภาพของ HEPT และ TIBO ในการยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 RT โดยมีค่า r^2 เท่ากับ 0.940 และ 0.920 ตามลำดับ นอกจากนี้ยังทำให้เข้าใจถึงอันตรกิริยาของสารยับยั้งและเอนไซม์ได้ดีขึ้น และเป็นแนวทางในการออกแบบโครงสร้างของสารยับยั้งชนิดใหม่ที่มีความสามารถในการยับยั้งสูง

ปี 2003 Saenoon และคณะศึกษาคอนฟอร์เมชันของ (+)-(s)-4,5,6,7-tetrahydro-9-chloro-5-methyl-6-(3-methyl-2-butenyl)imidazol[4,5,1-jk][1,4]benzodiazepin-2(1H)-thione (9-Cl TIBO) โดยวิธี HF/6-31G** และ B3LYP/6-31G** จากการศึกษพบว่า มี 8 คอนฟอร์เมชันที่เสถียร โดยแต่ละคอนฟอร์เมชันมีค่า energy barriers ต่ำกว่า 15 kJ/mol นอกจากนี้การคำนวณ ^1H NMR และ ^{13}C

NMR spectra ของคอนฟอร์เมอร์ที่มีพลังงานต่ำสุด ด้วยวิธี B3LYP/6-311++G** ให้ผลที่สอดคล้องกับผลการทดลอง

ปี 2003 Pungpo และคณะ ใช้วิธี hologram quantitative structure-activity relationships (HQSA) ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและกัมมันตภาพในการยับยั้งของสาร TIBO, HEPT และ dipyrindodiazepinone จากการศึกษาพบว่าแบบจำลองที่ได้จากการคำนวณสามารถใช้ทำนายกัมมันตภาพของสารยับยั้งได้ โดยมีค่า r^2_{cv} อยู่ในช่วง 0.62-0.84 และยังชี้ให้เห็นว่าอันตรกิริยาที่สำคัญของสารยับยั้งทั้งสามที่มีต่อเอนไซม์มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน

ปี 2004 Medina-Franco และคณะ นำเอาการวางตัว (alignment) ของสารอนุพันธ์ pyridinone ใน binding pocket ของเอนไซม์ HIV-1 RT ที่คำนวณได้จากวิธีการคำนวณ molecular docking ไปศึกษาด้วยวิธี CoMFA และ CoMSIA จากการศึกษาด้วยวิธี CoMFA และ CoMSIA ได้แบบจำลองที่ให้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง binding free energies กับค่ากัมมันตภาพในการยับยั้งที่ได้จากการทดลอง โดยมีค่า r^2 เท่ากับ 0.720 และ 0.750 ตามลำดับ และยังสามารถชี้แนะการออกแบบโมเลกุลของสารอนุพันธ์ pyridinone ที่มีความสามารถในการยับยั้งสูงได้ นอกจากนี้การคำนวณด้วยวิธี molecular docking ยังช่วยให้เข้าใจถึงชนิดของอันตรกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างสารยับยั้งและ binding pocket ของเอนไซม์ HIV-1 RT และยังสามารถอธิบายการยับยั้งเอนไซม์กลายพันธุ์ชนิด Tyr181 และ Tyr188 ของสารอนุพันธ์ pyridinone ได้อีกด้วย

ปี 2004 Ragno และคณะ พยายามปรับปรุงกัมมันตภาพในการยับยั้งและ selectivity ของ thio-DABOs (S-DABOs), DATNOs และ difluoro-thio-DABOs (F(2)-S-DABOs) ซึ่งเป็นสารอนุพันธ์ของ dihydro-alkoxy-benzyl-oxypyrimidines (DABOs) ดังนั้นจึงทำการสังเคราะห์สารอนุพันธ์ DABOs ชนิดใหม่ขึ้นมา นอกจากนี้ยังศึกษาทางด้านชีวภาพและ molecular modeling ด้วยวิธี molecular docking ในการสังเคราะห์นี้ทำได้โดยแทนที่อะตอม sulfur ของ F(2)-S-DABOs ด้วยหมู่อะมิโน โดยจะใช้สาร (5-alkyl-2-cyclopentylamino-6-[1-(2,6-difluorophenyl)alkyl]-3,4-dihydropyrimidin-4(3H)-ones (F(2)-NH-DABOs) เป็นสารต้นแบบ สำหรับวิธี molecular docking จะใช้ reference model ที่ได้จากการศึกษาโครงสร้างผลึกของ MKC-442 ที่จับกับเอนไซม์ HIV-RT จากการศึกษาพบว่า binding mode ของ F(2)-NH-DABO คล้ายคลึงกับ binding mode ของ F(2)-S-DABOs แต่แตกต่างกันตรงตำแหน่ง NH ที่คาร์บอนตำแหน่งที่ 2 ซึ่งเป็นตำแหน่งใหม่ที่ใช้ในการจับกับเอนไซม์ และพบว่า F(2)-NH-DABOs มีความสามารถในการยับยั้งสูงกว่า MKC-442 ที่น่าสนใจอีกอย่างคือ 2-cyclopentylamino-6-[1-(2,6-difluorophenyl)ethyl]-3,4-dihydro-5-methylpyrimidin-4(3H)-one สามารถยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 RT กลายพันธุ์ชนิด Y181C ได้ที่ระดับความเข้มข้น submicromolar และการออกฤทธิ์คล้ายกับ efavirenz โดยตำแหน่ง pyrimidine C-2 NH group เกิด hydrogen bond กับ Lys101

ปี 2004 Zhou และ Madura นำคอนฟอร์เมชันและการ alignment จากวิธีคำนวณ molecular docking มาใช้ในการศึกษา CoMFA และ CoMSIA ของสารอนุพันธ์ TIBO จากการศึกษพบว่าแบบจำลองที่ได้มีความสามารถในการทำนายกับมโนทัศน์ในการยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 RT ได้ดี โดยให้ค่า r^2 เท่ากับ 0.972 และ 0.944 ตามลำดับ และแสดงให้เห็นว่า steric และ electrostatic properties ที่ทำนายได้จาก CoMFA contours สอดคล้องกับ binding structure ที่ได้จากการคำนวณโดย molecular docking ซึ่งชี้แนะให้เห็นว่าการนำวิธี ligand-based และ receptor-based modeling มาใช้ร่วมกันทำให้ได้แบบจำลองที่ดี

ปี 2004 Medina-Franco และคณะ ใช้วิธีการคำนวณ molecular docking เพื่อศึกษาอันตรกิริยาของสารอนุพันธ์ pyridinone ใน binding pockets ของเอนไซม์ HIV-1 RT ที่จับอยู่กับ nevirapine, 1051U91, 9-Cl-TIBO, Cl-a-APA, efavirenz, UC-781, และ S-1153 ผลจากการทดลองพบว่าสารอนุพันธ์ pyridinone ใน binding pockets ทั้งหมดมี binding mode แบบ butterfly like shape นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ในการออกแบบสารอนุพันธ์ pyridinone ในลักษณะที่เป็น hybrid pyridinone molecules เพื่อใช้เป็นสารยับยั้งเอนไซม์ชนิดใหม่ที่มีศักยภาพสูงได้

ปี 2004 Kalyan และคณะ ศึกษาสารยับยั้ง TMC125-R165335 (etravirine) เพื่อใช้เป็นสารยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 RT ในกลุ่ม NNRTI ด้วยวิธี molecular docking และพบว่าสาร etravirine เมื่ออยู่ใน binding pocket ของเอนไซม์ HIV-1 RT สามารถเปลี่ยนตำแหน่งและหมุนโครงสร้าง (jiggling) ได้ นอกจากนี้ยังเกิด torsional flexibility (wiggling) ทำให้ etravirine มีหลายคอนฟอร์เมชัน จึงสามารถยับยั้งเอนไซม์ชนิดดั้งเดิมและชนิดกลายพันธุ์ได้ดี

ปี 2005 Rodriguez-Barrios และคณะ ได้ศึกษาการยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 RT กลายพันธุ์ชนิด Lys103Asn ของสารยับยั้งในกลุ่ม NNRT เช่น nevirapine, efavirenz, และ etravirine โดยวิธี molecular dynamics simulations และวิธีการคำนวณ molecular docking จากการศึกษาที่ผ่านมาของ Rodriguez-Barrios พบว่าการจับของสารยับยั้งในกลุ่ม NNRT กับเอนไซม์ HIV-1 RT ชนิดกลายพันธุ์ลดลง เนื่องจากเอนไซม์ HIV-1 RT เกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่าง side chains ของ Asn103 และ Tyr188 ซึ่งการเกิดพันธะนี้จะไม่พบในเอนไซม์ HIV-1 RT ชนิดดั้งเดิม ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงศึกษาคอนฟอร์เมชันของเอนไซม์ HIV-1 RT ทั้งที่จับและไม่จับกับสารยับยั้ง จากการศึกษพบว่าผลของการเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่าง side chains ของ Asn103 และ Tyr188 มีผลต่อสารยับยั้งแต่ละชนิดในกลุ่ม NNRTI แตกต่างกันไป เช่น การเกิดพันธะไฮโดรเจนนี้จะมีผลน้อยมากต่อกับมโนทัศน์การยับยั้งของสาร etravirine แต่จะมีผลอย่างมากต่อสารยับยั้ง efavirenz และ nevirapine

ปี 2005 Mei และคณะ ได้ศึกษาการจับของสารยับยั้ง efavirenz กับเอนไซม์ HIV-1 RT ชนิดดั้งเดิมและชนิดกลายพันธุ์ (K103N และ Y181C) ด้วยระเบียบวิธี molecular fractionation with conjugate caps (MFCC) และพลังงานที่ใช้ในการจับ (binding energy) ระหว่าง efavirenz กับเอนไซม์ HIV-1 RT คำนวณด้วยระเบียบวิธี *ab initio* ได้แก่ HF/3-21G, B3LYP/6-31G* and

MP2/6-31G* จากการศึกษพบว่า efavirenz จับกับเอนไซม์ HIV-1 RT ชนิดดั้งเดิมด้วยอันตรกิริยาแบบ strong electrostatic กับกรดอะมิโน Lys101 และการเกิดอันตรกิริยาแบบนี้จะเป็นแรงแบบอ่อนในเอนไซม์กลายพันธุ์ชนิด K103N ทำให้กัมมันตภาพการยับยั้งของ efavirenz ลดลงเล็กน้อย ส่วนการจับกับเอนไซม์กลายพันธุ์ชนิด Y181C จะลดลงเช่นกัน แต่จะเกิดเนื่องจากเกิด steric ระหว่าง efavirenz และกรดอะมิโน Glu698 ซึ่งถ้าเพิ่มอันตรกิริยาของ efavirenz กับกรดอะมิโน Hid235 และลด steric กับ Glu698 จะให้ค่า binding energy ดีขึ้นประมาณ 4 kcal/mol

ปี 2005 Chen และคณะ ศึกษา binding mode ของ 3',4'-di-O-(S)-camphanoyl-(+)-cis-khellactone (DCK) analogs ที่จับกับเอนไซม์ HIV-1 RT โดยวิธีการคำนวณ molecular docking และ molecular dynamics simulation ผลจากการศึกษาพบว่า DCK เกิดพันธะไฮโดรเจนกับ NH ของกรดอะมิโน Lys101 ของเอนไซม์ HIV-1 RT และมีพฤติกรรมเหมือนสารยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 RT ชนิดอื่น นอกจากนี้ยังพบว่าการกลายพันธุ์ของเอนไซม์ที่พบบ่อยสำหรับสารยับยั้ง DCK คือการกลายพันธุ์ชนิด K103N และใช้ SVM model ในการออกแบบสารยับยั้งตัวใหม่และทำนายค่ากัมมันตภาพในการยับยั้งสำหรับสารในกลุ่ม DCK ซึ่งพบว่าสารยับยั้งที่ออกแบบมาใหม่สามารถยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 RT ได้ โดยมีค่า EC_{50} ต่ำกว่า 1.95 μ M

ปี 2005 Heeres และคณะ ได้ออกแบบสารยับยั้งชนิดใหม่ สังเคราะห์และใช้วิธี molecular docking ในศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและกัมมันตภาพในการยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 RT ของสารในกลุ่ม pyrazinones จากการศึกษพบว่าตำแหน่งที่ 4 ของ aniline ring เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อกัมมันตภาพของ pyrazinones โดยเมื่อตำแหน่งนี้ถูกแทนที่ด้วยหมู่ methyl จะทำให้มีกัมมันตภาพดีขึ้น แต่เมื่อหมู่แทนที่เป็นอะตอมของฟลูออรีน หรือหมู่ CF_3 จะทำให้กัมมันตภาพในการยับยั้งลดลง นอกจากนี้ยังพบว่ามีอันตรกิริยาแบบ electrostatic เกิดขึ้นระหว่างสารยับยั้งกับกรดอะมิโน H235 ที่ช่วยทำให้กัมมันตภาพในการยับยั้งดีขึ้น

ปี 2005 Ragno และคณะ ใช้วิธีการ docking และ GRID/GOLPE 3-D QSAR ในการศึกษาสมบัติทางโครงสร้างและกัมมันตภาพของสารยับยั้งในกลุ่ม indolyl aryl sulfones (IASs) ซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์สูงในการยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 RT ทั้งชนิดดั้งเดิมและชนิดกลายพันธุ์ (Y181C, K103N-Y181C, K103R-V179D-P225H) การวางตัวที่ได้จากวิธี docking นำไปใช้ในวิธี 3-D QSAR การศึกษพบว่าแบบจำลองที่ได้จาก 3-D QSAR มีความสามารถในการทำนายที่ดีโดยมีค่า r^2 และค่า q^2 อยู่ในช่วง 0.79-0.93 และ 0.59-0.84 ตามลำดับ และยังพบว่าพันธะไฮโดรเจนที่ NH ของ 2-carboxamide ซึ่งเป็นประโยชน์ในการยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 RT

ปี 2005 Weininger และคณะ ใช้วิธีการคำนวณ molecular docking ศึกษาอันตรกิริยาของสารยับยั้ง efavirenz และสารอนุพันธ์ ที่มีต่อเอนไซม์ HIV-1 RT จากนั้นนำ geometry ของสารยับยั้งทั้งหมดที่ได้ไปศึกษา molecular dynamics simulation และคำนวณค่า binding energy จากการศึกษพบว่าค่า binding energy ที่คำนวณได้สอดคล้องกับการทดลอง โดยมีค่า r^2 เท่ากับ 0.865 และผลจาก

การทำ molecular dynamics simulation พบว่า efavirenz และสารอนุพันธ์ จับกับเอนไซม์ HIV-1 RT โดยเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่าง NH ของ efavirenz และออกซิเจนอะตอมของกรดอะมิโน Lys 101 ที่ระยะประมาณ 1.88 Å นอกจากนี้ยังเกิด electrostatic interaction กับกรดอะมิโน Lys 101 และ His 235

ปี 2005 Martino และคณะ ได้ทำการสังเคราะห์และทดสอบกัมมันตภาพในการยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 RT ของสารยับยั้ง 1-[2-(Diarylmethoxy)ethyl]-2-methyl-5-nitroimidazoles (DAMNIs) ซึ่งเป็นสารยับยั้งชนิดใหม่ในกลุ่ม NNRTI และสามารถออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ได้ที่ระดับความเข้มข้น submicromolar จากการทดลองพบว่าเมื่อแทนที่ phenyl ring ของ 1-[2-(diphenylmethoxy)ethyl]-2-methyl-5-nitroimidazole ด้วย heterocyclic rings เช่น 2-thienyl or 3-pyridinyl จะทำให้เพิ่มกัมมันตภาพของ DAMNIs และจากการคำนวณ molecular docking พบว่าโครงสร้างที่เป็น enantiomer ของ DAMNIs ไม่มีผลต่อการจับกับเอนไซม์ นอกจากนี้ยังพบว่าสารยับยั้งที่เป็นสารอนุพันธ์ของ DAMNIs มีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 RT กลายพันธุ์ชนิด K103N ได้ดีกว่า efavirenz

ปี 2005 Ranise และคณะ ทำการสังเคราะห์สารยับยั้ง thiocarbamates (TCs) เพื่อเป็นสารยับยั้งชนิดใหม่ในกลุ่ม NNRTI พร้อมทั้งทำการศึกษาทางด้าน structure-based ligand design โดยวิธี molecular docking จากการศึกษพบว่า TCs ที่มีหมู่แทนที่ตำแหน่ง para จะสามารถยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 RT ชนิดดั้งเดิมได้ที่ระดับความเข้มข้น nanomolar (EC_{50} อยู่ในช่วง 0.04-0.01 μ M) เมื่อมีหมู่ methyl ที่คาร์บอนตำแหน่งที่ 4 ของ phthalimide และมี nitro group ที่ตำแหน่ง para ของ N-Ph ring จะทำให้ TCs มีฤทธิ์ในการยับยั้งสูงสุด ($EC_{50} = 0.01 \mu$ M) นอกจากนี้ยังค่า selectivity indexes ที่ดีและไม่มีผลข้างเคียง สารอนุพันธ์บางตัวของ TCs สามารถยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 RT กลายพันธุ์ชนิด Y181C แต่ไม่สามารถยับยั้งเอนไซม์กลายพันธุ์ชนิด K103R และ K103N + Y181C จาก docking model ให้การทำนายกัมมันตภาพที่สอดคล้องกับการทดลอง

ปี 2006 Saparpakorn และคณะ ได้ใช้วิธีการคำนวณ molecular docking ในการออกแบบโมเลกุลของสารอนุพันธ์ nevirapine ที่มีศักยภาพสูงต่อการยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 RT ชนิดกลายพันธุ์ (K103N และ Y181C) โดยใช้โปรแกรม GOLD และ SILVER พบว่าการ dock สารยับยั้งเข้าไปใน binding pocket ของเอนไซม์ด้วยโปรแกรม GOLD ให้ค่า GoldScore สูงกว่าที่คำนวณจากโปรแกรม SILVER และพบว่าสารอนุพันธ์ nevirapine เกิดพันธะไฮโดรเจน กับกรดอะมิโน N103 หรือ C181 และมีการนำเอาวิธี quantum chemical calculations (QCCs) มาใช้ในการคำนวณค่า interaction energies ซึ่งพบวิธี QCCs สามารถนำมาใช้ควบคู่กับวิธีการคำนวณ molecular docking ได้

บทที่ 3

ระเบียบวิธีวิจัย

1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำวิจัย

- 1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ PCs (Pentium IV) 2.8 MHz
- 1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ High performance (SGI)
- 1.3 เครื่องพิมพ์ (Laser Printer)
- 1.4 เครื่องพิมพ์ (Color Printer)
- 1.5 โปรแกรมการคำนวณทางเคมีควอนตัม (Gaussian 98)
- 1.6 โปรแกรมการคำนวณทางโมเลคิวลาร์โมเดลลิง (Alchemy 2000, Hyperchem 6.0 และ Weblabviewer 3.0, ChemDraw, Sybyl, Autodock, GOLD)
- 1.7 โปรแกรมการคำนวณทางสถิติ (SPSS for Windows 10.0)
- 1.8 โปรแกรมส่งข้อมูล (WS-FTP)

2. ข้อมูลโครงสร้างและค่ากัมมันตภาพของตัวยับยั้งในกลุ่ม Efavirenz ในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ HIV-1

2.1 ข้อมูลกัมมันตภาพของตัวยับยั้งในกลุ่ม Efavirenz ในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ HIV-1

รวบรวมข้อมูลทางโครงสร้างและค่ากัมมันตภาพของสารในกลุ่ม efavirenz จำนวน 56 สารประกอบ โดยมีการรายงานค่าแสดงกัมมันตภาพในการยับยั้งของเอนไซม์เอชไอวี-1 (inhibitory activity) แตกต่างกัน 2 ชนิด คือ ชนิดดั้งเดิม (WT) และชนิดกลายพันธุ์ (K103N) โดยสารทุกตัวนั้นมีการทดสอบค่ากัมมันตภาพในการยับยั้งเอนไซม์ชนิดดั้งเดิม จึงเลือกสารประกอบจำนวน 56 ตัวที่มีค่ากัมมันตภาพในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบทั้ง 2 ชนิดเป็นกลุ่มข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของโครงสร้างสำคัญในการยับยั้งเอนไซม์ (ดังตารางที่ 1) ค่าตัวแปรตาม (dependent variable) คือค่า $\log(1/C)$ โดย C คือค่าความเข้มข้นยังผล (effective concentration) ในการป้องกันเซลล์ชนิด MT-4 ต่อ cytopathic effect ของเอนไซม์ถ่ายแบบเอชไอวี1 ได้ 90% (90% inhibitory concentration, IC_{90})

2.2 การสร้างและคำนวณโครงสร้างของโมเลกุลตัวยับยั้ง


โครงสร้างเริ่มต้นของ efavirenz ได้จากข้อมูลทาง x-ray crystallography ของ WT HIV-1 RT/ efavirenz complex (FK9) จากนั้นสารอนุพันธ์ของ efavirenz จำนวน 56 โมเลกุลถูกสร้างโดยใช้โปรแกรมโมเลคิวลาร์โมเดลลิง ALCHEMY2000 ซึ่งโครงสร้างทั้งหมดนี้จะทำการคำนวณปรับโครงสร้างที่เสถียรที่สุด (full geometrical optimization) โดยวิธีแอบอิงิซิโอ (HF/3-21G)

2.3 การคำนวณโครงสร้างคอนฟอร์เมชัน

2.3.1 รวบรวมข้อมูลด้านโครงสร้างผลึก (X-ray crystallography) จากการทดลองของการจับกันระหว่างสารยับยั้ง efavirenz และเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 (HIV-1 RT/ efavirenz complex) ทั้งชนิดดั้งเดิมและชนิดที่มีการกลายพันธุ์

2.3.2 ในการวิเคราะห์คอนฟอร์เมชันบนพื้นฐานทางเคมีควอนตัมของสารยับยั้ง efavirenz โครงสร้างเริ่มต้นนำมาจากข้อมูลทางโครงสร้างผลึกของ HIV-1 RT/efavirenz complex ทั้งชนิดดั้งเดิมและชนิดที่มีการกลายพันธุ์ และนำมาคำนวณโดยวิธีทางโมเลกุลาร์ออร์บิทัลคือ เซมิอิมพีริคัล (AM1 และ PM3) แอบ อินิซิโอ (HF/3-21G และ HF/6-31G**) และวิธีทฤษฎีเด้นซิตี ฟังก์ชันแนล (B3LYP/6-311++G**) โดยโปรแกรม GAUSSIAN เพื่อเปรียบเทียบโครงสร้างที่เสถียรที่สุดของแต่ละวิธีและทำการเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้อีกกับข้อมูลการทดลองทาง โครงสร้างผลึก

2.3.3 จากโครงสร้างเริ่มต้นของ efavirenz ที่ได้จากข้อ 9.1.1 จะพิจารณาการปรับเปลี่ยนมุมพันธะของ มุมไดฮีดรอล (dihedral angle) ที่อยู่ในระบบ heterocyclic ring กับ side chain ในส่วนที่เป็นหมู่ CF_3 และ cyclopropyl โดยจะทำการเลือก dihedral angle ที่มี flexibility มากที่สุด คือ มุม α (O6-C14-C17-C19) และ มุม β (C21-O6-C14-C15) (ภาพที่ 2) ครั้งละ 30 องศาแล้วคำนวณแบบ partial optimization โดยระเบียบวิธีเซมิอิมพีริคัล (AM1 และ PM3) และวิธี แอบอินิซิโอ (HF/3-21G) เพื่อสร้างแผนภาพ rotational potential ข้อมูลที่ได้จากการคำนวณดังกล่าวจะนำไปสู่การอธิบายโครงสร้างของสาร efavirenz ที่เหมาะสมที่สุดและอันตรกิริยาระหว่างตัวยับยั้งกับโครงสร้างของเอนไซม์ใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและกัมมันตภาพของสารยับยั้งต่อไป



รูปที่ 2 โครงสร้างของ efavirenz และมุมไดฮีดรอล α และ β ที่ใช้ในการแผนภาพพลังงานศักย์

2.4 การศึกษา Molecular Docking

นำโครงสร้างที่เสถียรของสารยับยั้งในกลุ่มสารอนุพันธ์ efavirenz ที่ได้จากการคำนวณข้อ 2.2 มาศึกษาอันตรกิริยาระหว่างสารยับยั้งและโพรงการจับ (binding pocket) ของเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 ทั้งชนิดดั้งเดิม (WT) และชนิดกลายพันธุ์ (K103N) ด้วยวิธี molecular docking โดยใช้โปรแกรม Autodock 3.0 ในการหาดำแหน่งการจัดวางตัวของสารยับยั้งในโครงสร้างของเอนไซม์ที่มีพลังงานต่ำ และได้ค่าพลังงานในการจับ (binding energy) ระหว่างสารยับยั้งและโพรงการจับ (binding pocket) ของเอนไซม์

2.5 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับกัมมันตภาพในการยับยั้งแบบสามมิติ


ทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับกัมมันตภาพในการยับยั้งแบบ 3D-QSAR ในโครงสร้างนี้จะใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบสนามของโมเลกุล (Comparative Molecular Fields Analysis, CoMFA) และวิธีวิเคราะห์เปรียบเทียบดัชนีความเหมือนเชิงโมเลกุล (Comparative Similarity Index Analysis, CoMSIA) ซึ่งเป็นวิธีด้าน Computer-Aided Molecular Design

2.6 การออกแบบโครงสร้างสารตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง

ทำการออกแบบโครงสร้างสารตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยนำเอาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธี molecular docking ซึ่งเป็นงานทางด้าน structure-based drug design พิจารณาร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและกัมมันตภาพในการยับยั้ง (QSAR) ซึ่งเป็นงานทางด้าน ligand based drug design ที่ได้ดำเนินการมาแล้วเพื่อใช้เป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยในการออกแบบปรับเปลี่ยนโครงสร้างตัวยับยั้งการถ่ายแบบเอชไอวี-1 ในกลุ่ม efavirenz ให้มีศักยภาพสูงขึ้นในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 ทั้งชนิดดั้งเดิม (WT) และชนิดกลายพันธุ์ (K103N)

2.7 สรุปผล

ตารางที่ 1 โครงสร้างของสารประกอบในกลุ่ม Efavirenz ที่เป็นกลุ่มของ Training set และกัมมันตภาพในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ HIV-1 ชนิดดั้งเดิมและชนิดกลายพันธุ์ (K103N)



Cpds No.	X	R	Z	log(1/C)	
				WT	K103N
01	6-Cl	CC-cyclopropyl	O	8.77	7.19
02	6-Cl	CC-2-pyridyl	O	8.27	5.96
03	6-Cl	CC-3-pyridyl	O	8.40	6.94
04	6-Cl	CC-2-furanyl	O	8.42	6.82
05	6-Cl	CC-3-furanyl	O	8.42	6.49
06	5,6-diF	CC-3-pyridyl	O	8.65	7.23
07	6-F	CC-3-furanyl	O	8.60	6.43
08	6-F	CC-3-pyridyl	O	8.59	6.48
09	5,6-diF	CC-3-furanyl	O	8.49	6.55
10	5,6-diF	CC-2-thienyl	O	8.65	6.81
11	5,6-diF	CC-3-thienyl	O	8.63	6.86
12	6-Cl	OCH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃	O	7.99	6
13	6-Cl	OCH ₂ CH ₂ CH(CH ₃) ₂	O	8.00	6.54
14	6-Cl	OCH ₂ CHCH(CH ₃) _{cis}	O	8.36	6.63
15	6-Cl	OCH ₂ CHCH(CH ₃) _{tran}	O	8.25	6.39
16	6-Cl	OCH ₂ CHC(CH ₃) ₃	O	8.57	7.08
17	6-Cl	OCH ₂ CCCH ₃	O	8.50	6.51
18	6-Cl	OCH ₂ CHCCl ₂	O	8.02	6.62
19	6-F	OCH ₂ CHC(CH ₃) ₂	O	8.53	6.97
20	6-F	OCH ₂ CHCH(CH ₃) _{tran}	O	8.05	5.94
21	5,6-diF	OCH ₂ CHC(CH ₃) ₂	O	8.81	7.19
22	5,6-diF	OCH ₂ CHCH ₂	O	8.19	5.79
23	5,6-diF	OCH ₂ CHCCl ₂	O	8.20	6.74
24	5,6-diF	CC-ethyl	NH	8.82	7.85
25	5-F	CC-cyclopropyl	NH	8.85	7.05

Cpds No.	X	R	Z	log(1/C)	
				WT	K103N
26	5-Cl,6-F	CC-isopropyl	NH	8.52	7.82
27	5-Cl	CC-cyclopropyl	NH	8.60	7.2
28	5,6-diF	CC-cyclopropyl	NH	8.68	7.89
29	5,6-diF	CC-isopropyl	NH	8.68	7.85
30	6-F	CC-cyclopropyl	NH	8.70	7.32
31	5,6-diF	CC-2-pyridyl	NH	8.70	6.96
32	6-F	CC-ethyl	NH	8.60	7.15
33	5-Cl,6-F	CC-cyclopropyl	NH	8.57	7.74
34	6-MeO	CC-cyclopropyl	NH	8.54	7.4
35	6-F	CC-2-pyridyl	NH	8.30	6.32
36	5-F,6-Cl	CC-cyclopropyl	NH	8.32	7.74
37	5-Cl,6-F	CC-2-pyridyl	NH	8.64	7.14
38	6-Cl	CC-cyclopropyl	NH	8.57	7.66
39	6-MeO	CC-isopropyl	NH	8.42	7.25
40	6-MeO	CC-phenyl	NH	8.49	6.55
41	5,6-diF	CC-phenyl	NH	8.21	6.72
42	6-F	CC-phenyl	NH	8.18	6.49
43	6-Cl	CC-2-pyridyl	NH	8.47	6.8
44	6-Cl	CC-ethyl	NH	8.48	7.59
45	6-Cl	CC-phenyl	NH	8.15	6.6
46	6-F	CC-isopropyl	NH	8.59	7.57
47	5,6-diCl	CC-cyclopropyl	NH	8.10	7.74
48	6-Cl	CC-isopropyl	NH	8.52	7.66
49	6-MeO	CC-2-pyridyl	NH	8.09	6.47
50	5-MeO,6-Cl	CC-cyclopropyl	NH	8.46	8.12
51	5-MeO,6-Cl	CC-phenyl	NH	8.10	6.95
52	5-MeO,6-Cl	CC-3-pyridyl	NH	8.15	6.86
53	5-OH,6-Cl	CC-cyclopropyl	NH	8.44	7.55
54	6-Cl	CHCO-cyclopropyl	NH	8.44	7.12
55	6-Cl	CHCO-phenyl	NH	8.09	7.34
56	6-Cl	CHCO-3-pyridyl	NH	8.34	7.12



บทที่ 4

ผลการศึกษา



1. การคำนวณเชิงโมเลกุลของคอนฟอร์เมชันของตัวยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ เอช ไอ วี -1 ของ สาร Efavirenz

จากการคำนวณโครงสร้างที่เสถียรที่สุดของตัวยับยั้งการถ่ายแบบ HIV-1 ในกลุ่มของ efavirenz โดยวิธีทางเคมีควอนตัมโดยระเบียบวิธีเซมิอิมพิริคัล (semiempirical molecular orbital calculations) และ แอบ อินิซิโอ (ab-initio molecular orbital calculations) เพื่อเปรียบเทียบผลที่ได้กับโครงสร้างของ efavirenz ที่ได้จากการทดลอง โดยมุ่งหวังที่จะหาวิธีการคำนวณที่ได้ผลการปรับโครงสร้างที่ดีที่สุดและใช้การคำนวณที่เหมาะสมที่สุด เพื่อที่จะนำเอาโครงสร้างที่เสถียรที่สุดนั้นไปศึกษาในขั้นตอนต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของสารอนุพันธ์ในกลุ่ม efavirenz กับกัมมันตภาพในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ HIV-1 และการออกแบบโมเลกุลตัวยับยั้งใหม่



ในการทำการศึกษาคอนฟอร์เมชันของสารอนุพันธ์อีฟาเวรีเรนซ์ที่แสดงกัมมันตภาพสูงที่สุดในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 ชนิดดั้งเดิมและชนิดกลายพันธุ์ (K103N) โดยอาศัยระเบียบวิธีการคำนวณบนพื้นฐานทางเคมีควอนตัม ได้แก่ ระเบียบวิธี AM1, PM3, HF/3-21G, HF/6-31G* และ B3LYP/6-31G* ในการสร้างแผนภาพพลังงานศักย์ในเชิงสองมิติและสามมิติ ผลจากการศึกษาพบว่าแผนภาพพลังงานศักย์ที่ได้จากการคำนวณด้วยระเบียบวิธีการคำนวณขั้นสูงสามารถทำให้เข้าใจถึงคอนฟอร์เมชันที่เป็นไปได้ของสารยับยั้งอีฟาเวรีเรนซ์ และ สารอนุพันธ์อีฟาเวรีเรนซ์ และ ชี้ให้เห็นว่าโมเลกุลของสารยับยั้งอีฟาเวรีเรนซ์และสารอนุพันธ์มีความยืดหยุ่นในโมเลกุลสูงซึ่งจะแสดงบทบาทสำคัญในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 ทั้งชนิดดั้งเดิมและชนิดกลายพันธุ์



รูปที่ 3 แผนภาพพลังงานศักย์ของการหมุนของมุมแอลฟา (ก) และมุมเบต้า (ข) ของโมเลกุลอีฟาเวรีเรนซ์



รูปที่ 4 แผนภาพพลังงานศักย์ของการหมุนของมุมแอลฟาและมุมเบต้าของสารอนุพันธ์อีฟาวิเรนซ์ที่แสดงกัมมันตภาพสูงที่สุดในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 ชนิดดั้งเดิม




รูปที่ 5 แผนภาพพลังงานศักย์ของการหมุนของมุมแอลฟาและมุมเบต้าของสารอนุพันธ์อีฟาวิเรนซ์ที่แสดงกัมมันตภาพสูงที่สุดในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 ชนิดกลายพันธุ์ (K103N)


2. การศึกษา Molecular Docking

ได้นำโครงสร้างที่ทำการปรับเสถียรของสารยับยั้งอีฟาวิเรนซ์ และสารอนุพันธ์อีฟาวิเรนซ์ มาศึกษาอันตรกิริยาระหว่างสารอนุพันธ์อีฟาวิเรนซ์ และโปรรงการจับของเอนไซม์ HIV-1 RT ทั้งชนิดดั้งเดิมและชนิดกลายพันธุ์ (K103N) โดยการคำนวณโมเลกุลาร์ด็อกกิ้ง จากการศึกษาพบว่าการคำนวณโมเลกุลาร์ด็อกกิ้งมีความสามารถในการทำนายตำแหน่งการจัดวางตัวของสารยับยั้งอีฟาวิเรนซ์ในโปรรงการจับของเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 ทั้งชนิดดั้งเดิมและชนิดกลายพันธุ์ได้สอดคล้องกับผลที่ได้จากการศึกษาโครงสร้างผลึกทางเอ็กซ์เรย์โดยให้ค่า RMSD น้อยกว่า

1.0 อังสตรอม ดังนั้นการคำนวณโมเลกุลาร์ด็อกกิ้งจึงมีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการทำนายตำแหน่ง และการจัดวางตัวของสารอนุพันธ์อีฟาเวรีนซ์ในโพรงการจับของเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 ที่ยังไม่มีการศึกษาข้อมูลทางโครงสร้างผลึกทางอิเล็กทรอนิกส์มาก่อน และผลที่ได้จากการคำนวณโมเลกุลาร์ด็อกกิ้งนี้สามารถอธิบายถึงอันตรกิริยาที่สำคัญของสารยับยั้งอีฟาเวรีนซ์ และสารอนุพันธ์อีฟาเวรีนซ์ในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 ทั้งชนิดดั้งเดิมและชนิดกลายพันธุ์ (K103N) ได้ นอกจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอันตรกิริยาที่ได้จากการคำนวณโมเลกุลาร์ด็อกกิ้งและค่ากัมมันตภาพในการยับยั้งที่ได้จากการทดลองสามารถทำให้เข้าใจถึงอันตรกิริยาที่สำคัญของตัวยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1




(ก)




(ข)

รูปที่ 6 การซ้อนทับคอนฟอร์เมชันของสารยับยั้งอีฟาเวรีนซ์ที่ได้จากการด็อกกิ้งและคอนฟอร์เมชันที่ได้จากโครงสร้างผลึก X-ray ในโพรงการจับของเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 ทั้งชนิดดั้งเดิม (ก) และชนิดกลายพันธุ์ (K103N) (ข)




(ก)




(ข)

รูปที่ 7 คอนฟอร์เมชันของสารยับยั้งอีฟาเวรีนซ์ที่แสดงกัมมันตภาพสูงที่สุดในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 ชนิดดั้งเดิมในโพรงการจับของเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 ทั้งชนิดดั้งเดิม (ก) และชนิดกลายพันธุ์ (K103N) (ข) ที่ได้จากการด็อกกิ้ง




(f)



(۷)

รูปที่ 8 คอนฟอร์เมชันของสารยับยั้งอีฟาริเรนซ์ที่แสดงกัมมันตภาพสูงที่สุดในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ เอชไอวี-1 ชนิดกลายพันธุ์ (K103N) ในโครงการจับของเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 ทั้งชนิดดั้งเดิม (ก) และชนิดกลายพันธุ์ (K103N) (ข) ที่ได้จากการ docking



(f)

(v)

รูปที่ 9 การซ้อนทับของคอนฟอร์เมชันของสารอนุพันธ์ฟีวารีเรนซ์จำนวน 56 สารประกอบ ที่ได้จากการดักกิ้งในโพรงการจับของเอนไซม์การถ่ายแบบเอสไอวี-1 ทั้งชนิดดั้งเดิม (ก) และชนิดกลายพันธุ์(K103N) (ข)


3. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและกัมมันตภาพในเชิงสามมิติ

(Three- dimensional quantitative structure activity relationship, 3D-QSAR)


3.1 วิธีการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบสนามของโมเลกุล

(Comparative Molecular Fields Analysis, CoMFA)

สำหรับผลการศึกษาคอมพานั้นจะแสดงอันตรกิริยาของตัวยับยั้งที่มีผลต่อเอนไซม์การถ่ายแบบ 2 แบบคือ อันตรกิริยาสเตอริก และอันตรกิริยาอิเล็กโตรสแตติก โดยจากแบบจำลองคอมพาที่ดีที่สุดจะนำเอาค่าสัมประสิทธิ์ของตัวอธิบายในสมการแสดงเป็นภาพคอนทัวร์ positive coefficient contour map หมายถึงควรเพิ่มอันตรกิริยาในโครงสร้างโมเลกุลเพื่อเพิ่มความสามารถในการยับยั้ง และ negative coefficient contour map หมายถึง ควรลดอันตรกิริยาในโครงสร้างโมเลกุลเพื่อเพิ่มความสามารถในการยับยั้ง ในการศึกษาการเสนออันตรกิริยาของโครงสร้างโมเลกุล โครงสร้างในโมเลกุลนั้นจะแสดงดังรายละเอียดต่อไปนี้ Green coefficient contour map แสดงถึงการเพิ่มอันตรกิริยาแบบสเตอริกในโมเลกุลจะช่วยเพิ่มความสามารถในการยับยั้ง Yellow coefficient contour map แสดงถึงการลดอันตรกิริยาแบบสเตอริกในโมเลกุลจะช่วยเพิ่มความสามารถในการยับยั้ง Red coefficient contour map แสดงถึงการเพิ่มการกระจายอิเล็กตรอนในโมเลกุลจะช่วยเพิ่มความสามารถในการยับยั้ง Blue coefficient contour map แสดงถึงการลดการกระจายอิเล็กตรอนโมเลกุลจะช่วยเพิ่มความสามารถในการยับยั้ง ในการพิจารณาแผนภาพคอนทัวร์คอมพา (รูปที่ 10) ได้นำเอาโครงสร้างของเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 บริเวณโพรงการจับที่เกิดการยับยั้งมาพิจารณาเพื่อเป็นส่วนช่วยเพิ่มความเข้าใจในการเกิดอันตรกิริยาและการออกแบบโมเลกุลของตัวยับยั้งเอนไซม์ของตัวยับยั้ง เอชไอวี-1 ที่มีกัมมันตภาพสูงต่อไป



(ก)



(ข)


ภาพที่ 10 แผนภาพคอนทัวร์ที่ได้จากการศึกษาโดยระเบียบวิธี CoMFA ระหว่างตัวยับยั้ง efavirenz กับเอนไซม์การถ่ายแบบชนิดดั้งเดิม (WT) (ก) และชนิดกลายพันธุ์ (K103N) (ข)

3.2 วิธีวิเคราะห์เปรียบเทียบดัชนีความเหมือนเชิงโมเลกุล


(Comparative Similarity Index Analysis, CoMSIA)

ผลการศึกษาคอมเชียนั้นจะแสดงอันตรกิริยาของตัวยับยั้งที่มีผลต่อเอนไซม์การถ่ายแบบ 5 ชนิดคือ อันตรกิริยาสเตอริก อันตรกิริยาอิเล็กโตรสแตติก อันตรกิริยาไฮโดรโฟบิก อันตรกิริยาการให้โปรตอนและอันตรกิริยาการรับโปรตอน ในทำนองเดียวกับการศึกษาคอมพาสสามารถที่จะนำเอาค่าสัมประสิทธิ์ของตัวอธิบายในสมการแสดงเป็นภาพ คอนทัวร์ positive coefficient contour map หมายถึงควรเพิ่มอันตรกิริยาในโครงสร้างโมเลกุลเพื่อเพิ่มความสามารถในการยับยั้ง และ negative coefficient contour map หมายถึง ควรลดอันตรกิริยาในโครงสร้างโมเลกุลเพื่อเพิ่มความสามารถในการยับยั้ง ในการศึกษานี้การเสนออันตรกิริยาของโครงสร้างโมเลกุล โครงสร้างในโมเลกุลนั้นจะแสดงดังรายละเอียดต่อไปนี้

Green coefficient contour map แสดงถึงการเพิ่มอันตรกิริยาแบบสเตอริกในโมเลกุลจะช่วยเพิ่มความสามารถในการยับยั้ง Yellow coefficient contour map แสดงถึงการลดอันตรกิริยาแบบสเตอริกในโมเลกุลจะช่วยเพิ่มความสามารถในการยับยั้ง Red coefficient contour map แสดงถึงการเพิ่มการกระจายอิเล็กตรอนในโมเลกุลจะช่วยเพิ่มความสามารถในการยับยั้ง Blue coefficient contour map แสดงถึงการลดการกระจายอิเล็กตรอนโมเลกุลจะช่วยเพิ่มความสามารถในการยับยั้ง Magenta coefficient contour map แสดงถึงการเพิ่มความเป็นไฮโดรโฟบิกในโมเลกุลจะช่วยเพิ่มความสามารถในการยับยั้ง White coefficient contour map แสดงถึงการลดความเป็นไฮโดรโฟบิกในโมเลกุลจะช่วยเพิ่มความสามารถในการยับยั้ง Cyan coefficient contour map แสดงถึงการเพิ่มความสามารถในการให้โปรตอนในโมเลกุลจะช่วยเพิ่มความสามารถในการยับยั้ง Purple coefficient contour map แสดงถึงการลดความสามารถในการให้โปรตอนในโมเลกุลจะช่วยเพิ่มความสามารถในการยับยั้ง Orange coefficient contour map แสดงถึงการเพิ่มความสามารถในการรับโปรตอนในโมเลกุลจะช่วยเพิ่มความสามารถในการยับยั้ง White coefficient contour map แสดงถึงการลดความสามารถในการรับโปรตอนในโมเลกุลจะช่วยเพิ่มความสามารถในการยับยั้ง แผนภาพคอนทัวร์คอมเชียนของสนาม สเตอริก อิเล็กโตรสแตติก ไฮโดรโฟบิก การให้โปรตอน และการรับโปรตอนในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบชนิดดั้งเดิมและชนิดกลายพันธุ์ (K103N) ได้นำเอาโครงสร้างของเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 บริเวณโพรงการจับที่เกิดการยับยั้งมาพิจารณาเพื่อเป็นส่วนช่วยเพิ่มความเข้าใจในการเกิดอันตรกิริยาและการออกแบบโมเลกุลของตัวยับยั้งเอนไซม์ของตัวยับยั้ง เอชไอวี-1 ที่มีกัมมันตภาพสูงต่อไป (แสดงดังรูป 11-13)




(ก)




(ข)

ภาพที่ 11 แผนภาพคอนทัวร์สเตอริกและ อิเล็กโตรสแตติก ที่ได้จากการศึกษาโดยระเบียบวิธี CoMSIA ระหว่างตัวยับยั้ง efavirenz กับเอนไซม์การถ่ายแบบชนิดดั้งเดิม (WT) (ก) และชนิดกลายพันธุ์ (K103N) (ข)




(ก)




(ข)

ภาพที่ 12 แผนภาพคอนทัวร์ไฮโดรโฟบิก ที่ได้จากการศึกษาโดยระเบียบวิธี CoMSIA ระหว่างตัวยับยั้ง efavirenz กับเอนไซม์การถ่ายแบบชนิดดั้งเดิม (WT) (ก) และชนิดกลายพันธุ์ (K103N) (ข)



(ก)




(ข)

ภาพที่ 13 แผนภาพคอนทัวร์สนามการให้โปรตอนและการรับโปรตอนที่ได้จากการศึกษาโดยระเบียบวิธี CoMSIA ระหว่างตัวยับยั้ง efavirenz กับเอนไซม์การถ่ายแบบชนิดดั้งเดิม (WT) (ก) และชนิดกลายพันธุ์ (K103N) (ข)

เมื่อพิจารณาแผนภาพคอนทัวร์ที่ได้จากการศึกษาทาง QSAR ทุกวิธีร่วมกับโปรแกรมไฮโดรโฟบิกซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดอันตรกิริยาระหว่างตัวยับยั้งกับเอนไซม์พบว่าข้อมูลที่ได้จากทุกแบบจำลองชี้ให้เห็นอย่างเด่นชัดถึงความแตกต่างของโครงสร้างที่สำคัญของตัวยับยั้งที่ใช้ในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบที่แตกต่างกัน นอกจากนั้นแล้วผลการวิเคราะห์ที่ได้จากทุกวิธีสอดคล้องกันทั้งยังสอดคล้องกับข้อมูลจากการทดลองด้านการจับกันระหว่างสารยับยั้งและเอนไซม์ ทำให้สามารถอธิบายความสำคัญของอันตรกิริยาแบบสเตอริกและไฮโดรโฟบิกในโครงสร้างตัวยับยั้งกับโปรแกรมไฮโดรโฟบิก ของเอนไซม์ซึ่งประกอบด้วย amino acid residues โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่ตำแหน่ง Lysine 103 ได้เป็นอย่างดี และเมื่อ amino acid ในตำแหน่งดังกล่าวเกิดการกลายพันธุ์จาก Lysine เป็น Asparagine จึงทำให้อันตรกิริยาในส่วนของ steric electrostatic hydrophobic H-donor และ H-acceptor ระหว่าง ตัวยับยั้งกับเอนไซม์ในบริเวณนี้เปลี่ยนไป และอาจทำให้ตัวยับยั้งไม่สามารถแสดงกัมมันตภาพที่ดีได้ ซึ่งผลการศึกษานี้ นับเป็นการพื้นฐานสำคัญที่สามารถอธิบายอันตรกิริยาที่แตกต่างกันของตัวยับยั้งที่มีต่อเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 ที่ไม่มีการกลายพันธุ์ (WT) และมีการกลายพันธุ์ (K103N) ได้โดยการศึกษาทางโมเลคิวลาร์โมเดลลิ่ง ซึ่งเป็นประโยชน์ในการออกแบบสารยับยั้งในกลุ่มอนุพันธ์ efavirenz ที่คาดว่าจะมีกัมมันตภาพสูงขึ้นในการยับยั้งต่อเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 ที่มีการกลายพันธุ์ (K103N) ต่อไป

เมื่อพิจารณาผลที่ได้จากการศึกษาทาง structure-based drug design โดยใช้ molecular docking ประกอบกับผลที่ได้จากการศึกษาทาง ligand-based drug design โดยใช้วิธี CoMFA และ CoMSIA ทำให้ได้โครงสร้างที่สำคัญของตัวยับยั้งในกลุ่มสารอนุพันธ์อีฟาเวียร์เนซ ในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 ชนิดดั้งเดิมและชนิดการกลายพันธุ์ (K103N) สรุปได้ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 โครงสร้างที่สำคัญของตัวยับยั้งในกลุ่มสารอนุพันธ์อีฟาเวียร์เนซ ในการปรับเปลี่ยน หมู่แทนที่ในตำแหน่งต่างๆในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 ชนิดดั้งเดิมและชนิดการกลายพันธุ์ (K103N)



หมู่แทนที่	การยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ เอชไอวี-1 ชนิดดั้งเดิม	การยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ เอชไอวี-1 ชนิดการกลายพันธุ์ (K103N)
C5	hydrophobic group	steric, hydrophilic group
C6	-The positive charge group - H-donor group - Hydrogen bond interaction	-The negative charge group - Van der waal interaction
R	The bulky group, electron rich, hydrophobic group	-The bulky group but not too large size -electron acceptor group
Z	- H-acceptor group - electron rich group	-H-donor group - H- π interaction

ซึ่งผลที่ได้จากการวิเคราะห์นี้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญการใช้ในชี้แนะการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสารตัวใหม่ในกลุ่ม efavirenz ที่มีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 ชนิดดั้งเดิมและชนิดกลายพันธุ์ (K103N) ได้ต่อไป

4. การออกแบบโมเลกุลของตัวยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ HIV-1 ในกลุ่มสารอนุพันธ์อีฟาเวียร์

แบบจำลองที่ได้จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับกัมมันตภาพด้วยวิธี COMFA และ COMSIA มีความน่าเชื่อถือในทางสถิติ และมีประสิทธิภาพในการทำนายสูง จึงนับว่าเป็นแบบจำลองที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวอธิบายโครงสร้างกับกัมมันตภาพได้เป็นอย่างดี แผนภาพคอนทัวร์ที่ได้จากแบบจำลองจากวิธี COMFA ซึ่งให้เห็นถึงความสำคัญของอันตรกิริยาสเตอริก และอิเล็กโตรสแตติกของโมเลกุลที่มีต่อกัมมันตภาพ และผลจากแบบจำลองวิธี COMSIA ให้ข้อมูลที่เพิ่มความเข้าใจในความต้องการทางสนามสเตอริก สนามอิเล็กโตรสแตติก สนามไฮโดรโฟบิก รวมทั้งความสามารถในการให้และรับโปรตอนของสารประกอบที่ใช้ในการจับกับเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1

เมื่อพิจารณาแผนภาพคอนทัวร์ที่ได้จากการศึกษาทุกวิธีร่วมกับ Hydrophobic pocket ซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดอันตรกิริยาระหว่างการยับยั้งเอนไซม์พบว่า เป็นข้อมูลทางโครงสร้างที่สำคัญที่ช่วยในการชี้แนะในการออกแบบโมเลกุลตัวยับยั้งในกลุ่มอนุพันธ์อีฟาเวียร์ตัวใหม่ที่มีกัมมันตภาพสูงในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 โดยเฉพาะชนิดกลายพันธุ์ (K103N)

ในการออกแบบโมเลกุลชนิดใหม่นั้น เริ่มจากการพิจารณาปรับเปลี่ยนหมู่แทนที่ตำแหน่ง X R และ Z ของสารประกอบอีฟาเวียร์ที่ 46 จากตารางที่ 1 (สารที่มีค่ากัมมันตภาพในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบชนิดดั้งเดิมสูงที่สุด) โดยอาศัยหลักการโครงสร้างคล้ายคลึง (Bioisosterism) ทำให้สามารถออกแบบโครงสร้างได้หลายแบบ ได้โครงสร้างสารยับยั้งตัวใหม่ในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 ชนิดดั้งเดิมจำนวน 33 โครงสร้าง และชนิดกลายพันธุ์จำนวน 41 โครงสร้าง ดังแสดงในตารางที่ 3 และตารางที่ 4 ตามลำดับ และพบว่า สารอนุพันธ์อีฟาเวียร์ WT-D27 – WT-D33 ให้ค่ากัมมันตภาพ ($\text{Log}(1/C)$) ที่ได้จากคำนวณสูงสุดในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 ชนิดดั้งเดิมดังแสดงในตารางที่ 3 และสารอนุพันธ์อีฟาเวียร์ MT-D02, MT-D04, MT-D05, MT-D09 – MT-D11, MT-D13, MT-D17, MT-D21, MT-D31, MT-D32, MT-D34 – MT-D39 และ MT-D41 แสดงค่ากัมมันตภาพที่ได้จากคำนวณสูงสุดในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 ชนิดกลายพันธุ์ ดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 3 โครงสร้างและค่าสัมพันธภาพในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 ชนิดดั้งเดิมที่ได้จากการคำนวณของสารอนุพันธ์อีฟาเวเรนซ์ที่ได้ออกแบบขึ้นมาใหม่

สารอนุพันธ์ อีฟาเวเรนซ์	X	R	Z	Log (1/C)	
				CoMFA	CoMSIA
WT-D01	5-F	CC-cyclopropyl-R ₁ -CH ₃	NH	8.71	8.57
WT-D02	5-F	CC-cyclopropyl-R ₂ -CH ₃	NH	8.91	8.69
WT-D03	5-F	CC-cyclopropyl-R ₃ -CH ₃	NH	8.44	8.63
WT-D04	5-F	CC-cyclopropyl-R ₄ -CH ₃	NH	8.63	8.74
WT-D05	5-F	CC-cyclopropyl-R ₂ -CH ₂ CH ₃	NH	8.75	8.67
WT-D06	5-F	CC-cyclopropyl-R ₂ -CH ₂ OH	NH	8.86	8.62
WT-D07	5-F	CC-cyclopropyl-R ₂ -CH ₂ CN	NH	8.81	8.67
WT-D08	5-F	CC-cyclopropyl-R ₁ -OH	NH	8.78	8.81
WT-D09	5-F	CC-cyclopropyl-R ₂ -OH	NH	8.84	8.66
WT-D10	5-F	CC-cyclopropyl-R ₃ -OH	NH	8.72	8.92
WT-D11	5-F	CC-cyclopropyl-R ₄ -OH	NH	8.74	8.77
WT-D12	5-F	CC-cyclopropyl-R ₂ -CH ₂ OCH ₃	NH	8.87	8.54
WT-D13	5-F	CC-cyclopropyl-R ₂ -Cl	NH	8.92	8.73
WT-D14	5-F	CC-cyclopropyl-R ₂ -F	NH	8.86	8.74
WT-D15	5-F	CC-cyclopropyl-R ₂ -CN	NH	8.91	8.68
WT-D16	5-OH	CC-cyclopropyl	NH	8.86	8.58
WT-D17	5-CN	CC-cyclopropyl	NH	8.75	8.54
WT-D18	5-CH ₃	CC-cyclopropyl	NH	8.69	8.62
WT-D19	5-OCH ₂ F	CC-cyclopropyl	NH	8.81	8.66
WT-D20	5-OCHF ₂	CC-cyclopropyl	NH	8.81	8.64
WT-D21	5-OCF ₃	CC-cyclopropyl	NH	8.81	8.63
WT-D22	5-OCH ₃	CC-cyclopropyl	NH	8.82	8.58
WT-D23	5-CH ₃	CC-cyclopropyl	NH	8.74	8.64
WT-D24	5-OH	CC-cyclopropyl-R ₂ -CH ₃	NH	8.91	8.59
WT-D25	5-OCH ₂ F	CC-cyclopropyl-R ₂ -CH ₃	NH	8.86	8.58
WT-D26	5-OH	CC-cyclopropyl-R ₂ -Cl	NH	8.92	8.62
WT-D27	5-F	CC-cyclopropyl-R₂-CH₃	O	9.09	8.87

WT-D28	5-F	CC-cyclopropyl-R ₂ -Cl	O	9.10	8.91
WT-D29	5-F	CC-cyclopropyl-R ₂ -CN	O	9.08	8.86
WT-D30	5-F	CC-cyclopropyl	O	9.04	8.86
WT-D31	5-OH	CC-cyclopropyl-R ₂ -CH ₃	O	9.09	8.77
WT-D32	5-OH	CC-cyclopropyl-R ₂ -Cl	O	9.10	8.80
WT-D33	5-OH	CC-cyclopropyl	O	9.04	8.76

ตารางที่ 4 โครงสร้างและค่ากัมมันตภาพในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 ชนิด กลายพันธุ์ (K103N) ที่ได้จากการคำนวณของสารอนุพันธ์อีฟาเวเรนซ์ที่ได้ออกแบบขึ้นมาใหม่

สารอนุพันธ์ อีฟาเวเรนซ์	X	R	Z	Log (1/C)	
				CoMFA	CoMSIA
MT-D01	5-OMe, 6-Cl	CC-cyclopropyl-R ₂ -CH ₃	NH	8.19	8.06
MT-D02	5-OMe, 6-Cl	CC-cyclopropyl-R₄-CH₃	NH	8.29	8.04
MT-D03	5-OMe, 6-Cl	CC-cyclopropyl-R ₂ -CH ₂ CH ₃	NH	8.18	8.08
MT-D04	5-OMe, 6-Cl	CC-cyclopropyl-R₄-CH₂CH₃	NH	8.25	8.04
MT-D05	5-OMe, 6-Cl	CC-cyclopropyl-R₂,R₄-CH₃	NH	8.28	8.02
MT-D06	5-OMe, 6-Cl	CC-cyclopropyl-R ₂ -OCH ₃	NH	8.17	7.81
MT-D07	5-OMe, 6-Cl	CC-cyclopropyl-R ₄ -OCH ₃	NH	8.14	7.98
MT-D08	5-OMe, 6-Cl	CC-cyclopropyl-R ₂ -Cl	NH	8.19	8.06
MT-D09	5-OMe, 6-Cl	CC-cyclopropyl-R₄-Cl	NH	8.29	8.02
MT-D10	5-OMe, 6-Cl	CC-cyclopropyl-R₂,R₄-CH₃, Cl	NH	8.29	8.11
MT-D11	5-OMe, 6-Cl	CC-cyclopropyl-R₄-CN	NH	8.29	8.00
MT-D12	5-OMe, 6-Cl	CC-cyclopropyl-R ₂ -CN	NH	8.19	7.96
MT-D13	5-OCH₂F, 6-Cl	CC-cyclopropyl	NH	8.28	8.01
MT-D14	5-OCHF ₂ , 6-Cl	CC-cyclopropyl	NH	8.19	8.08
MT-D15	5-OCF ₃ , 6-Cl	CC-cyclopropyl	NH	8.19	8.08
MT-D16	5-CH ₂ CN, 6-Cl	CC-cyclopropyl	NH	8.09	7.09
MT-D17	5-CH₂CH₃, 6-Cl	CC-cyclopropyl	NH	8.28	8.07
MT-D18	5-CH ₂ CH ₂ F, 6-Cl	CC-cyclopropyl	NH	8.18	8.04
MT-D19	5-CH ₂ CHF ₂ , 6-Cl	CC-cyclopropyl	NH	8.17	8.11

MT-D20	5-CH ₂ CF ₃ , 6-Cl	CC-cyclopropyl	NH	8.16	8.18
MT-D21	5-CH₃, 6-Cl	CC-cyclopropyl	NH	8.28	7.90
MT-D22	5-CH ₂ F, 6-Cl	CC-cyclopropyl	NH	8.05	7.86
MT-D23	5-CHF ₂ , 6-Cl	CC-cyclopropyl	NH	8.05	7.88
MT-D24	5-CF ₃ , 6-CH ₂ F	CC-cyclopropyl	NH	8.05	7.95
MT-D25	5-OMe, 6-CN	CC-cyclopropyl	NH	8.20	7.92
MT-D26	5-OMe, 6-CH ₃	CC-cyclopropyl	NH	8.09	7.95
MT-D27	5-OMe, 6-CH ₂ F	CC-cyclopropyl	NH	8.09	7.87
MT-D28	5-OMe, 6-CHF ₂	CC-cyclopropyl	NH	8.09	7.90
MT-D29	5-OMe, 6-CF ₃	CC-cyclopropyl	NH	8.09	8.06
MT-D30	5-OMe, 6-OH	CC-cyclopropyl	NH	8.06	7.78
MT-D31	5-OCH₂F, 6-CN	CC-cyclopropyl-R₄-CH₃	NH	8.27	8.02
MT-D32	5-CH₂CH₃, 6-CN	CC-cyclopropyl-R₄-CH₃	NH	8.29	8.07
MT-D33	5-CH ₃ , 6-CN	CC-cyclopropyl-R ₄ -CH ₃	NH	8.09	7.91
MT-D34	5-OCH₂F, 6-Cl	CC-cyclopropyl-R₄-CH₃	NH	8.28	8.07
MT-D35	5-CH₂CH₃, 6-Cl	CC-cyclopropyl-R₄-CH₃	NH	8.30	8.13
MT-D36	5-CH₃, 6-Cl	CC-cyclopropyl-R₄-CH₃	NH	8.33	7.97
MT-D37	5-OMe, 6-CN	CC-cyclopropyl-R₄-CH₃	NH	8.28	7.99
MT-D38	5-OCH₂F, 6-CN	CC-cyclopropyl-R₄-Cl	NH	8.28	7.99
MT-D39	5-CH₂CH₃, 6-CN	CC-cyclopropyl-R₄-Cl	NH	8.30	8.05
MT-D40	5-CH ₃ , 6-CN	CC-cyclopropyl-R ₄ -Cl	NH	8.10	7.85
MT-D41	5-OMe, 6-CN	CC-cyclopropyl-R₄-Cl	NH	8.29	7.89

บทที่ 5

สรุปและวิจารณ์

ได้ทำการศึกษาด้าน computer-aided molecular design โดยใช้การคำนวณเคมีควอนตัมในการศึกษาคอนฟอร์เมชันของสารอนุพันธ์ efavirenz และสร้างแผนภาพพลังงานศักย์ของโมเลกุลเพื่ออธิบายสมบัติทางโครงสร้างที่สัมพันธ์กับกัมมันตภาพในการยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 RT ผลที่ได้ทำให้ เข้าใจถึงคอนฟอร์เมชันที่เป็นไปได้ และช่วงของความยืดหยุ่นทางโครงสร้าง ของ สารอนุพันธ์อีฟาเวเรนซ์ที่สัมพันธ์กับกัมมันตภาพของสารอนุพันธ์ได้เป็นอย่างดี และได้ใช้วิธีการออกแบบโครงสร้างของสารอนุพันธ์อีฟาเวเรนซ์ 2 วิธี คือวิธี structure based drug design ซึ่งใช้วิธีการคำนวณ molecular docking ในการศึกษาอันตรกิริยาระหว่างสารยับยั้งและโพรงการจับ (binding pocket) ของเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 ทั้งชนิดดั้งเดิม (WT) และชนิดกลายพันธุ์ (K103N) และ ligand-based drug design โดยใช้ระเบียบวิธี 3D-QSAR คือ วิธีวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบสนามโมเลกุล และ วิธีการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบดัชนีความเหมือนเชิงโมเลกุลในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวอธิบายโครงสร้างคือสนามสเตอริก สนามอิเล็กทรอนิกส์ สนามไฮโดรโฟบิกและความสามารถในการให้และรับโปรตอนของสารประกอบที่ใช้ในการจับกับเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 และค่ากัมมันตภาพในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 ได้เป็นอย่างดี เมื่อวิเคราะห์ผลการศึกษาที่ได้จากทุกวิธีร่วมกับ Hydrophobic pocket ซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดอันตรกิริยาระหว่างการยับยั้งเอนไซม์พบว่า ข้อมูลที่ได้จากแบบจำลองชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความแตกต่างของโครงสร้างที่สำคัญของการยับยั้งที่ใช้ในการถ่ายแบบเอชไอวี-1 ชนิดดั้งเดิมและชนิดกลายพันธุ์ (K103N) นอกจากนั้นแล้วผลการวิเคราะห์ที่ได้จากทุกวิธีสอดคล้องกัน และสอดคล้องกับข้อมูลจากการทดลองด้านการจับกันระหว่างสารยับยั้งและเอนไซม์ ข้อมูลที่ได้เป็นพื้นฐานทำให้เกิดความเข้าใจและสามารถอธิบายอันตรกิริยาสำคัญระหว่างตัวยับยั้งและเอนไซม์ รวมทั้งเป็นข้อมูลทางโครงสร้างที่สำคัญที่ใช้ในการออกแบบโมเลกุลตัวยับยั้งในกลุ่มอนุพันธ์อีฟาเวเรนซ์ตัวใหม่ที่มีกัมมันตภาพสูงขึ้นในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 ชนิดดั้งเดิมและชนิดกลายพันธุ์ (K103N)

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย

1. ผลการวิจัยนับเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญที่ช่วยในการศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของสารยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 และสามารถอธิบายอันตรกิริยาสำคัญระหว่างสารยับยั้งในกลุ่มอนุพันธ์อีฟาเวเรนซ์และเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 ชนิดดั้งเดิมและชนิดกลายพันธุ์ (K103N) ซึ่งการศึกษาและการทดลองในห้องปฏิบัติการในระดับโมเลกุลเป็นไปได้ยาก

2. ผลการวิจัยจะเป็นแนวทางที่สำคัญในการออกแบบโครงสร้างของสารยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 ชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเอนไซม์ที่มีการกลายพันธุ์ ซึ่งนับว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสารยับยั้งเพื่อใช้เป็นยาต่อไป
3. เป็นการนำความรู้ทางเคมีคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในทางเภสัชเคมี
4. เป็นการพัฒนางานวิจัยขั้นพื้นฐานและนำไปสู่การวิจัยประยุกต์ได้ในอนาคต
5. มีผลงานเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
6. มีผลงานวิจัยตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ

ศักยภาพในการพัฒนาไปสู่ภาคอุตสาหกรรม

งานวิจัยด้านการจำลองแบบโมเลกุลโดยวิธีเคมีคอมพิวเตอร์นับเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยลดขั้นตอนประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการสังเคราะห์สารในกระบวนการพัฒนายาในภาคอุตสาหกรรม ได้เป็นอย่างมาก ผลจากการศึกษาวิจัยนี้จะนำไปสู่การสังเคราะห์สารโมเลกุลใหม่ที่ได้ออกแบบโครงสร้างไว้แล้ว และจากนั้นนำไปทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 และพัฒนาเป็นตัวยาในลำดับต่อไป การร่วมมือกันทางภาครัฐบาลจากกลุ่มนักวิจัยศักยภาพสูงที่มีในประเทศไทยจากหลายสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้าน เคมี ฟิสิกส์ ชีวเคมี เภสัชเคมี การแพทย์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยเน้นทำวิจัยในกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน รวมถึงการได้รับการสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม จะทำให้ความเป็นไปได้ในการพัฒนายารักษาโรคเอดส์เกิดขึ้นในประเทศไทยได้

บทที่ 6

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง

- Barreca, M.L. aA. Carotti, bA. Carrieri, bA. Chimirri, A.M. Monforte, C.M. Pellegrini and aA. Rao. "Comparative Molecular Field Analysis (CoMFA) and Docking Studies of Non-nucleoside HIV-1 RT Inhibitors (NNIs)" *Bioorganic & Medicinal Chemistry*. 7 : 2283-2292 ; 1999.
- Chen, H.F. B.T. Fan, C.Y. Zhao, L. Xie, C.H. Zhao, T. Zhou, K.H. Lee, G. Allaway. "Computational Studies and Drug Design for HIV-1 Reverse Transcriptase Inhibitors of 3',4'-di-O-(S)-Camphanoyl-(+)-cis-Khellactone (DCK) Analogs." *Journal of Computer-Aided Molcelar Design*. 19(4) : 243-58 ; 2005.
- Chen, H.F., X.J. Yao, Q. Li, S.G. Yuan, A. Panaye, J.P. Doucet and B. Fan. "Comparative Study of Nonnucleoside Inhibitors with HIV-1 Reverse Transcriptase Based on 3D-QSAR and Docking." *SAR and QSAR in Environmental Research*. 14(5-6) : 455-474 ; 2003.
- Cocuzza, A.J., D.R. Chidester, B.C. Cordova, S. Jeffrey, R.L. Parsons, L.T. Bacheler, S. Erickson-Viitanen, G.L. Trainor , S.S. Ko. "Synthesis and Evaluation of Efavirenz (Sustiva) Analogues as HIV-1 Reverse Transcriptase Inhibitors: Replacement of the Cyclopropylacetylene Side Chain." *Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters*. 11(9) : 1177-9 ; 2001.
- Corbett, J.W., S.S. Ko, J.D. Rodgers, L.A. Gearhart, N.A. Magnus, L.T. Bacheler, S. Diamond, S. Jeffrey, R.M. Klabe, B.C. Cordova, S. Garber, K. Logue, G.L. Trainor, P.S. Anderson and S.K. Erickson-Viitanen. "Inhibition of Clinically Relevant Mutant Variants of HIV-1 by Quinazolinone non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors." *Journal of Medicinal Chemistry*. 43(10) : 2019-30 ; 2000.
- Corbett, J.W., S. Pan, J.A. Markwalder, B.C. Cordova, R.M. Klabe, S. Garber, J.D. Rodgers and S.K. Erickson-Viitanen. "3,3a-Dihydropyrano[4,3,2-de]quinazolin-2(1H)-ones are Potent Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors" *Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters*. 11 : 211-214 ; 2001.

- Font, M., A. Monge, I. Ruiz and B. Heras. "Structure-activity Relationships in Quinoline Reissert Derivatives with HIV-1 Reverse Transcriptase Inhibitory Activity." *Drug Des Discov.* 14(4) : 259-72 ; 1997.
- Hannongbua, S., K. Nivesanond, L. Lawtrakul, P. Pungpo and P. Wolschann. "3D-Quantitative Structure-Activity Relationships of HEPT Derivatives as HIV-1 Reverse Transcriptase Inhibitors, Based on Ab Initio Calculations." *Journal of Chemical Information and Computer Sciences.* 41(3) : 848-855 ; 2001.
- Hannongbua, S., P. Pungpo, J. Limtrakul and P. Wolschann. "Quantitative Structure-activity Relationships and Comparative Molecular Field Analysis of TIBO Derivatised HIV-1 Reverse Transcriptase Inhibitors." *Journal of Computer-Aided Molcelar Design.* 13(6) : 563-577 ; 1999.
- Hannongbua, S., S. Prasithichokekul and P. Pungpo. "Conformational Analysis of Nevirapine, a Non-Nucleoside HIV-1 Reverse Transcriptase Inhibitor, Based on Quantum Mechanical Calculations." *Journal of Computer-Aided Molcelar Design.* 15(11) : 997-1004 ; 2001.
- Hannongbua, S., V. Saen-oon, P. Pungpo and P. Wolschann. "Molecular Calculations on the Conformation of the HIV-1 Reverse Transcriptase Inhibitor (+)-(S)-4,5,6,7-Tetrahydro-8-Chloro-5-Methyl-6-(3-Methyl-2-Butenyl)-Imidazo[4,5,1-jk][1,4]Benzodiazepine-2(1H)-Thione (8-Chloro-TIBO)." *Monatshefte Chemie.* 132(10) : 1157-1169 ; 2001.
- Heeres, J., R.J. Marc, L. Koymans, F.D. Daeyaert, M. Vinkers, A. Van, J.A. Koen, E. Arnold, K. Das, A. Kilonda, G.J. Hoornaert, F. Compennolle, M. Cegla, R.A. Azzam, K. Andries, M. Bethune, H. Azijn, R. Pauwels, P.J. Lewi, P.A.J. Janssen. "Design, Synthesis, and SAR of a Novel Pyrazinone Series with Non-Nucleoside HIV-1 Reverse Transcriptase Inhibitory Activity." *Journal of Medicinal Chemistry.* 48(6) : 1910-1918 ; 2005.
- Hopkins, A.L., J. Ren, R.M. Esnouf, B.E. Willcox, E.Y. Jones, C. Ross, T. Miyasaka, T. Walker, H. Tanaka, D.K. Stammers and D.I. Stuart. "Complexes of HIV-1 Reverse Transcriptase with Inhibitors of the HEPT Series Reveal Conformational Changes Relevant to the Design of Potent Non-Nucleoside Inhibitors." *Journal of Medicinal Chemistry.* 39(8) : 1589-1600 ; 1996.
- Hsiou, Y. K. Das, J. Ding, A.D. Clark, Jr., J.P. Kleim, M. Rosner, I. Winkler, G. Riess, S.H. Hughes and E. Arnold. "Structures of Tyr188Leu Mutant and Wild-type HIV-1 Reverse Transcriptase Complexed with the Non-Nucleoside Inhibitor HBY 097:

- Inhibitor Flexibility is a Useful Design Feature for Reducing Drug Resistance.”
Journal of Molecular Biology. 284(2) : 313-23 ; 1998.
- Kalyan, D., C.D. Arthur, L.J. Paul, J. Heeres, R.J. Marc, L. Koymans, V.H. Maarten, D. Frederik, L.W. Donald, K.J. Michael, C. Bart, K.W. Robert, H.Y. Chih, Y. Hong, L.A. Mark, A. Koen, P. Rudi, B. Marie-Pierre, B.L. Paul, C. Patrick, H.H. Stephen, J.A.J. Paul and E. Arnold. “Roles of Conformational and Positional Adaptability in Structure-based Design of TMC125-R165335 (Etravirine) and Related Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors that are Highly Potent and Effective Against Wild-type and Drug-Resistant HIV-1 Variants.” Journal of Medicinal Chemistry. 47(10) : 2550-60 ; 2004.
- Kroeger, S., C.A. Rouzer, L.A. Taneyhill, N.A. Smith, S.H. Hughes, P.L. Boyer, P.A. Janssen, H. Moereels, L. Koymans, E. Arnold and et al. “Molecular Modeling Studies of HIV-1 Reverse Transcriptase Nonnucleoside Inhibitors: Total Energy of Complexation as a Predictor of Drug Placement and Activity.” The Protein Society. 4(10) : 2203-22 ; 1995.
- Lawtrakul, L., S. Hannongbua, A. Beyer And P. Wolschann. “Conformational Study of the HIV-1 Reverse Transcriptase Inhibitor 1-[(2-Hydroxyethoxy)Methyl]-6-(Phenylthio)Thymine (HEPT).” Biol Chem. 380(2) : 265-7 ; 1999.
- Markwalder, J.A., D.D. Christ, A. Mutlib, B.C. Cordova, R.M. Klabe, S.P. Seitz. “Synthesis and Biological Activities of Potential Metabolites of the non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor Efavirenz.” Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. 11(5) : 619-22 ; 2001.
- Martino, G.D., G.L. Regina, A.D. Pasquali, R. Ragno, A. Bergamini, C. Ciaprini, A. Sinistro, G. Maga, E. Crespan, M. Artico and R. Silvestri. “Novel 1-[2-(diarylmethoxy)Ethyl]-2-Methyl-5-Nitroimidazoles as HIV-1 Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors. A Structure-activity Relationship Investigation.” Journal of Medicinal Chemistry. 48 : 4378-4388 ; 2005.
- Medina-Franco, J.L., S. Rodriguez-Morales, C.J. Gordiano, A.H. Campos, J.J. Barberob and R. Castilloa. “Flexible Docking of Pyridinone Derivatives into the Non-Nucleoside Inhibitor Binding Site of HIV-1 Reverse Transcriptase.” Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. 12(23) : 6085-95 ; 2004.
- Medina-Franco, J.L., S. Rodriguez-Morales, C. Juarez-Gordiano, A. Hernandez-Campos and R. Castillo. “Docking-based CoMFA and CoMSIA Studies of Non-Nucleoside

- Reverse Transcriptase Inhibitors of the Pyridinone Derivative Type." *Journal of Computer-Aided Molecular Design*. 18(5) : 345-360 ; 2004.
- Mei, Y. X. He, Y. Xiang, W. Zhang and J.Z. Zhang. "Quantum Study of Mutational Effect in Binding of Efavirenz to HIV-1 RT." *Proteins*. 59(3) : 489-95 ; 2005.
- Patel, M., R.J. McHugh, Jr., B.C. Cordova, R.M. Klabe, S. Erickson-Viitanen and G.L. Trainor. And J.D. Rodgers. "Synthesis and Evaluation of Quinoxalinones as HIV-1 Reverse Transcriptase Inhibitors." *Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters*. 10(15) : 1729-31 ; 2000.
- Patel, M., R.J. McHugh, Jr., S.S Ko, B.C. Cordova, R.M. Klabe, S. Erickson-Viitanen and G.L. Trainor. "Synthesis and evaluation of benzoxazinones as HIV-1 reverse transcriptase inhibitors. Analogs of Efavirenz (SUSTIVA)." *Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters*. 9(22) : 3221-4 ; 1999.
- Patel, M., S.S Ko, R.J. McHugh, Jr., J.A. Markwalder, A.S. Srivastava, B.C. Cordova, R.M. Klabe, S. Erickson-Viitanen, G.L. Trainor and S.P. Seitz. "Synthesis and Evaluation of Analogs of Efavirenz (SUSTIVA) as HIV-1 Reverse Transcriptase Inhibitors." *Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters*. 9(19) : 2805-10 ; 1999.
- Pungpo, P. and S. Hannongbua. "Three-Dimensional Quantitative Structure-activity Relationships Study on HIV-1 Reverse Transcriptase Inhibitors in the Class of Dipyrindodiazepinone Derivatives, using Comparative Molecular Field Analysis." *J Mol Graphics & Modelling*. 18(6) : 581-590 ; 2000.
- Pungpo, P., S. Hannongbua and P. Wolschann. "Hologram Quantitative Structure-activity Relationships Investigations of Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors." *Curr Med Chem*. 10(17) : 1661-77 ; 2003.
- Ragno, R., A. Mai, G. Sbardella, M. Artico, S. Massa, C. Musiu, M. Mura, F. Marturana, A. Cadeddu and P.L. Colla. "Computer-aided Design, Synthesis, and Anti-HIV-1 Activity in Vitro of 2-Alkylamino-6-[1-(2,6-Difluorophenyl)Alkyl]-3,4-Dihydro-5-Alkylpyrimidin-4(3H)-Ones as Novel Potent Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors, also Active Against the Y181C Variant." *Journal of Medicinal Chemistry*. 47(4) : 928-34 ; 2004.
- Ragno, R., M. Artico, G.D. Martino, G.L. Regina, A. Coluccia, A.D. Pasquali and R. Silvestri. "Docking and 3-D QSAR Studies on Indolyl Aryl Sulfones. Binding Mode Exploration at the HIV-1 Reverse Transcriptase Non-Nucleoside Binding Site and Design of Highly Active N-(2-Hydroxyethyl)carboxamide and N-(2-

- Hydroxyethyl)carbohydrazide Derivatives.” *Journal of Medicinal Chemistry*. 48 : 213-223 ; 2005.
- Ranise, A., A. Spallarossa, S. Cesarini, F. Bondavalli, S. Schenone, O. Bruno, G. Menozzi, P. Fossa, L. Mosti, M.L. Colla, G. Sanna, M. Murreddu, G. Collu, B. Busonera, M.E. Marongiu, A. Pani, P.L. Colla and R. Loddo. “Structure-Based Design, Parallel Synthesis, Structure-Activity Relationship, and Molecular Modeling Studies of Thiocarbamates, New Potent Non-Nucleoside HIV-1 Reverse Transcriptase Inhibitor Isosteres of Phenethylthiazolylthiourea Derivatives.” *Journal of Medicinal Chemistry*. 48(11) : 3858-3873 ; 2005.
- Ren, J., J. Milton, K.L. Weaver, S.A. Short, D.I. Stuart and D.K. Stammers. “Structural Basis for the Resilience of Efavirenz (DMP-266) to Drug Resistance Mutations in HIV-1 Reverse Transcriptase.” *Structure*. 8(10) : 1089-94 ; 2000.
- Saenoon, S., S. Hannongbua and P. Wolschann. “Structural Flexibility of Non-Nucleoside HIV-1 Reverse Transcriptase Inhibitor: 9-CI TIBO as Explained by Potential Energy Surface and ¹³C and ¹H NMR Calculations, Based on ab initio and Density Functional Study.” *Journal of Chemical Information and Computer Sciences*. 43(5) : 1412-1422 ; 2003.
- Saparpakorn, P., S. Hannongbua and D. Rognan. “Design of Nevirapine Derivatives Insensitive to the K103N and Y181C HIV-1 Reverse Transcriptase Mutantsdagger” *SAR and QSAR in Environmental Research*. 17(2) : 183-94 ; 2006.
- Sudbeck, E.A., C. Mao, R. Vig, T.K. Venkatachalam, L. Tuel-Ahlgren and F.M. Uckun. “Structure-based Design of Novel Dihydroalkoxybenzyloxypyrimidine (DABO) Derivatives as Potent Non-Nucleoside Inhibitors of HIV Reverse Transcriptase.” *Book of Abstracts, 216th ACS National Meeting, Boston*. 1998.
- Vig, R., C. Mao, T.K. Venkatachalam, L. Tuel-Ahlgren, E.A. Sudbeck. and F.M. Uckun. “Rational Design and Synthesis of Phenethyl-5-Bromopyridyl Thiourea Derivatives as Potent Non-Nucleoside Inhibitors of HIV Reserve Transcriptase.” *Bioorganic & Medicinal Chemistry*. 6(10) : 1789-97 ; 1998.

ภาคผนวก

ผลงานวิจัย

1. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

1. **P.Pungpo**, A. Punkvang, P.Saparpakorn and S. Hannongbua, Understanding the interaction and the structure–activity correlation of HIV-1 RT inhibitors of efavirenz derivatives and WT and K103N HIV-1 RT using molecular docking, 3D-QSAR approaches and quantum chemical calculations, *accepted for publication as a chapter in Drug design perspective trends*, Nova publisher, USA.
2. Beyer, A., Lawtrakul, L., **Pungpo, P.** and Wolschann, P. Structural Aspects of Non-nucleoside HIV-1 Reverse Transcriptase Inhibition, *Current Computer Aided Drug Design*, 2007, 3, 341-352.
3. Recent advances in NNRTI design : Computer aided molecular design approaches, submitted for publication.
4. Insight into the binding Interactions and structural resilience of efavirenz derivatives in WT and K103N HIV-1 RT, based on the molecular docking calculations and conformational Analysis , manuscript preparation.

2. ผลงานวิชาการอื่น ๆ (เช่น Proceeding ตำรา ฯลฯ)

การเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

1. **Pungpo, P.**, Pankwang, O., Saparpakorn, P., Wolschann, P. and Hannongbua, S. Theoretical investigations on potent HIV-1 reverse transcriptase inhibitors of efavirenz analogues by using conformational analysis, molecular docking and 3D-QSAR studies, *the XIIth International Congress of Quantum Chemistry (XII-ICQC2006)*, 21-26 May, 2006, Kyoto, Japan.
2. **Pungpo P.**, Saparpakorn, P., Wolschann, P. and Hannongbua, S., Computer-aided inhibitor design of highly potent HIV-1 RT inhibitors: 3D QSAR studies and molecular

docking studies of efavirenz derivatives, *3rd International Symposium Computational Methods in Toxicology and Pharmacology Integrating Internet Resources*, 29 October-1 November 2005, Shanghai, China.

3. **Pornpan Pungpo**, Oradee Pankwang, Patchreenart Saparpakorn and Supa Hannongbua, Understanding the interaction and the structure–activity correlation of efavirenz derivatives and WT and K103N HIV-1 RT by molecular docking and 3D-QSAR approaches, *Proceedings of The 8th International Meeting "Molecular Epidemiology and Evolutionary Genetics of Infectious Diseases* ,2006.

4. **Pornpan Pungpo**, Auradee Punkvang, Patchreenart Saparpakorn and Supa Hannongbua. Molecular Docking Calculation and Conformational Analysis of HIV-1 RT Inhibitors of Efavirenz Derivatives. *German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology*. 26-28 September 2007, chonburi, Thailand.

5. **Pornpan Pungpo**, Auradee Punkvang, Patchreenart Saparpakorn and Supa Hannongbua. Insights into the structural requirements of efavirenz derivatives as highly potential anti-HIV-1 agents based on molecular docking, 3D-QSAR studies and quantum chemical calculations. *German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology*. 26-28 September 2007, chonburi, Thailand.

การไปเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ

1. **Pungpo P.**, Saparpakorn, P., Wolschann, P. and Hannongbua, S., Inhibitory models of efavirenz derivatives active against K103N HIV-1 RT by molecular docking and 3D QSAR analyses, *The 10th Annual National Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE10)*, 22-24 March, 2006, ChaingMai University, ChaingMai, Thailand.
2. **Pornpan Pungpo**, Auradee Punkvang, Patchreenart Saparpakorn and Supa Hannongbua. A Combined Approach of Docking and 3D QSAR Studies of Efavirenz Derivatives as Highly Potent HIV-1 RT Inhibitors. *The 11th Annual National Symposium on Computational Science and Engineering*. 28-30 March, 2007, Phuket , Thailand.
3. **Pornpan Pungpo**, Oradee Pankwang, Patchreenart Saparpakorn and Supa Hannongbua, IDENTIFICATION OF BINDING AND INTERATCTION FOR HIV-1

RT INHIBITORS IN THE CLASS OF EFAVIRENZ DERIVATIVES IN THE BINDING POCKET OF WT AND K103N HIV-1 RT BY USING MOLECULAR DOCKING STUDIES, Proceedings of The first annual symposium of Protein Research Society of THAILAND "Challenges in Protein Research in Thailand", 2006.

4. Auradee Punkvang, Patchreenart Saparpakorn, Supa Hannongbua and **Pornpan Pungpo**. Conformational Analysis of HIV-1 Reverse Transcriptase Inhibitor (S)-6-Chloro-4-(Cyclopropylethenyl)-1,4-Dihydro-4-(Trifluoromethyl)-2H-3,1-Benzoxazin-2-One (Efavirenz) and Its Derivatives, by Using Quantum Chemical Calculations. *The 32nd Congress on Science and Technology of Thailand, October, 10-12, 2006, Bangkok, Thailand.*
5. Auradee Punkvang, Patchareenart Saparpakorn, Songwut Suramitr, Supa Hannongbua and **Pornpan Pungpo**. Molecular modeling and computer-aided molecular design of highly potent HIV-1 Reverse Transcriptase Inhibitors in the class of efavirenz derivatives. *The 33rd Congress on Science and Technology of Thailand, October, 18-20, 2007, Nakornsrithumrat, Thailand*

Understanding the interaction and the structure–activity correlation of HIV-1 RT inhibitors of efavirenz derivatives and WT and K103N HIV-1 RT using molecular docking, 3D-QSAR approaches and quantum chemical calculations

Pornpan Pungpo^{1}, Auradee Punkvang¹, Patchreenart Saparpakorn² and*

Supa Hannongbua²

¹Faculty of Science, Ubonratchathani University, Ubonratchathani, Thailand, 34190

²Faculty of Science, Kasetsart University, Bangkok, Thailand, 10900

Molecular docking and 3D-QSAR analyses were performed to understand the interaction between a series of efavirenz derivatives with WT and K103N HIV-1 RT. To model the potential binding modes of efavirenz derivatives in the binding pocket of WT and K103N HIV-1 RT, molecular docking approaches by using GOLD and Autodock 3.05 programs were performed. The results show that the docking results obtained from both methods reveal a good ability to reproduce the X-ray bound conformation with rmsd less than 1.0 Å for both WT and mutant enzymes. The docking calculations of all efavirenz derivatives in the data set were, consecutively, performed to elucidate their orientations in the binding pockets. The results derived from docking analysis give additional information and further probes the inhibitor-enzyme interactions. The correlation of the results obtained from docking models and the inhibitory activities validate each other and lead to better understanding of the

structural requirements for the activity. Therefore, these results are informative to improve the development of more efficient HIV-1 RT inhibitors, especially, active against mutant enzyme. Based on the molecular alignment of conformations obtained from molecular docking procedures, the high predictive 3D-QSAR models were produced by using CoMFA and CoMSIA approaches. The CoMFA models reveal the importance of steric and electrostatic interactions through contour maps. The resulting CoMSIA models enhance the understanding of steric, electrostatic, hydrophobic, electron donor and acceptor requirements for ligands binding to the K103N HIV-1 RT. Moreover, quantum chemical calculations were carried out to analyze the interaction energies of the selected inhibitors with the individual amino acids in the binding pocket. The obtained results show the important interactions of inhibitors with the enzyme at the residue level. Consequently, the results obtained from structure-based, ligand-based design approaches and quantum chemical calculations can be integrated to identify the structural requirements of HIV-1 RT inhibitors in the class of efavirenz compounds. The principle derived from the present study provides a gainful guideline to design and predict new and more potent compounds active against WT and K103N HIV-1 RT.

INTRODUCTION

Human immunodeficiency virus type-1 (HIV-1) is the primary etiological agent of the Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS). HIV-1 reverse transcriptase (RT) plays an essential role for virus replication from single-stranded RNA viral genome into a double-stranded proviral DNA. As RT is virus specific and acting before viral integration into the host chromosome, it is an attractive target for several antiviral

therapeutic agents used for current anti-HIV therapy. Over the past decade, numerous HIV-1 RT inhibitors have been developed and classified into two major classes [1,2]. The nucleoside RT inhibitors (NRTI) such as AZT, ddC and ddI have been widely used to treat AIDS patients. NRTI are attractive drug candidates in that their binding site is unique to HIV-1 RT. Thus these derivatives are high cellular toxicity and several side effects result from the disruption of normal DNA polymerase activity. The other class of HIV-1 RT inhibitors is the non-nucleosides RT inhibitors (NNRTI). NNRTI are highly specific for HIV-1 RT by binding an allosteric site in a noncompetitive manner with respect to the substrate and displacing the polymerase active site catalytic residues [3]. The NNRTI have been classified into first and second generation NNRTI. The first generation NNRTI such as HEPT, TIBO and dipyrindodiazepinone or nevirapine [4] are much less toxic than the NRTI. However, a serious problem with the NNRTI is the emergence of drug-resistant variants of HIV-1, both in cell culture and in patients, leading to the decreased therapeutic efficacy of NNRTI [5,6]. The primary cause of this viral resistance to NNRTI is the mutation of the enzyme, which changes the shape of the pocket, where most of the reported NNRTI are bound [7]. A Common features among these are mutations of Y181C, Y188C and K103N which confer some degree of resistance to all of the NNRTI [8,9]. In clinical trials and therapeutic use of NNRTI, the most commonly observed mutation within RT is K103N [10]. Therefore, the second generation NNRTI such as efavirenz, carboxanilides, and quinoxalines is identified and discovered for high binding affinity in both the absence and presence of specific mutations. The second generation NNRTI have a more favorable resistance profile, showing small losses of activity against many common drug-resistance mutation.

Efavirenz, (-)-6-chloro-4-cyclopropylethynyl-4-trifluoromethyl-1,4-dihydro-2*H*-3,1-benzoxazin-2-one, is one of 20 anti-HIV drugs approved for clinical use [11]. Although HIV-1 infection is generally well controlled by efavirenz-containing regimens, one of the difficulties encountered clinically during antiviral therapy has been the emergence of resistance mutant viral forms. 90% of patients who have rebounded after efavirenz-inclusive HAART possess the K103N mutation [12]. Like other NNRTI, the K103N mutation is the most frequent mutation observed within RT resulting from the therapeutic interventions involving NNRTI [13-15]. Since the current available drug could not cover enough to completely eradicate HIV within the AIDS patients, to provide the optimum chemical benefit, the inhibitor-enzyme interactions and the structure–activity correlation of efavirenz derivatives and the WT and K103N HIV-1 RT are necessary to identify.

There is considerable interest in SAR investigations of efavirenz derivatives [16-24]. Moreover, the X-ray crystallographic structures of efavirenz in complex with both wild-type and K103N HIV-1 RT were determined leading to an understanding of some structural factors that confer resilience to drug-resistance mutation [25-26]. Molecular modeling and computer-aided molecular design approaches have been applied to develop informative models for rational drug design. A review about the structural information and drug–enzyme interaction of the NNRTI based on computational chemistry approaches has been recently reported [27]. Moreover, the activity prediction of efavirenz analogues with the K103N RT was examined by MC/ELR calculations identifying controlling factors for binding with K103N mutant [28]. The effect of the K103N mutation of HIV-1 RT on the activity of efavirenz analogues was studied via MC/FEP calculations. The relative fold resistance energies

indicate that efavirenz binds to K103N RT in a manner similar to the wild-type enzyme. The improved performance of the quinazolinones against the mutant enzyme is attributed to formation of a more optimal hydrogen-bonding network with bridging water molecules between the ligands and E138 [29]. A series of targeted MD simulations were studied on the effect that the common K103N mutation in HIV-1 reverse transcriptase has on the binding of NNRTI, including efavirenz [30]. The obtained results suggest that resilience to the insidious effects of the irksome K103N mutation can be attained by designing ligands that are able to disrupt the N103 – Y188 interaction. Molecular mechanics PBSA ligand binding energy and interaction of efavirenz derivatives with HIV-1 RT were studied based on molecular docking and MD simulations [31]. The results indicate that the tight association of the ligand to the HIV-1 RT binding pocket was based on hydrogen bonding between efavirenz's N1 and the oxygen of backbone of K101. Moreover, electrostatic interaction was mainly contributed by two amino acid residues in the binding site; K101 and H235. The hypothetical 3D pharmacophore model for NNRTI was developed by using a combined ligand- and structure-based molecular modeling approach [32]. The obtained information leads to the design and synthesis a new potential class of NNRTI.

As the X-ray crystallographic data of HIV-1 RT complexed with NNRTI are available, it is possible to apply structure-based drug design techniques using molecular docking calculations to predict the potential binding mode of ligand in a receptor binding site and also yield important information for other ligands binding to the same target [27,33-41]. The docking analysis provides additional structural information and further probes the interactions of inhibitors and the HIV-1 RT

binding site. Three dimensional quantitative structure-activity relationship (3D-QSAR) method by using comparative molecular field analysis (CoMFA) [42] and comparative molecular similarity indices analysis (CoMSIA) [43] are highly active areas of research in drug design. A number of QSAR studies were reported to identify important structural features responsible for the inhibition by NNRTI [27,37,38, 44-49]. As the molecular alignment is a crucial step to a successful 3D-QSAR model by CoMFA and CoMSIA, the alignment scheme generated from the docking study shows a promising molecular alignment producing reliable QSAR models for the NNRTI [38, 50-52].

Recently, quantum chemical calculations were successfully used to calculate the interaction energies and the binding energies of the NNRTI, such as TIBO and nevirapine derivatives, in the HIV-1 RT binding pocket. These results reveal the effects of surrounding amino acid residues to the NNRTI [53, 54]. Based on the B3LYP/6-31G(d,p) and ONIOM2 methods, particular interaction between efavirenz and the HIV-1 RT binding site was investigated. The stability of this complex system indicates that hydrogen bond interactions play an important role in the bound efavirenz/HIV-1 RT complex [55]. The calculated interaction energies using MP2/6-31G(d,p) level of theory could confirm the new designed nevirapine derivatives having the hydrogen bond interaction either N103 or C181 amino acid residues [36]. The results are in agreement with the previous study reported that density functional method can not handle for the H- π interaction calculation, whereas MP2 method of calculations has taken into account the H- π interaction [54].

In the present study, structure-based drug design approaches using molecular docking calculations were performed to explore the potential binding mode of

efavirenze derivatives in the WT and K103N binding pockets and to elucidate the inhibitor-enzyme interaction of the inhibitors in the corresponding binding sites. Then, the binding conformations obtained from docking calculations were subjected to 3D-QSAR studies by using CoMFA and CoMSIA approaches to determine the different structural requirements for the WT and K103N inhibition activities. Additionally, quantum chemical calculations were carried out to calculate the interaction energies of selected inhibitors with the individual amino acid residues in the binding pockets.

METHODS OF CALCULATION

Biological data

The chemical structures of various efavirenz derivatives and their inhibitory activities against both wild type (WT RT) and mutant type (K103N) are reported [19, 20, 22]. All presented biological data are from the same laboratory and were estimated under the same experimental conditions. The potency has been defined as $\log (1/C)$, where C is the ability of efavirenz derivatives to inhibit wild-type and K103N RF strain of HIV-1 (IC_{90}) [56]. In the present analysis, 56 efavirenz derivatives were separated into two groups; 49 compounds served as the training set and 7 compounds serve as the test set, sampling from structurally diverse molecules possessing various range of logarithm unit of activities, reported in Table 1.

Molecular modeling

As the availability of enzyme-inhibitor complexes (pdb codes 1fk9 and 1fko for the efavirenz/WT HIV-1 RT complex and the efavirenz/K103N HIV-1 RT complex, respectively), the starting geometries of efavirenz structures are obtained from the crystallographic structures [25]. All efavirenz derivatives were constructed and modified by ALCHEMY 2000 program [57]. Then, full geometry optimization, based on *ab-initio* molecular orbital method at the HF/3-21G level of theory, of all structures was carried out. The calculations were performed by the GAUSSIAN 03 program [58]. Partial atomic charges required for the calculations of the electrostatic interactions were then derived.

Docking Study

To investigate the potential binding modes of efavirenz derivatives, all derivatives were docked to WT (pdb code 1fk9) and K103N (pdb code 1fko) HIV-1 RT by using docking programs. Two docking programs, GOLD [59] and Autodock 3.05 [60], were applied to determine the ability of these programs for reproducing the efavirenz's X-ray orientation in its binding pocket for the efavirenz/RT complexes of WT and K103N mutation. GOLD (Genetic Optimization for Ligand Docking) is a docking method using a genetic algorithm (GA) for docking flexible ligands into protein binding sites. In this study, GA parameters were set to 7-8 times speed-up setting. The number of chromosome in each population and the number of operation were set to 100 and 10,000, respectively. Docked conformation which is the highest GoldScore was selected. Autodock 3.05 keeps the macromolecule rigid, while allows torsional flexibility for the ligand. Docking ligand to macromolecule was carried out

using Lamarckian Genetic Algorithm (LGA), with an initial population of 50 randomly placed individuals. Fifty independent docking runs were carried out for each ligand. Docked conformation represented the lowest final docked energy was selected. The root-mean-square deviation (rmsd) of the top-scored pose from the X-ray pose was used to determine the validation of the docking methods.

Molecular Alignment and CoMFA and CoMSIA set up

The alignment rule, i.e., the positioning of the molecular structure within a fixed lattice, is the key to successfully set up CoMFA and CoMSIA models. For these reasons, in the present study, the molecular alignments derived from the molecular docking procedures were used to construct CoMFA and CoMSIA models.

To obtain CoMFA and CoMSIA descriptors fields, a three dimensional cubic lattice, with 2 Å grid spacing, was generated automatically around these molecules and it was ensured that the grid extended the molecular dimensions by 4.0 Å in all directions, performed by Sybyl 7.0 [61]. CoMFA descriptors were computed using a sp^3 carbon atom with +1 charge (default probe atom in Sybyl), served as the probe atom to generate steric (Lennard–Jones 6-12 potential) field energies and electrostatic (Coulombic potential) fields. The probe atom was placed at each lattice point and their steric and electrostatic interactions with each atom in the molecule were all calculated with CoMFA standard scaling and then compiled in a CoMFA QSAR table. The energy cutoff values of 30 kcal/mol were selected for both electrostatic and steric fields.

CoMSIA similarity index descriptors were derived with the same lattice box as used for the CoMFA calculations, with a grid spacing of 2 Å using a common C probe atom of 1 Å radius, as well as a charge. CoMSIA similarity indices ($A_{F,K}$) for a molecule j with atoms i at a grid point are calculated according to the following equation;

$$A_{F,k}^q(j) = \sum_{i=1}^n w_{probe,k} w_{ik} e^{-\alpha r_{iq}^2}$$

Five physicochemical properties k (steric, electrostatic, hydrophobic, hydrogen bond donor and hydrogen bond acceptor) were evaluated using the probe atom. A Gaussian-type distance was used between the grid point q and atom i of the molecule. The default value of 0.3 was used as the attenuation factor (α). In CoMSIA, the steric indices are related to the third power of the atomic radii, the electrostatic descriptors are derived from atomic partial charges, the hydrophobic fields are derived from atom-based parameters [62]. and the hydrogen donor and acceptor indices are obtained by the rule-based method derived from the experimental values [63].

The CoMFA and CoMSIA descriptors were used as independent variables and $\log(1/C)$ values were used as dependent variables to derive the 3D QSAR model. Partial least square technique (PLS) was employed to derive a linear relationship and cross-validation was performed using the leave-one-out method with a 2.0 kcal/mol column filter to minimize the influence of the noisy columns. The analyses were carried out with a maximum of six components, and subsequently, using the number of component (noc) at which the difference in the r_{cv}^2 value to the next one was less

than 0.05 [64]. Consequently, a non cross-validated analysis was performed using the optimal number of components previously identified and was then employed to analyze the results.

Predictive ability

Q^2 or r^2_{cv} values were used to evaluate the overall predictive ability of the model. r^2_{cv} is calculated according to the following equation;

$$r^2_{cv} = (SSY - PRESS)/SSY$$

where SSY represents the variance of the biological activities of molecule around the mean value and PRESS is the prediction error sum of squares derived from the leave-one-out method. The uncertainty of the prediction is defined as;

$$S_{PRESS} = [PRESS/(n-k-1)]^{1/2}$$

where k is the number of variables in the model and n is the number of compounds used in the study.

Interaction Energy Calculations

For clearly elucidate the interaction of efavirenz derivatives in the binding pocket, the individual interaction between some derivatives and the surrounding amino acid in the WT and K103N binding pocket are investigated by using quantum chemical calculations. In this study, X-ray structure of efavirenz, docked conformation of efavirenz (compound 01), compounds which have the highest and less activity against WT RT (compounds 25 and 12), and compounds which have the highest and the less activity against K103N RT (compounds 50 and 22) are selected to

calculate their interaction energies formed with the surrounding amino acids in the WT and K103N binding pocket. The geometries of the 14 amino acids surrounding within 6 Å from efavirenz are taken from the protein structures, which are starting geometries for docking. Each amino acid is terminated with hydrogen atoms. Compound with each amino acid are then performed single point calculation at B3LYP/6-31G(d) and MP2/6-31G(d) levels of theory by using Gaussian03 program. The interaction energy (INT) of the compound with each amino acid is defined as follows:

$$\text{INT} = E_{(\text{compound} + \text{each amino acid})} - [E_{(\text{compound})} + E_{(\text{each amino acid})}]$$

Where $E_{(\text{compound} + \text{each amino acid})}$ is the energy of the complex structure between compound and each amino acid. $E_{(\text{compound})}$ and $E_{(\text{each amino acid})}$ are the energies of compound and each amino acid, respectively.

RESULTS AND DISCUSSION

Docking analysis

Validation of the docking method

Two docking methods, GOLD and Autodock, were applied to dock the efavirenz compound back into the WT and K103N HIV-1 RT binding pockets. The rmsd values of the docked posed from the X-ray pose of efavirenz obtained from GOLD method are 0.94 Å and 1.0 Å for WT and K103N RT binding pocket, respectively. Based on Autodock results, the rmsd values are 0.35 Å and 0.53 Å for WT and K103N RT binding pocket, respectively, reported in Table 2. The results show that both methods reveal a good ability to reproduce the X-ray bound conformation with rmsd less than

1.0 Å for both WT and mutant enzymes. The binding mode of the docked efavirenz shows a very similar interaction with the X-ray crystallographic structure, depicted in Figure 1. Therefore, GOLD and Autodock programs with the used parameters could be extended to search and evaluate the binding conformations of efavirenz derivatives in the corresponding binding pockets.

Docking analysis of efavirenz derivatives in the binding pocket.

To evaluate the binding orientation of efavirenz derivatives in the WT and K103N HIV-1 RT binding pocket, 56 efavirenz compounds, shown in Table 1, were docked into the binding pocket using GOLD and Autodock methods. The docked orientations of all efavirenz derivatives are laid to be similarly butterfly like shape as the efavirenz compound in the corresponding binding pocket, as shown in Figure 2. It shows that the common ring structures of all derivatives were well superimposed each other. To elucidate the potential binding mode of compounds in the binding pocket relating to their inhibitory activities, the docked results of highest and less active compounds against both WT and K103 N HIV-1 RT were considered. Comparing with the X-ray pose orientation of efavirenz, the docked conformations of compounds 25 and 12, the highest and less active compounds against WT HIV-1 RT, respectively, are depicted in Figure 3. The docked conformations of compound 25 produced from both docking methods show similar orientation in the WT binding pocket. The conformations could form the hydrophobic interaction between the cyclopropyl group and the hydrophobic pocket of Y181, Y188 and W229, whereas the bulky alkoxy group of compound 12 may lead to conflict with these amino acids. The hydrogen bond between 6-H position of the benzoxazin-2-one ring with carbonyl group of

backbone H235 could be possibly formed, instead of the Van der waals interaction of 6-Cl in efavirenz. Moreover, there is possibility for the Van der waals interaction between 5-F of the ring and V106. This may explain why compounds 25 and 12 shows higher potency and less potency against WT HIV-1 RT comparing with efavirenz compound, respectively. Figure 4 shows the docked conformation of compound 25 in the K103N HIV-1 RT. The conformation reveals that the intermolecular hydrogen bond of hydrogen atom with H235 was eliminated. Moreover, the hydrophobic interaction between the cyclopropyl group with the Y181, Y188 and W229 was lost. This information obtained from docking conformations is in agreement with the experimental results that compound 25, showing the highest potency for WT HIV-1 RT inhibition, has diminished activity against K103N HIV-1 RT.

The docked conformations of compounds 50 and 22, the highest and less active compounds against K103N HIV-1 RT, were further analyzed. The docked conformations obtained from GOLD and Autodock methods comparing with the X-ray pose orientation of efavirenz are shown in Figure 5. Numerous favorable interactions found for compound 50 are described as follows. The Van der waals interaction could be formed between methoxy group substituted at C5 position of the benzoxazin-2-one ring and the sidechain of L234, F227 and Y188. There are additional Van der waals interaction between 6-Cl and the sidechain of L234, V106. The hydrophobic interaction between the cyclopropyl group with the aromatic sidechain of Y188 and W229 could be formed. It is interesting to note that the hydrogen atom attached to the nitrogen atom on the Z substituent could increase hydrogen-pi ($H-\pi$) interaction with the aromatic sidechain of Y181, whereas

compound 22 and efavirenz could not be found these interactions. Moreover, compound 22 with smaller substituents made the loss of the hydrophobic interactions with the aromatic ring of W229. These results may explain why compound 50 shows the highest activity and compound 22 has less inhibitory activity against K103N HIV-1 RT. It is interesting to note that, for compound 50, the docked conformation in the WT binding reveals the possibility of the hydrogen bond formation. The Van der waals interactions could be also found. Although the H- π interaction was eliminated in the pocket, the cyclopropyl group could match more to the hydrophobic pocket of Y188, W229 and Y181 in the WT binding pocket as show in Figure 6. This may be the reason that compound 50 shows excellent inhibition against both WT and K103N HIV-1 RT.

Molecular docking approaches successfully prove as powerful tools to determine the potential binding mode and to elucidate inhibitor-enzyme interactions of efavirenz compound and its derivatives in the HIV-1 RT binding pocket. The important interactions of efavirenez derivative active against the WT and K103N HIV-1 RT can be drawn as follows. With respect to the WT HIV-1 inhibition, the hydrogen bond between the polar atom (H and oxygen carbonyl) on benzoxazin-2-one ring with the main sidechains of H235, K101 and P236 are favorable to enhance the inhibitory activity. In particular, the additional hydrogen bond at 6-substituent position seems to be important to active against HIV-1 RT. Another important interaction of WT HIV-1 RT inhibitors is the hydrophobic interaction between the R substituent attached to C4 on benzoxazin-2-one ring with the side chains of Y181, T188 and W229. It should be noted that regarding the K103N HIV-1 RT, the hydrogen- π interaction of the NH group on Z position with the aromatic side chain of