




รูปที่ 3 - 8แสคงโครงสร้างจุลภาคที่การจุ่มแท่งแกรไฟต์เป็นเวลา 12วินาทีครั้งที่ 2 (ก) ส่วนบน (ข) ส่วนกลาง และ (ค) ส่วนล่าง








รูปที่ 3 - 9แสดงโครงสร้างจุลภาคที่การจุ่มแท่งแกรไฟต์เป็นเวลา 12วินาทีครั้งที่ 3 (ก) ส่วนบน (ข) ส่วนกลาง และ (ค) ส่วนล่าง




รูปที่ 3 - 10แสดงโครงสร้างจุลภาคที่การจุ่มแท่งแกรไฟต์เป็นเวลา 15วินาทีครั้งที่ 1 (ก) ส่วนบน (ข) ส่วนกลาง และ (ค) ส่วนล่าง










รูปที่ 3 - 11แสดงโครงสร้างจุลภาคที่การจุ่มแท่งแกรไฟต์เป็นเวลา 15วินาทีครั้งที่ 2 (ก) ส่วนบน (ข) ส่วนกลาง และ (ค) ส่วนล่าง










รูปที่ 3 - 12แสดงโครงสร้างจุลภาคที่การจุ่มแท่งแกรไฟต์เป็นเวลา 15วินาทีครั้งที่ 3 (ก) ส่วนบน (ข) ส่วนกลาง และ (ค) ส่วนล่าง







รูปที่ 3 - 13แสดงโครงสร้างจุลภาคที่การจุ่มแท่งแกรไฟต์เป็นเวลา 20วินาทีครั้งที่ 1 (ก) ส่วนบน (ข) ส่วนกลาง และ (ค) ส่วนล่าง



รูปที่ 3 - 14แสดงโครงสร้างจุลภาคที่การจุ่มแท่งแกรไฟต์เป็นเวลา 20วินาทีครั้งที่ 2

(ก) ส่วนบน (ข) ส่วนกลาง และ (ค) ส่วนล่าง