











รูปที่ 3 - 57แสดงโครงสร้างจุลภาคที่อุณหภูมิแท่งแกรไฟต์ 200°C จุ่มแท่งแกรไฟต์เป็นเวลา 10วินาที
(ก) ส่วนบน (ข) ส่วนกลาง และ (ค) ส่วนล่าง








รูปที่ 3 - 58 แสดงโครงสร้างจุลภาคที่อุณหภูมิแห้งแกรไฟต์ 300°C จุ่มแห้งแกรไฟต์เป็นเวลา 10 วินาที
(ก) ส่วนบน (ข) ส่วนกลาง และ (ค) ส่วนล่าง






รูปที่ 3 - 59 แสดงโครงสร้างจุลภาคที่อุณหภูมิแห้งแกรไฟต์ 400°C จุ่มแห้งแกรไฟต์เป็นเวลา 10 วินาที
(ก) ส่วนบน (ข) ส่วนกลาง และ (ค) ส่วนล่าง





รูปที่ 3 - 60แสดงโครงสร้างจุลภาคที่อุณหภูมิแห้งแกรไฟต์ 100°C จุ่มแห้งแกรไฟต์เป็นเวลา 20วินาที


(ก) ส่วนบน (ข) ส่วนกลาง และ (ค) ส่วนล่าง








รูปที่ 3 - 61แสดงโครงสร้างจุลภาคที่อุณหภูมิแห้งแ่งไฟต์ 200°C จุ่มแ่งไฟต์เป็นเวลา 20วินาที
(ก) ส่วนบน (ข) ส่วนกลาง และ (ค) ส่วนล่าง









รูปที่ 3 - 62 แสดงโครงสร้างจุลภาคที่อุณหภูมิแห้งแกรไฟต์ 300°C จุ่มแห้งแกรไฟต์เป็นเวลา 20 วินาที
(ก) ส่วนบน (ข) ส่วนกลาง และ (ค) ส่วนล่าง




รูปที่ 3 - 63 แสดงโครงสร้างจุลภาคที่อุณหภูมิแห้งแกรไฟต์ 400°C จุ่มแห้งแกรไฟต์เป็นเวลา 20 วินาที
(ก) ส่วนบน (ข) ส่วนกลาง และ (ค) ส่วนล่าง





รูปที่ 3 - 64แสดงโครงสร้างจุลภาคที่อุณหภูมิแห้งไฟ 100°C จุ่มแห้งไฟเป็นเวลา 30วินาที
(ก) ส่วนบน (ข) ส่วนกลาง และ (ค) ส่วนล่าง








รูปที่ 3 - 65แสดงโครงสร้างจุลภาคที่อุณหภูมิแท่งแกรไฟต์ 200°C จุ่มแท่งแกรไฟต์เป็นเวลา 30วินาที

(ก) ส่วนบน (ข) ส่วนกลาง และ (ค) ส่วนล่าง





รูปที่ 3 - 66 แสดงโครงสร้างจุลภาคที่อุณหภูมิแท่งแกรไฟต์ 300°C จุ่มแท่งแกรไฟต์เป็นเวลา 30 วินาที
(ก) ส่วนบน (ข) ส่วนกลาง และ (ค) ส่วนล่าง




รูปที่ 3 - 67 แสดงโครงสร้างจุลภาคที่อุณหภูมิแท่งแกรไฟต์ 400°C จุ่มแท่งแกรไฟต์เป็นเวลา 30 วินาที
(ก) ส่วนบน (ข) ส่วนกลาง และ (ค) ส่วนล่าง



รูปที่ 3 - 68แสดงโครงสร้างจุลภาคที่อุณหภูมิแท่งแกรไฟต์ 100°C จุ่มแท่งแกรไฟต์เป็นเวลา 10วินาที

(ก) ส่วนบน (ข) ส่วนกลาง และ (ค) ส่วนล่าง





รูปที่ 3 - 69แสดงโครงสร้างจุลภาคที่อุณหภูมิแท่งแกรไฟต์ 200°C จุ่มแท่งแกรไฟต์เป็นเวลา 10วินาที

(ก) ส่วนบน (ข) ส่วนกลาง และ (ค) ส่วนล่าง

