



ภาพที่ 7. ลักษณะของยอดอ้อยหมักหลังจากเปิดถังหมักที่หมักไว้ 1 เดือน ส่วนมากไม่มีเชื้อราขาวเจริญบริเวณ
ด้านบนของถังหมัก



ภาพที่ 8. ลักษณะของยอดอ้อยหมักหลังจากเปิดถังหมักที่หมักไว้ 2 เดือน ส่วนมากไม่มีเชื้อราขาวเจริญบริเวณ
ด้านบนของถังหมัก



ภาพที่ 9. ลักษณะของยอดอ้อยหมักหลังจากเปิดถังหมักที่หมักไว้ 3 เดือน ส่วนมากไม่มีเชื้อราขาวเจริญบริเวณ
ด้านบนของถังหมัก



ภาพที่ 10. ลักษณะของยอดอ้อยหมักหลังจากนำออกจากถังหมักที่ใช้เชื้อของทรีทเมนต์ none, U, M+U, L, CH และ L+CH



ภาพที่ 11. ลักษณะของยอดอ้อยหมักในแต่ละทรีทเมนต์มีสีของยอดอ้อยหมักที่แตกต่างกัน



ภาพที่ 12. หลังจากนำยอดอ้อยหมักออกจากถังหมักไรเซลแล้ว นำมาให้โคนมกินเพื่อประเมินความน่ากินของยอดอ้อยหมัก