




ทัศนคติชายหญิงเรื่องเพศสัมพันธ์




คุณจะรักผู้หญิงสักคนโดยไม่ต้อง
มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานได้หรือไม่?




ถ้าผู้รักของคุณไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน คุณจะยังคงรักเธอหรือไม่?




การมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงทุกคนไม่ได้รัก จะช่วยให้คุณรักเธอได้หรือไม่?




ถ้ารู้จักของคุณขอมิพัฒนสัมพันธ์กับท่าน คุณจะปฏิเสธหรือไม่?



คุณคิดว่า การมีประสบการณ์ก่อนแต่งงาน จะสามารถผูกมัดใจชายได้หรือไม่?



คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับพฤติกรรม “ฟันเถลิง”



คุณมีความคิดเห็น “ไม่น่าเป็นห่วง” น่าเป็นห่วงอย่างมาก

อันตรายของวัยรุ่น



อันตรายของวัยรุ่น

สารเสพติด

เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์

จะทำให้การควบคุมตัวเองลดลง อาจทำให้เกิดปัญหาต่างๆ

- * อุบัติเหตุในการขับรถยนต์
- * การทะเลาะวิวาท
- * การล่วงเกินทางเพศ
- * การตั้งครมภ์ไม่พึงปรารถนา
- * การติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์





โคเคนและแอมเฟตามีน

เป็นยากระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง

- * ทำให้รู้สึกสบาย กระฉับกระเฉง
- * มีความกล้ามากขึ้น
- * ควบคุมตัวเองน้อยลง ทำให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา

ถ้าใช้มาก

- * จะเกิดประสาทหลอน หวาดระแวง
- * คลุ้มคลั่ง
- * ชี้น้ำลาย





สถานเริงรมย์ยามราตรี



ยาเค

- * ทำให้รู้สึกสบาย
- * ลดความวิตกกังวล
- * รู้สึกเป็นอิสระจากสิ่งแวดล้อม
- * กระตุ้นและส่งเสริมความรู้สึกทางเพศ

ถ้าใช้บ่อย

- * เกิดอาการคล้ายโรคจิตประสาท
- * อาละวาด สับสน
- * ซึมเศร้า
- * การเร้าอารมณ์ทางเพศลดลง



ยาอีและยาเลิฟ

เป็นอนุพันธ์ของแอมเฟตามีน จะทำให้รู้สึก

สบาย

- * ทำให้รู้สึกสบาย
- * ช่วยกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ
- * ขาดการควบคุมตัวเอง
- * อาจเกิดปัญหาทางร่างกาย ทรัพย์สิน และ
ปัญหาทางเพศ




การไปเที่ยวกลางคืน

- * วัยรุ่นหญิงควรแต่งตัวให้เหมาะสม
- * อย่าให้คนอื่นคิดว่า เป็นผู้ที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้
ง่ายๆ เช่น การแต่งตัว ท่าทาง คำพูด
- * วัยรุ่นหญิงควรแต่งตัวให้เหมาะสม
- * ไม่ควรไปในสถานที่เปลี่ยว หรือ ห่างไกลจากชุมชน
- * ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จนควบคุมสติ
ไม่ได้
- * ไม่ควรใช้สารเสพติดต่างๆ
- * ควรบอกผู้ปกครองให้ทราบว่าจะไปที่ไหน กับใคร
และจะกลับเมื่อไร
- * ควรรู้จักวางแผนที่จะช่วยเหลือตนเอง ในกรณี
ฉุกเฉิน ที่ไม่คาดคิดเอาไว้ก่อน








INTERVIEW



ภาพเฝ้า หรือ Cyberporn ห้องสนทนา





โทรศัพท์




เช็กซ์ไลน์ คลายเคียด

Voice Mail

การ์ด บริการหาเพื่อน

Party Line



Cybersex คืออะไร


เว็บไซต์ที่น่าสอ่กี่ยวกับเรื่อง
เพศ รูปภาพไป มีการบริการทาง
เพศอย่างเสรี หรือบางเว็บไซต์ไม่รู้
ว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร แต่ก็มี
ทางเชื่อมไปสู่เว็บไซต์ทางเพศได้



อันตรายจาก Cybersex/Party Line


ขาดการติดต่อกับเพื่อนฝูง

มีผลเสียต่อสุขภาพ




ขาดสมาธิ การเรียนแย่ลง

เสียทรัพย์



อาจถูกหลอกทางเพศ



ป้องกันอย่างไรไม่ให้ติด Cybersex/Party Line

• การใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์


• ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนมากขึ้น และ

บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์

• จำกัดเวลาในการเล่นคอมพิวเตอร์

การล่วงเกินทางเพศคืออะไร

การที่ผู้อื่นปฏิบัติภารกิจทางเพศทุกรูปแบบ ต่อเด็ก แบ่งเป็น 2 แบบ



• ไม่มีการสัมผัสร่างกาย เช่น การเปลือยกาย
หรือให้เด็กดูอวัยวะเพศ พุดสวนลาม หรือล่อ
หลอก



• มีการสัมผัสร่างกาย เช่น การอุบคาลำร่าง
กาย หรือล่วงล้ำเข้าไปในอวัยวะเพศ

การกระทำเช่นนี้ถือว่าเป็นผิดกฎหมาย



ใครคือผู้ล่วงเกินทางเพศ

ผู้ที่มีความผิดปกติทางเพศ



(c) WWW.CHIMYGOODNESS.COM

กระทำความประมาทโกลาต



ผู้กระทำ

เป็นคนที่รู้จักคุ้นเคย

80 %

≈

เป็นบุคคลในครอบครัว

40 %

≈

เป็นผู้ไม่รู้จักมาก่อน

20 %

≈



สถิติเด็กที่ถูกล่วงเกินทางเพศ

เด็กอายุ	12 - 15 ปี	พบ	41 %
เด็กอายุ	4 - 7 ปี	พบ	29 %
เด็กอายุ	8 - 11 ปี	พบ	20 %



เหตุการณ / สถานการณใดที่เสี่ยงต่อ การลวงเกินทางเพศ

• สถานที่

• เวลา

• การแต่งกาย

• การกิน / ดื่มของที่เปิดแล้ว



สถานที่ถูกกระทำ

* ในบ้านตัวเอง 57 %

* นอกบ้าน 43 %

โรงเรียน/ห้องน้ำโรงเรียน

ห้องเรียน

ภายในวัด

* โรงพยาบาล

* สถานที่ก่อสร้าง

* บนรถเมล์ / รถตู้

*ริมถนนซอยเปลี่ยว



ช็อก!! ปมปิ่นชัวโม่งสะราย “พีโตริม” ดันเหตุ พ่อชัว-ครูโจด-พระเลว!?!



พ่อชัวไม่สูญพันธุ์ ช่มขึ้นกระทิงลูกในไส้ “เฒ่าตันทา
กลับวัย 71 ปี ช่มขึ้นเหลนตัวเองวัย 11 ขวบ จนเหลน
พยายามฆ่าตัวตาย”

ครูโจดช่มขึ้นลูกศิษย์ชั้น ป.6 วัย 12 ปี จนลูกศิษย์ตั้ง
ท้องคลอดลูกโดยไม่รู้ตัว
แพทย์ชี้ 9 กรมการแพทย์ก่อเหตุอุบาทว์ โชว์นกเขา ช่มขึ้น
เลขาฯ มาหลายราย”



คุณข้าเราเจ้า ต้องเซเจียน

ปัทมา นาค.บุกซ์
หน้าละห้อยน้ำคุด

จิตคู่ที่ขบถ ไหวนหมื่นหมื่น
ไม่ใช้ให้ पनि การเสกเจียน
ตัวที่กรอ เจียน นังผู้ปกครองหา
โง่งมวิหัง

เมื่อผม อยู่คนเดียวในสวนคนเดียว ผมอยู่คนเดียว
คนเดียวคนเดียว ผม อยู่คนเดียวคนเดียวคนเดียวคนเดียว
คนเดียวคนเดียวคนเดียว "นี่คือคนเดียว" อย่างเดียว
คนเดียวคนเดียวคนเดียวคนเดียวคนเดียวคนเดียวคนเดียว
คนเดียวคนเดียวคนเดียวคนเดียวคนเดียวคนเดียวคนเดียว
คนเดียวคนเดียวคนเดียวคนเดียวคนเดียวคนเดียวคนเดียว
คนเดียวคนเดียวคนเดียวคนเดียวคนเดียวคนเดียวคนเดียว
คนเดียวคนเดียวคนเดียวคนเดียวคนเดียวคนเดียวคนเดียว
คนเดียวคนเดียวคนเดียวคนเดียวคนเดียวคนเดียวคนเดียว

... (transcription of the smaller text in the middle column) ...

... (transcription of the smaller text in the right column) ...

1939 50-14

**ขึ้นใจในโรงเรียน
จน.8ปีหย่อนจน.12**

หลานชาย
'อจ.ใหญ่'
เรื่องเขียน
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ป.3 จันทรเกษม

หนังสือพิมพ์ข่าวสด

12 กพ. 44

[illegible][illegible]

เพื่อทราบความจำเป็นของผู้ที่เข้ามาซื้อสินค้าเพราะไม่ได้รับประโยชน์
ด้วยตนเอง โดยที่บริษัทสามารถจะทราบได้ว่าผู้ที่เข้ามาซื้อสินค้าเพราะ
และเพราะเหตุอื่น ๆ ใดบ้าง และว่าเหตุใดผู้ที่เข้ามาซื้อสินค้าเพราะ
เหตุอื่น ๆ ก็เกิดขึ้น จนทำให้บริษัทสามารถไปใช้ประโยชน์ของผล
ที่ได้มา (เช่น ผลรวมดี) ของผู้ซื้อ เพราะบริษัทต้องไม่ลืมที่จะ
ไปซื้อสินค้าของบริษัทจากผู้ซื้อ ซึ่งผู้ซื้อบางคนนั้นก็มีเหตุผลที่
คิดว่าว่าไม่ต้องการซื้อสินค้า ในเมื่อเขาสนใจแล้ว แต่ไม่สนใจ
ที่จะซื้อสินค้านั้น



วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 254

ลากคอส่งเข้าตาราง หนุ่มส่งของหีนกาม ลงเด็ก 14 ขยีสวาท

ไ้หนุ่มเด็วเริ่ สุดเสปไปส่งของ
เห็นเด็กสาววัย 14 ปี อยู่บ้านคนเดียว
ออกอุบายล่อล่กว่าพ่อให้มามไปเฝ้า
ที่ซื่อไว้ จากนั้นสไปช้กามอย่างเมามัน
เพื่อมมเป็นภัว

◆ ส่วนต่อหน้า ๑๘

หนุ่มเริ่บวณไปรับมชกด้วยคนดีเริ่ที่เริ่บไม่
เริ่เริ่บ เริ่เริ่บเริ่บเริ่บเริ่บเริ่บเริ่บเริ่บ
เริ่บเริ่บเริ่บเริ่บเริ่บเริ่บเริ่บเริ่บเริ่บ

หนุ่มเริ่บวณเริ่บเริ่บเริ่บเริ่บเริ่บเริ่บ
เริ่บเริ่บเริ่บเริ่บเริ่บเริ่บเริ่บเริ่บเริ่บ
เริ่บเริ่บเริ่บเริ่บเริ่บเริ่บเริ่บเริ่บเริ่บ



แจ้งตร.จับสึกพระแก้ว! ข่มขืนเด็กหญิงจนท้อง

บรรณานถึง 19 พรรษา ยังตัดกิเลส
ไม่ได้ พระแก้วข่มขืนเด็กหญิงวัยเอ้าะ ๆ
แล้วให้เงินเป็นค่าปิดปาก จนเด็กหนีย
ท้องถึง 4 เดือน พ่อเห็นใช้เงินผิดปกติ
คาดค้นจนลูกสาว

ครอบครัวชาวมะนิลา สืบข่าวไว้แจ้งตำรวจได้กวาด
นำมสอขปากคำไว้ตรวจหาหลักฐานเห็นผิดในจวน
เขตคือหนีไปนอนในละแวกตามวัดพระแก้ว

พระแก้วขึ้นเด็กจนน้อย รายนามเด็กขึ้นเมื่อ
เมื่อ 11-00 น. วันที่ 25 เม.ย. ร.ต.อ.พิเชตร พันธ์
รัตน์ สอ.ข.เกิดที่หมู่บ้านนี้ รับแจ้งจากนายต๋อง
(นามสมมุติ) อายุ 34 ปี 16 หมู่ ต.มะนิลา (นาม
สมมุติ) อายุ 14 ปี บุตรพระแก้วมาฟ้องกล่าว
อายุ 19 ปี พระแก้ววัด วัดป่าต๋อง หมู่ 3 ต.มะ
นิลา อ.มะนิลา ข่มขืนจนท้องได้ 4 เดือนได้
ประมาณ 4 เดือนแล้ว ขอให้ไปจับกุมตัวพระแก้ว
สัก 4 เดือนแล้ว แล้ว พระแก้วได้หนีไปนอนที่บ้าน
ใกล้กับวัดต๋องแล้ว ทำให้ลูกสาวเจ็บป่วยนอนไม่
เป็นเพราะ ข่มขืนจนท้องแล้วมีเงินใช้ยากจึง
ไปขโมยเงินที่พระแก้วพระแก้วข่มขืน จึงนำ
ไปตรวจที่ ร.ต.อ.พิเชตร พันธ์รัตน์ พระแก้ว
ได้ประมาณ 4 เดือนแล้วจึงได้ตรวจตัวแล้ว

เดลินิวส์ เม.ย.44

โซเฟอร์ชาตาน ปล้ำทำร้ายคน.

หลงขึ้นรถปล้ำไม่มีคน
ล็อกประตูดับไฟกะเชือด
ขีดขึ้นหวัดด้วยแป้นน้ำ

ชาตานเห็นงานในกรามโซเฟอร์
กรร้าม มขส. ถวยโอกาสขดะขับ
รถปล้ำอดดับ ★ มีสื่อหน้า 19

ที่แรก มขส. เลยได้ใจ... ตลอดทั้งคืนหาสาเหตุ
เพราะรถชาตานขับมาบนรถ... แล้วล็อกประตูดับไฟไหม
ม. หลงขึ้นรถชาตานหัวเราะ ปลุกได้ว่าม. ขาที่ถ่ม... แล้วเมื่อ
รถชาตานได้ผู้โดยสาร... โซเฟอร์ชาตานจะขับลงถนน... ไม่ได้
แล้วโซเฟอร์เลย... ม. ขด... ๖... การขับเป็นวงกลม... จักรขี
สารถม. ขด... โซเฟอร์ชาตานขับไปไม่ได้... ม. ข
เมื่อชาตานขับ... แล้วชาตานขับมาบนรถ... มีไฟเป็น
แล้วเมื่อชาตานขับ... โซเฟอร์ชาตานขับลง... โซเฟอร์ชา
กับทั้งโซเฟอร์ชาตาน... โซเฟอร์

ไทยรัฐ 27 กพ. 44



แก้พิษหมาง่าย ลงงสาวข่มขืนยับ

**แอบใส่ยา
นอนหลับ
ในน้ำดื่ม**

รวบแก้พิษหมาง่าย
ลงงสาวข่มขืนยับ
รับเหมาจากนักสมน
จตุจักรไปส่งขึ้นรถ

ที่หน้าวัด ๒ กิโลเมตรจากวัดมหาธาตุฯ กรุงเทพมหานคร ออก
อุบายอาชญากรรมไปตั้งที่โหล่งจันทน์เหนือของวัดระฆัง
โฆสิตาราม เพื่อบริการแก่คนในน้ำดื่มให้กินจน
หมดสติ แล้วพาไปข่มขืนในโรงมหรสพระฆัง
จตุจักร ไม่ให้แจ้ง คร. ก่อนไปตั้งที่ไว้ที่ บขส. เพื่อ
สะดวก คร.ฯ จะพาคนไปส่งที่สถานีรถไฟ มาอยู่
ที่หน้าวัดระฆังจตุจักรแล้วไปนำรถ ถูกยิงยาวหลังแดงของ
เส้นจนรถเสียหลักพุ่งคว่ำในน้ำข้างทางถนนพุทธี ขึ้น
ในรถพบคนนอนหลับและมีมือถือของเหยื่อหลายอย่าง
ที่ลักมาหลังรถแล้ว คร.ฯ จะพาคนไปส่งที่สถานีรถไฟ
มาอยู่หน้าวัดระฆังจตุจักร ทั้งกระทำการอาชญากรรม
ผู้เสียหายและเจ้าหน้าที่ในหลายท้องที่ แล้วยังใช้ก่อ
เหตุใช้ทรัพย์สิน (พร. ๒) ไปลง

เดลินิวส์ 15 พย. 44



เมื่อถูกล่วงเกินทางเพศจะทำอย่างไร

- อย่าอยู่ตามลำพัง ควรปรึกษาพ่อแม่ / ผู้ปกครอง
ครู หรือผู้ที่ไว้วางใจที่สุด
- ไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจร่างกาย
โดยเร็วที่สุด
- แจ้งตำรวจ / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ เด็กถูกล่วงเกินทางเพศ

หน่วยงานราชการ

- * กองคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก และเยาวชน
กรมประชาสงเคราะห์ โทร.246-8653, 247-9438
- * กองกำกับการสวัสดิภาพเด็ก และเยาวชน
กรมตำรวจ โทร. 281-1411
- * ศูนย์บริการสาธารณสุขเขตต่าง ๆ ในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ทุกแห่ง
- * โรงพยาบาลของรัฐ ทุกแห่ง
- * สถานีตำรวจทุกแห่ง



รายชื่อหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ

เด็กถูกล่วงเกินทางเพศ

หน่วยงานส่วนเอกชน

- * ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มูลนิธิเด็ก
โทร. 412-1196, 412-0739
- * มูลนิธิเพื่อนหญิง โทร. 270-0928
- * มูลนิธิผู้หญิง โทร. 433-5149
- * สหทัยมูลนิธิ โทร. 381-8834-6
- * สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
(บ้านพักฉุกเฉิน) โทร. 566-2288
- * มูลนิธิมิตรมวลเด็ก โทร. 252-6560



การหลีกเลี่ยงอันตรายทางเพศ

ที่บ้าน

- * เมื่ออยู่คนเดียวควรปิดประตูใส่กลอน
- * อย่าบอกผู้อื่นว่าอยู่คนเดียว หรือ บอกลวงหน้าให้ผู้อื่นรู้
- * อย่าเปิดประตูรับคนแปลกหน้า หรือคนที่อ้างว่ามาซ่อมเครื่องใช้ในบ้าน
- * ต้องแสดงว่าเป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเอง เพราะคนร้ายมักจะหาเหยื่อที่หลอกได้ง่าย หรือตื่นกลัวง่าย



ที่โรงเรียน

- * ควรทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพื่อน ไม่แยกตัวอยู่คนเดียว
- * ไม่ควรแอบนั่งในมุมที่ลับตาคน
- * ไม่ควรเข้าห้องสุขาในเวลาที่เข้าเรียนแล้ว
- * ควรกลับบ้านตามเวลา ไม่ควรเถลไถล
- * ถ้าจะไปไหนเป็นพิเศษ ควรบอกเพื่อนหรือผู้ปกครองไว้ด้วย



การคุมกำเนิด



การคุมกำเนิด

การคุมกำเนิด คือ การป้องกันไม่ให้เชื้อ
อสุจิผสมกับไข่หรือป้องกันไม่ให้มีไข่สุก

การคุมกำเนิดแบ่งออกเป็น 3 ชนิด

1. การคุมกำเนิดแบบชั่วคราว
2. การคุมกำเนิดแบบถาวร
3. การคุมกำเนิดหลังร่วมเพศ



การคุมกำเนิดแบบชั่วคราว

- * มีผลป้องกันการตั้งครรภ์ ขณะที่ใช้อยู่เท่านั้น
- * ถ้าเลิกใช้จะตั้งครรภ์ได้ปกติ



วิธีที่นิยมใช้กันมาก

- * ยาเม็ดคุมกำเนิด
- * ยาฉีดคุมกำเนิด
- * ยาฝังคุมกำเนิด
- * การใส่ห่วงอนามัย
- * ถุงยางอนามัย

ใช้สะดวกและมีประสิทธิภาพสูง



ยาเม็ดคุมกำเนิด



กลไกในการป้องกัน การตั้งครรภ์ของยาเม็ดคุมกำเนิด

- * ทำให้มูกปากมดลูกข้นเหนียวตัวอสุจิผ่าน
ได้ยาก
- * ระงับการตกไข่
- * เยื่อบุโพรงมดลูกเปลี่ยนแปลงไม่เหมาะสมกับ
การฝังตัวของไข่

อาการข้างเคียงของยาคุมกำเนิด

- * คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ
- * เลือดออกกระปริดกระปรอย
- * เป็น ฝ้า
- * น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น
- * ความดันเลือดเปลี่ยนแปลง
- * ประจำเดือนมาน้อยลง
- * การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ ซึมเศร้า
- * ความรู้สึกทางเพศเปลี่ยนแปลง



กลไกในการป้องกัน

การตั้งครรภ์ของยาฉีดคุมกำเนิด

- * ทำให้มูกปากมดลูกข้นเหนียวตัวอสุจิผ่าน
ได้ยาก
- * ระวังการตกไข่
- * เยื่อบุโพรงมดลูกเปลี่ยนแปลงไม่เหมาะสมกับ
การฝังตัวของไข่
- * เวลาเดินทางของไข่ไม่เป็นไปตามปกติ




อาการข้างเคียงของยาฉีดคุมกำเนิด


- * อาจมีอาการประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ
หรือประจำเดือนขาดไป
- * น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น
- * หลังหยุดฉีดแล้วตั้งครรภ์ช้า
- * พบอาการปวดศีรษะได้ร้อยละ 1-17
- * แน่นอึดอัดในท้อง
- * อาการซึมเศร้า




ยาฝึงคุมกำเนิด




ฝึงยาคุมกำเนิดที่ต้นแขน




ห้วงอวกาศ



ถุงยางอนามัยชาย



ถูงยางอนามัยสตรี




วิธีที่นิยมใช้น้อย



- * การใช้ยาฆ่าเชื้ออสุจิ
- * การใช้หมวกยางครอบปากมดลูก
- * การนับวันปลอดภัย
- * การหลั่งภายนอก
- * การสวนล้างช่องคลอด

ใช้ยากไม่สะดวก มีอัตราเสี่ยงในการ
ตั้งครรภ์สูง


ยาฆ่าเชื้ออสุจิ




ฝายางครอบปากมดลูก



หมวกยางครอบปากมดลูก



การนับวันปลอดภัย




การคุมกำเนิดแบบถาวร

- * เป็นวิธีการคุมกำเนิดเพื่อยุติการมีบุตรอย่างถาวร
 - * เหมาะสำหรับผู้มีบุตรอย่างเพียงพอแล้ว
 - * ผู้ที่มีโรคร้ายแรงบางอย่าง
- มี 2 แบบ คือ
- * การทำหมันชาย
 - * การทำหมันหญิง




การทำหมันชาย



*** เป็นการทำให้ท่อนำเชื้ออสุจิทั้งสองข้างตีบ
ตันด้วยการผูกตัดและแยกออกจากกัน**

การทำหมันหญิง



- * การทำให้ท่อรังไข่ตีบ อุดตัน
- * ขาดออกจากกัน โดยการผูก และตัด
- * ใช้วงแหวนรัด

การคุมกำเนิดหลังร่วมเพศ

เป็นวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์หลังร่วมเพศ

มี 2 วิธี

- * กินฮอร์โมนเพศหญิงชนิดที่มีฮอร์โมนสูงภายใน 72 ชั่วโมงหลังร่วมเพศ
- * การใส่ห่วงอนามัยชนิดที่มีทองแดงภายใน 7 วันหลังร่วมเพศ

กลไกป้องกันการตั้งครรภ์

- * ขัดขวางการฝังตัวของไข่ที่ผสมแล้ว
- * ทำให้เยื่อบุมดลูก ไม่เหมาะสมแก่การฝังตัวของไข่
- * ทำลายขีดความสามารถของตัวอสุจิในการผสมกับไข่



ใช้ในกรณี


- * ถูกข่มขืน
- * การคุมกำเนิดผิดพลาด
- * ถุงยางอนามัยยฉีกขาด หรือหลุด

ข้อควรระวังในการใช้

- * ไม่ควรใช้เป็นยาคุมกำเนิดตามปกติ
- * ไม่ควรกินเกินเดือนละ 4 เม็ด
- * ไม่สามารถป้องกันได้ 100 %
- * อาจมีการคลื่นไส้ อาเจียน หรือมีเลือดออก
กระปริดกระปรอยได้
- * มีผลต่อการบีบตัวของท่อรังไข่ อาจทำให้
เกิดตั้งครรภ์นอกมดลูกได้



โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์



โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โรคติดต่อที่สามารถติดต่อกันได้ทางการร่วม
เพศกับผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อ เกิดขึ้นได้กับ
บุคคลทุกเพศทุกวัย

ผลอื่น ๆ ที่อาจเกิดภายหลัง

- * มีบุตรยาก
- * ท้องนอกมดลูก
- * แท้งง่าย
- * มะเร็งปากมดลูก
- * มะเร็งตับ



อาการที่สำคัญของโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์


1. แผลที่อวัยวะเพศ

มีลักษณะต่างกันตามชนิดและระยะของโรค

- * จุดแดงเล็ก ๆ
- * เป็นตุ่มมีน้ำใส / เป็นหนอง



*** เป็นฝี**




*** เป็นแผลมีลักษณะเป็นขอบเรียบ
แข็งชัดเจน หรือแผลไม่มีขอบ**



2. ตกขาว

ในชาย

* มีอาการปัสสาวะขัด และแสบร้อน



* มีเมือก มูกข้นหรือใสออกจากหลอด
ปัสสาวะ



* มีหนองไหลออกจากหลอดปัสสาวะ

ในสตรี

- * มีตกขาวมากผิดปกติ
- * ตกขาวมีสี/กลิ่นเปลี่ยนไป
- * ตกขาวมีกลิ่นเปลี่ยนไป
- * ปัสสาวะขัด แสบ
- * มีอาการคัน



3. เบ็ดเตล็ด

- * โรคไวรัสตับอักเสบ B / C
- * เกิดอาการคันตามผิวหนังบริเวณ
หัวหน้าว และทวารหนัก
- * เป็นผื่นหรือตุ่ม บริเวณอวัยวะ
สืบพันธุ์



โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบบ่อย

- * ซิฟิลิส
- * หนองใน
- * เผลอิมอ่อน



เอช ไอ วี/ เอ็ดส์


เอช ไอ วี/ เอ็ดส์ หรือโรคภูมิคุ้มกัน
บกพร่องเกิดจาก ฮิวแมนอิมมูโนเดฟฟิ
เซียนส์ ไวรัส

อาการ

- * อาการจะแสดงให้เห็นภายใน 2-5 ปี
- * อาการของโรคส่วนใหญ่เกิดจากมีโรค
แทรก



ระยะของการติดเชื้อ เอช วี



สาเหตุที่ทำให้เสียชีวิต คือ โรคแทรก เช่น

- * โรคเรื้อรัง
- * โรคปอดอักเสบ
- * วัณโรคปอด
- * เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา
- * มะเร็งต่าง ๆ เช่น
 - * มะเร็งผิวหนัง
 - * มะเร็งปอด
 - * มะเร็งต่อมน้ำเหลือง



ไวรัส เอช ไอ วี ทำลายภูมิคุ้มกันได้อย่างไร

1. เชื้อไวรัสจะแฝงตัวอยู่ในเม็ดเลือดขาว
2. เมื่อเม็ดเลือดขาวแบ่งตัว เชื้อไวรัสก็จะแบ่งตัวตามไปด้วย
3. ไวรัสสามารถแบ่งตัวแพร่พันธุ์ได้เร็วมาก
4. ไวรัสกลายพันธุ์ได้เร็วมาก จนภูมิคุ้มกันของร่างกายจำไม่ได้ ทำให้ไม่สามารถขจัดเชื้อออกจากร่างกายได้



เอช ไอ วี หรือเอดส์ ติดต่oได้ 3 ทาง

1. ทางเพศสัมพันธ์

2. ทางเลือด

* ทางถ่ายเลือด

* ทางใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้มีเชื้อ


เอช ไอ วี

3. ทากแม่ไปสู่ลูกในครรภ์ แม่ที่ติดเชื้อ

เอช ไอ วี ลูกมีโอกาสติดเชื้อจากแม่

30 %






จะติดด้วยวิธีไหนหรือไม่


1. นั่งติดกันกับคนเป็นเอดส์



2. อาน้ำร่วมกัน




3. ถ่ายน้ำในสระเดียวกัน



4. ใช้ห้องน้ำร่วมกัน





5. ใส่เสื้อผ้าร่วมกัน



6. กินอาหารร่วมกัน

7. การสัมผัส กอด หรือจับมือ




8. การเบียดกันบนรถ


9. การให้นมบุตร



10. การคลอดบุตร ลูกจะติดจากแม่ไหม




11. การมีเพศสัมพันธ์ โดยไม่ใส่ถุงยางอนามัย



12. การจูบ



13. การสักร่างกาย



14. เจาะหู




15. ยุงกัด




16. ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน




17. อุบัติเหตุที่มีเลือดออก




He needed the sleeping pill
so I could get some rest



18. การให้เลือด



19. การทำฟัน



MAGIC JOHNSON





การรักษาโรคเอดส์

ขณะนี้ยังไม่มียารักษาเอดส์ให้หายขาดได้
การรักษาผู้ติดเชื้อ จะแบ่งตามระยะของโรค

ระยะที่ยังไม่แสดงอาการ

- * ตรวจเม็ดเลือดขาว 3 - 6 เดือนต่อครั้ง
- * อาจให้ยาป้องกันโรคแทรกซ้อน
- * ยาเพื่อยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเชื้อ
เอช ไอ วี





ระยะที่แสดงอาการ

- * เป็นระยะที่ภูมิคุ้มกันทานลดลง เชื้อ
เอช ไอ วี เพิ่มขึ้น
- * แพทย์รักษาตามอาการ
- * ให้ยายับยั้งการเพิ่มจำนวนของเชื้อ
เอช ไอ วี



การตรวจหาเชื้อ เอช ไอ วี

- * ตรวจเลือดหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ
เอช ไอ วี ที่ร่างกายสร้างขึ้น
- * ถ้าผลเป็นบวก แสดงว่าได้รับเชื้อ
เอช ไอ วี แล้ว
- * ถ้าผลเป็นลบ และเคยมีพฤติกรรม
เสี่ยงควรจะตรวจซ้ำหลังจากตรวจ
ครั้งแรกแล้ว 3 เดือน
- * ขณะรอการตรวจซ้ำไม่ควรมีพฤติกรรม
เสี่ยงต่อการติดเชื้ออีก



สถานบริการตรวจหาเชื้อ เอช ไอ วี

กรุงเทพมหานคร

- * คลินิกนิรนาม สภากาชาดไทย
- * โรงพยาบาลใหญ่ ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน
- * โรงพยาบาลบางรัก

ต่างจังหวัด

- * โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป
ของรัฐ
- * โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยทุกแห่ง
- * ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อเขต

