


โรคเน่าระดับดิน

ถั่วฝักยาว

ฝ้าย



โรคที่เกิดกับราก

โรครากเน่าของทุเรียน



โรครากเน่าของส้ม



โรคที่เกิดกับโคนต้น



โรคโคนเน่ามะเขือเทศ



โรคโคนเน่าทุเรียน



โรคโคนเน่าส้ม

โรคที่เกิดกับลำต้นและกิ่ง

โรคดำต้นเน่าทุเรียน



โรคต้นไหม้หน่อไม้ฝรั่ง



โรคที่เกิดกับใบ

โรคใบจุดพริก



โรคใบจุดกะน้ำ



โรคใบไหม้มันฝรั่ง

โรคที่เกิดกับพล



โรคกุ่มแห่งพริก (แอมแทรคโนส)



โรคผลเน่าสตรอเบอรี่

โรคผลเน่าส้ม



โรคหน้าและ

โรคเน่าและกะหล่ำปลี





โรคเน่าและกะหล่ำปลี

โรคเหี่ยว



โรคเหี่ยวมะเขือเทศ



รูปแบบของเชอรา ไตรโคเดอรมา



เชอสด



ชนิดผง



ชนิดเกล็ด



ชนิดเม็ด

การผลิตขยาย

เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด

อุปกรณ์ขยายเชื้อสด

หัวเชื้อราไตรโคเดอร์มา



ยางวง



ไข่



หม้อหุงข้าวไฟฟ้า



ปลายข้าว หรือ ข้าวสาร



น้ำ

ถุงพลาสติกทนร้อนขนาด 8X12 นิ้ว



ตักข้าวขณะร้อนใส่ถุง



พับปากถุง ปล่อยให้ข้าวอุ่น





เหยาะหัวเชื้อ

1ขวด (50 กรัม)

ใส่ได้ 80 ถุง

(ข้าวสุก 20 กก.)

รัดปากถุงเขย่าเบา ๆ เพื่อให้หัวเชื้อกระจายทั่วทั้งถุง



รวบถุงให้พองบริเวณปากถุง

ใช้เข็มแทง
15-20 ครั้ง/ถุง



หลังปั๊มเชื้อ 2 วัน



بيبخامأأاواؑنؑوؑاؑرؑؑ



หลังบ่มเชื้อ 7 วัน





การใช้เชื้อรา ไตรโคเดอร์มาชนิดสด

ใส่โค่น ร่องกันหลุม
๑



โรยโคนต้น 10-20 กรัม/ต้น

ใส่ในหลุมปลูกพืช



การคลุกเมล็ด

๑





๘ การฉุดพ่น









น้ำ

น้ำหมักผลไม้

ปุ๋ยปลา











การใส่ชื่อไปกบระบบการให้หน้า






ท่อส่งน้ำที่ต่อกับ
วาล์วปิด-เปิดน้ำ

ท่อดูดน้ำจากบ่อ
เก็บน้ำ

สายยางจากถัง
ผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มา




หัวจ่ายน้ำแบบสปริงเกอร์











การตลาดและการเชื่อมโยงเครือข่าย