



มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
KASETSART UNIVERSITY

รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมพริกพื้นเมือง
เล่มที่ 1

โดย นางสาวสิริกุล ะสี และคณะ

ธันวาคม 2559

สัญญาเลขที่ RDG5620003

รายงานฉบับสมบูรณ์

โครงการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมพืชพื้นเมือง

โครงการย่อยที่ 1 การรวบรวมและศึกษาลักษณะพันธุ์กรรมพืชพื้นเมืองของไทย

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาวสิริกุล วะสี | ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน |
| 2. นายกรัง สัตะธนี | ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน |
| 3. นางสาวบุปผารัฐ รอดภัย | ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน |
| 4. นายทัศนัย ชัยเพชร | ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน |
| 5. นางสาวยุพา สิทธิไกรพงษ์ | ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน |
| 6. นางสาววราภรณ์ สีนสภาพรพงศ์ | ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน |

โครงการย่อยที่ 2 การประเมินพันธุ์และพัฒนาพืชพื้นเมือง

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายกรัง สัตะธนี | ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน |
| 2. นางสาวสิริกุล วะสี | ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน |
| 3. นางสาววันนิสา พูลเดช | ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน |
| 4. นายอนุชา วงศ์ปารณีกุล | ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน |
| 5. นางสาวเฟิร์น อัครวงศ์ | นักศึกษาปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |

โครงการย่อยที่ 3 การประเมินลักษณะความต้านทานโรคของพืชพื้นเมืองและการปลูกพืชปลอดภัย

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นางพิสวรรณ เจียมสมบัติ | ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำแพงแสน |
| 2. นายจิระเดช แจ่มสว่าง | ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำแพงแสน |
| 3. นางสาวสิริกุล วะสี | ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน |
| 4. นางสาวบุญณา ศรีคำผั่ง | ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน |
| 5. นายสรายุทธ บุญสอน | นักศึกษาปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |

สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ความเห็นในรายงานนี้เป็นของผู้วิจัย สกว. ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป)

คำนำ

รายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการ “ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมพริกพื้นเมือง” ซึ่งมีโครงการย่อย 3 โครงการ ได้แก่

โครงการย่อยที่ 1 การรวบรวมและศึกษาลักษณะพันธุ์กรรมพริกพื้นเมืองของไทย

โครงการย่อยที่ 2 การประเมินพันธุ์และพัฒนาพันธุ์พริกพื้นเมือง

โครงการย่อยที่ 3 การประเมินลักษณะความต้านทานโรคของพริกพื้นเมืองและการปลูกพริกปลอดภัย

เมื่อประมวลผลการศึกษาทั้งสามโครงการ และเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ มีการจัดทำภาพและข้อมูลลักษณะพันธุ์ ทั้งสถานที่เก็บรวบรวม ลักษณะประจำพันธุ์ ความดีเด่นของสายพันธุ์ และลักษณะความต้านทานโรคแอนแทรคโนส โรคยอดเน่า และโรคจากไวรัส ทำให้เล่มรายงานมีความหนาแน่นมาก จึงได้จัดแบ่งเนื้อหาการรายงานออกเป็น 3 เล่ม ดังนี้

เล่มที่ 1 ผลการศึกษาของโครงการย่อยที่ 1

เล่มที่ 2 ผลการศึกษาของโครงการย่อยที่ 2

เล่มที่ 3 ผลการศึกษาของโครงการย่อยที่ 3 และ กิจกรรมอื่นๆ

ทั้งนี้ ได้จัดทำ สารบัญ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร บทนำ และวัตถุประสงค์ ไว้ทุกเล่ม

คณะวิจัย

ธันวาคม 2559

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	1
บทนำ	3
วัตถุประสงค์	4
เล่มที่ 1	
โครงการย่อยที่ 1 การรวบรวมและศึกษาลักษณะพันธุ์พริกพื้นเมืองของไทย	5
เครื่องมือและวิธีดำเนินงานวิจัย	6
ผลการดำเนินงาน	17
1. การรวบรวมและศึกษาลักษณะพันธุ์พริกพื้นเมือง	17
2. การศึกษาลักษณะทางพืชสวนและขยายเมล็ดพันธุ์	20
3. การเพาะกล้า และปลูกพริกพื้นเมืองส่งวิเคราะห์ความต้านทานโรค	50
4. ลักษณะพันธุ์และความต้านทานโรค	59
เอกสารอ้างอิง	187
เล่มที่ 2	
โครงการย่อยที่ 2 การประเมินพันธุ์และพัฒนาพริกพื้นเมือง	317
การประเมินพันธุ์และพัฒนาพริกพื้นเมือง	318
วิธีการดำเนินงานวิจัย	318
การบันทึกข้อมูล	318
ผลการประเมินพันธุ์	319
ข้อสังเกตจากการลวกและไม่ลวกผลพริกในน้ำเดือดก่อนนำไปผลิตพริกแห้งปลอดภัย	369
ที่มาของการทดลอง	370
วัตถุประสงค์ของการทดลอง	370
วิธีการ	370
ระยะเวลาทำการทดลอง	371
ผลการทดลอง	371
สรุป	378
บรรณานุกรม	379
การเก็บเมล็ดพันธุ์พริกพื้นเมืองให้คงลักษณะตามพันธุ์ดั้งเดิม	380
ขั้นตอนการปฏิบัติในการคัดเลือกและเก็บเมล็ดพันธุ์พริกพื้นเมืองให้มีลักษณะตามพันธุ์ดั้งเดิม	384

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

เล่มที่ 3

โครงการย่อยที่ 3 การประเมินลักษณะความต้านทานโรคของพันธุ์พริกพื้นเมืองและการปลูกพริก ปลอดภัย	387
1. คำนำ	388
2. วัตถุประสงค์	389
3. ทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจัยที่เคยมีมาก่อน	389
3.1 การรวบรวมสายพันธุ์พริกพื้นเมือง	389
3.2 โรคพริกที่สำคัญ	254
3.3 เทคนิคการปลูกเชื้อเพื่อทดสอบการก่อโรคและประเมินลักษณะความต้าน ทานโรค	390
3.4 เกณฑ์การประเมินลักษณะความต้านทานโรค	391
4. อุปกรณ์และวิธีการ	392
4.1 การประเมินความต้านทานต่อโรคยอดเน่าในสภาพโรงเรือน	392
4.2 การประเมินความต้านทานของพริกต่อโรคแอนแทรคโนสในห้องปฏิบัติการ	394
4.3 การประเมินความต้านทานของพริกต่อโรคใบด่างจุดวงแหวนเนื้อเยื่อตาย ในสภาพโรงเรือน	396
4.4 เกณฑ์ประเมินระดับความต้านทานต่อโรคของพริกพื้นเมือง	397
4.5 การศึกษาชนิดของเชื้อรา <i>Colletotrichum</i> สาเหตุโรคแอนแทรคโนสในแปลง ปลูกพริก	397
4.6 การปลูกพริกปลอดภัย	398
5. ผลและวิจารณ์	399
5.1 เชื้อราสาเหตุโรคยอดเน่า	399
5.2 การวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของดีเอ็นเอบริเวณ ITS เพื่อจำแนกชนิดเชื้อ	400
5.3 การก่อโรคและความรุนแรงของอาการโรคบนพริก <i>Capsicum</i> ที่เกิด จากเชื้อรา <i>C. cucurbitarum</i>	403
5.4 ผลการประเมินลักษณะความต้านทานโรคยอดเน่าของพริกพันธุ์พื้นเมืองใน สภาพโรงเรือน	407
5.5 การประเมินความต้านทานต่อโรคแอนแทรคโนสของพริกพื้นเมืองในสภาพ ห้องปฏิบัติการ	416
5.6 การประเมินความต้านทานต่อโรคใบด่างจุดวงแหวนของพริกพื้นเมือง ในสภาพโรงเรือน	418
5.7 การประเมินความต้านทานโรคในสภาพแปลงของพริกพื้นเมืองที่ศูนย์วิจัย พืชผักเขตร้อน	426
5.8 การปลูกพริกปลอดภัย	431
สรุปผลการวิจัย	432
6. เอกสารและสิ่งอ้างอิง	465

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ภาคผนวกโครงการย่อยที่ 3	468
กิจกรรมอื่นๆ	511
ภาคผนวก 1	519
ภาคผนวก 2	527
ภาคผนวก 3	535
ภาคผนวก 4	540

สารบัญตาราง

หน้า

เล่มที่ 1

โครงการย่อยที่ 1 การรวบรวมและศึกษาลักษณะพันธุ์กรรมพริกพื้นเมืองของไทย

ตารางที่ 1 สายพันธุ์พริกพื้นเมือง จำนวน 253 สายพันธุ์	9
ตารางที่ 2 รายชื่อสายพันธุ์พริกพื้นเมืองที่เก็บรวบรวมโดยแยกแต่ละจังหวัด	18
ตารางที่ 3 ปริมาณเมล็ดพันธุ์ และ จำนวนสายพันธุ์พริกที่เก็บเมล็ดพันธุ์ได้	20
ตารางที่ 4 ลักษณะการเจริญเติบโต ลักษณะดอก อายุเก็บเกี่ยวของพริกพื้นเมือง 253 สายพันธุ์	22
ตารางที่ 5 ผลผลิต ลักษณะผล และน้ำหนักเมล็ด (Bulk) ของพริกพื้นเมือง 253 สายพันธุ์	35
ตารางที่ 6 การจัดกลุ่มพริกพื้นเมืองตามสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)	52
ตารางที่ 7 ส่งพริกประเมินโรคแอนแทรคโนส <i>Colletotrichum</i> spp. โรคยอดเน่า <i>Choanephora cucurbitarum</i> และโรคไวรัส <i>Tomato necrotic ring spot</i> (TNRV)	54

เล่มที่ 2

โครงการย่อยที่ 2 การประเมินพันธุ์และพัฒนาพันธุ์พริกพื้นเมือง

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยลักษณะการเจริญเติบโต ลักษณะดอก อายุดอกบานและอายุเก็บเกี่ยวของพริกพันธุ์ CA 758 และ Super hot ที่ปลูกประเมินพันธุ์ 5 ครั้ง	321
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยของผลผลิต ลักษณะผล ความเผ็ดและความแปรปรวนของพริกพันธุ์ CA 758 และ Super hot ที่ปลูกประเมินพันธุ์ 5 ครั้ง	322
ตารางที่ 3.1 ประเภท ชนิดและลักษณะต่างๆด้านการเจริญเติบโตของพริกพื้นเมือง 38 พันธุ์ (สกว 1-สกว 40) ปลูกประเมินพันธุ์ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556 ถึง มีนาคม 2557	332
ตารางที่ 3.2 ประเภท ชนิดและลักษณะต่างๆด้านการเจริญเติบโตของพริกพื้นเมือง 59 พันธุ์ (สกว 41-สกว 100) ปลูกประเมินพันธุ์ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2557 ถึง มีนาคม 2558	334
ตารางที่ 3.3 ประเภท ชนิดและลักษณะต่างๆด้านการเจริญเติบโตของพริกพื้นเมือง 38 พันธุ์ (สกว 101-สกว 150) ปลูกประเมินพันธุ์ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2558 ถึง ธันวาคม 2558	337
ตารางที่ 3.4 ประเภท ชนิดและลักษณะต่างๆด้านการเจริญเติบโตของพริกพื้นเมือง 59 พันธุ์ (สกว 154-สกว 213) ปลูกประเมินพันธุ์ ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง พฤศจิกายน 2557	339
ตารางที่ 3.5 ประเภท ชนิดและลักษณะต่างๆด้านการเจริญเติบโตของพริกพื้นเมือง 33 พันธุ์ (สกว 151-สกว 153 และ สกว 214- สกว 253) ปลูกประเมินพันธุ์ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2558 ถึง มกราคม 2559	342

สารบัญตาราง (ต่อ)

	หน้า
ตารางที่ 4.1 ผลผลิต ลักษณะผล ความเผ็ดและความแปรปรวนในสายพันธุ์ของพริกพื้นเมือง 38 พันธุ์ (สกว 1-สกว 40) ปลุกประเมินพันธุ์ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556 ถึง มีนาคม 2557	344
ตารางที่ 4.2 ผลผลิต ลักษณะผล ความเผ็ดและความแปรปรวนในสายพันธุ์ของพริกพื้นเมือง 59 พันธุ์ (สกว 41-สกว 100) ปลุกประเมินพันธุ์ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2557 ถึง มีนาคม 2558	346
ตารางที่ 4.3 ผลผลิต ลักษณะผล ความเผ็ดและความแปรปรวนในสายพันธุ์ของพริกพื้นเมือง 38 พันธุ์ (สกว 101-สกว 150) ปลุกประเมินพันธุ์ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2558 ถึง ธันวาคม 2558	349
ตารางที่ 4.4 ผลผลิต ลักษณะผล ความเผ็ดและความแปรปรวนในสายพันธุ์ของพริกพื้นเมือง 59 พันธุ์ (สกว 154-สกว 213) ปลุกประเมินพันธุ์ ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง พฤศจิกายน 2557	351
ตารางที่ 4.5 ผลผลิต ลักษณะผล ความเผ็ดและความแปรปรวนในสายพันธุ์ของพริกพื้นเมือง 33 พันธุ์ (สกว 151-สกว 153 และ สกว 214- สกว 253) ปลุกประเมินพันธุ์ ระหว่าง เดือนสิงหาคม 2558 ถึง มกราคม 2559	354
ตารางที่ 5 พันธุ์พริกพื้นเมืองประเภทพริกใหญ่ จำนวน 7 พันธุ์	358
ตารางที่ 6 พันธุ์พริกพื้นเมืองประเภทพริกขี้นุผลใหญ่ จำนวน 12 พันธุ์	361
ตารางที่ 7 พันธุ์พริกพื้นเมืองประเภทพริกขี้นุผลเล็ก จำนวน 11 พันธุ์	365
ข้อสังเกตจากการลวกและไม่ลวกผลพริกในน้ำเดือดก่อนนำไปผลิตพริกแห้งปลอดภัย	
ตารางที่ 1 สภาพอากาศในช่วงตากพริกระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2558 ถึง วันที่ 15 เมษายน 2558	373
ตารางที่ 2 น้ำหนักผลพริกที่ผ่านกรรมวิธีลวกน้ำเดือดและไม่ลวก นำมาตากแห้งและเก็บรักษา เป็นเวลา 2,4 และ 6 เดือน	374
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์สีผลพริกแห้งที่ผ่านกรรมวิธีต่างกันที่อายุเก็บรักษา 14 วัน 3 เดือน และ 6 เดือน ด้วยเครื่องระบบ Hunter Lab	375
ตารางที่ 4 ผลการตรวจหาปริมาณสารอะฟลาทอกซิน (ppb) ชนิดต่างๆ ในผลพริกแห้งที่บรรจุ ในถุงพลาสติกธรรมดา หลังจากเก็บรักษานาน 4 และ 6 เดือน ในสภาพอุณหภูมิห้อง	376
เล่มที่ 3	
โครงการย่อยที่ 3 การประเมินลักษณะความต้านทานโรคของพันธุ์พริกพื้นเมือง	
ตารางที่ 1 เปอร์เซ็นต์ยอดเน่าของพริกคำนวณจากจำนวนข้อที่เน่าหลังจากปลูกเชื้อรา <i>Choanephora cucurbitarum</i> ไอโซเลท KPS63 บนพริกพันธุ์พื้นเมืองด้วย intact shoot tip technique	406

สารบัญตาราง (ต่อ)

	หน้า
ตารางที่ 2 ระดับความต้านทานต่อโรคยอดเน่าของพริกพื้นเมือง ประเมินจากค่าอัตราการติดเชื้อ (Disease incidence, % DI)	411
ตารางที่ 3 ระดับความต้านทานโรคยอดเน่าของพริกพื้นเมืองไทยจำนวน 214 พันธุ์ โดยประเมินจากคะแนนความรุนแรงของอาการโรค (disease severity, DS)	411
ตารางที่ 4 ระดับความต้านทานโรคยอดเน่าของพริกพื้นเมืองไทยจำนวน 214 พันธุ์ โดยประเมินจากค่าดัชนีการก่อโรค(disease index, DX)	412
ตารางที่ 5 ระดับความต้านทานโรคไวรัสของพริกพื้นเมือง 198 พันธุ์ กับเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อ (DI), อัตราความรุนแรง (DS) และดัชนีการก่อโรค (DX)	421
ตารางที่ 6 พริกพื้นเมืองที่แสดงลักษณะความต้านทานโรคยอดเน่า (WR) โรคแอนแทรคโนส (AN) และโรคใบด่างจุดวงแหวนเนื้อเยื่อตาย (TN) ในสภาพโรงเรือน	425
ตารางที่ 7 ผลการประเมินลักษณะความต้านทานของพริกพื้นเมืองต่อโรคยอดเน่า โรคแอนแทรคโนสและโรคใบด่างจุดวงแหวนเนื้อเยื่อตาย (TNRV) ในห้องปฏิบัติการ	434
ตารางที่ 8 ผลการประเมินลักษณะความต้านทานของพริกพื้นเมืองต่อโรคยอดเน่า โรคแอนแทรคโนสและโรคใบด่างจุดวงแหวนเนื้อเยื่อตายในแปลงปลูก	451
ภาคผนวกโครงการย่อยที่ 3	
ตารางผนวก ก. ผลการประเมินพริกพื้นเมืองที่ตอบสนองต่อเชื้อ <i>Choanephora cucurbitarum</i> สาเหตุโรคยอดเน่าจากค่าดัชนีการเกิดโรค (Disease index, DX) และแสดงค่าเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อ (Disease incidence, DI) และระดับความรุนแรงของอาการโรค (Disease severity, DS)	469
ตารางผนวก ข ผลการประเมินความต้านทานของพริกพื้นเมืองต่อโรคใบด่างจุดวงแหวนเนื้อเยื่อตายที่เกิดจากเชื้อ <i>Tomato necrotic ringspot virus</i> โดยใช้ค่าดัชนีการเกิดโรค (Disease index, DX) และแสดงค่าเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อ (Disease incidence, DI) และระดับความรุนแรงของอาการโรค (Disease severity, DS)	476
ตารางผนวก ค ผลการประเมินความต้านทานของพริกพื้นเมืองต่อโรคแอนแทรคโนส <i>Colletotrichum capsici</i> โดยใช้ค่าเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อ (Disease incidence, DI) และระดับความรุนแรงของอาการโรค (Disease severity, DS)	482
ตารางผนวก ง ผลการประเมินความต้านทานของพริกพื้นเมืองต่อโรคแอนแทรคโนส <i>Colletotrichum acutatum</i> โดยใช้ค่าเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อ (Disease incidence, DI) และระดับความรุนแรงของอาการโรค (Disease severity, DS)	496

สารบัญภาพ

หน้า

เล่มที่ 1

โครงการย่อยที่ 1 การรวบรวมและศึกษาลักษณะพันธุ์กรรมพริกพื้นเมืองของไทย

ภาพที่ 1 การปลูกพริกพื้นเมืองในโครงตาข่ายขนาด 3 x 3 x 2 เมตร	6
ภาพที่ 2 ลักษณะอาการโรคที่พบในแปลง	21
ภาพที่ 3 (ก) ดอกพริก <i>Capsicum annuum</i> กลีบดอกสีขาว เกสรตัวผู้สีม่วง (ข) ดอกพริก <i>Capsicum frutescens</i> กลีบดอกสีเขียว เกสรตัวผู้สีม่วง มีจำนวนดอกหลายดอกต่อข้อ	49

เล่มที่ 2

โครงการย่อยที่ 2 การประเมินพันธุ์และพัฒนาพันธุ์พริกพื้นเมือง

ภาพที่ 1 สภาพอากาศในช่วงปลูกประเมินพันธุ์ครั้งที่ 1 (1 พ.ย.56-15 เม.ย.57)	327
ภาพที่ 2 สภาพอากาศในช่วงปลูกประเมินพันธุ์ครั้งที่ 2 (21 พ.ค.57-5 พ.ย.57)	328
ภาพที่ 3 สภาพอากาศในช่วงปลูกประเมินพันธุ์ครั้งที่ 3 (19 ส.ค.57-6 มี.ค.58)	329
ภาพที่ 4 สภาพอากาศในช่วงปลูกประเมินพันธุ์ครั้งที่ 4 (16 มิ.ย.58-24 ธ.ค.58)	330
ภาพที่ 5 สภาพอากาศในช่วงปลูกประเมินพันธุ์ครั้งที่ 5 (16 ก.ค.58-20 ม.ค.59)	331

เล่มที่ 3

โครงการย่อยที่ 3 การประเมินลักษณะความต้านทานโรคของพันธุ์พริกพื้นเมือง

ภาพที่ 1 ลักษณะอาการของโรคยอดและผลเน่าของพริกจากแปลงพริกอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 และลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อรา <i>Choanephora cucurbitarum</i>	401
ภาพที่ 2 แผนภูมิ Neighbor-joining tree แสดงการวิเคราะห์ชนิดของเชื้อรา <i>Choanephora cucurbitarum</i> ไอโซเลท KPS63 สาเหตุโรคยอดเน่า โดยใช้ข้อมูลดีเอ็นเอบริเวณ ITS จัดทำด้วยโปรแกรม MEGA 6.0 ใช้ค่า Bootstrap 1,000 replications เชื้อราจีนัสอื่นในวงศ์ Choanephoraceae ที่นำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกัน ได้แก่ Blakeslea, Gilbertella, Zygorhynchus, Mycophyta	402
ภาพที่ 3 การปลูกเชื้อรา <i>Choanephora cucurbitarum</i> บนต้นพริกด้วยวิธีวางชิ้นส่วนของเชื้อบนรอยแผลที่เด็ดก้านใบออก ใช้เชื้อไอโซเลท KPS63 และต้นพริกพันธุ์ CA500 อายุ 8 สัปดาห์ ต้นพริกแสดงอาการเน่าภายใน 24 ชั่วโมง	404
ภาพที่ 4 การปลูกเชื้อรา <i>Choanephora cucurbitarum</i> บนต้นพริกด้วยวิธีวางชิ้นส่วนของเชื้อบนยอดพริกโดยไม่ทำแผล ใช้เชื้อไอโซเลท KPS63 และต้นพริกพันธุ์ CA500 อายุ 8 สัปดาห์ ต้นพริกแสดงอาการเน่าฉ่ำน้ำและพุบลง ภายใน 24 ชั่วโมง	404
ภาพที่ 5 กราฟแสดงระดับความรุนแรงอาการโรคยอดเน่าในระยะเวลา 1-7 วัน หลังจากปลูกเชื้อรา <i>Chonaneophora cucurbitarum</i> ไอโซเลท KPS63 บนพริกพื้นเมือง 10 พันธุ์ ด้วยวิธีวางชิ้นส่วนบนยอดโดยไม่ทำแผล (intact shoot tip technique) สร้างกราฟโดยใช้ค่าเปอร์เซ็นต์ยอดเน่าของพริกแต่ละพันธุ์ ใช้พันธุ์ CA500 เป็นสิ่งควบคุม (อ่อนแอ)	406

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 6 ระดับความรุนแรงของอาการโรคยอดเน่า (Disease severity, DS) ช่วง 0-4 คะแนน	409
ภาพที่ 7 ลักษณะอาการของพริกที่เชื้อรา <i>Choanephora cucurbitarum</i> เข้าทำลาย	410
ภาพที่ 8 กราฟแสดงความถี่ของจำนวนต้นพริกพื้นเมืองต่ออัตราก่อโรค (disease incidence, DI) หลังจากปลูกเชื้อ <i>Choanephora cucurbitarum</i> 7 วัน (ไม่พบพันธุ์ต้านทานโรค)	413
ภาพที่ 9 กราฟแสดงความถี่ของจำนวนต้นพริกพื้นเมืองต่อระดับความรุนแรงของโรค (disease severity, DI) หลังจากปลูกเชื้อ <i>Choanephora cucurbitarum</i> 7 วัน (พบพันธุ์ต้านทานโรค 53 พันธุ์)	414
ภาพที่ 10 กราฟแสดงความถี่ของจำนวนต้นพริกพื้นเมืองตามค่าการก่อโรคยอดเน่า Disease index (DX) หลังปลูกเชื้อ <i>Choanephora cucurbitarum</i> 7 วัน (พบพันธุ์ต้านทานโรค 7 พันธุ์)	415
ภาพที่ 11 ลักษณะโคโลนีของเชื้อรา <i>Colletotrichum capsici</i> (ซ้าย) และ <i>C.acutatum</i> (ขวา) บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA อายุ 7 วัน	416
ภาพที่ 12 วิธีการปลูกเชื้อรา <i>Colletotrichum</i> ลงบนผลพริกด้วยเข็มฉีดสปอร์ (ภาพบน) จากนั้น บ่มผลพริกที่ฉีดเชื้อแล้วไว้ในกล่องที่ให้ความชื้นเป็นเวลา 9 วัน ผลพริกที่ติดเชื้อเกิดอาการ แผลยุบตัวมีสีคล้ำหรือสีดำรอบบริเวณที่ฉีดเชื้อรา และพบสปอร์สีดำหรือส้มจำนวนมากบน แผลในภาพล่างเป็นผลพริกพันธุ์ CA313 ซ้าย ปลูกเชื้อ <i>C. capsici</i> ขวา: ปลูกเชื้อ <i>C.acutatum</i>	417
ภาพที่ 13 อาการของพริกพื้นเมืองที่ได้รับการปลูกเชื้อ <i>Tomato necrotic ringspot virus-CT1</i> แสดงระดับความรุนแรงของอาการ 4 ระดับ (1-4)	420
ภาพที่ 14 กราฟแสดงความถี่ของจำนวนพริกพื้นเมืองต่ออัตราการติดเชื้อไวรัส <i>Tomato necrotic ringspot virus</i> ไอโซเลท CT1 (พบพริกพันธุ์ต้านทานโรคมก 7 พันธุ์ ต้านทาน 8 พันธุ์ ทนทานต่อโรค 3 พันธุ์ และไม่เป็นโรค 2 พันธุ์)	422
ภาพที่ 15 กราฟแสดงความถี่ของจำนวนพริกพื้นเมืองในแต่ละระดับความรุนแรง เมื่อได้รับการปลูกเชื้อ <i>Tomato necrotic ringspot virus</i> (พบพันธุ์ต้านทานโรค 6 พันธุ์ ต้านทาน ปานกลาง 58 พันธุ์)	423
ภาพที่ 16 กราฟแสดงความถี่ของจำนวนพริกพื้นเมืองในแต่ละระดับของดัชนีการเกิดโรค (DX) หลังจากการปลูกเชื้อ <i>Tomato necrotic ringspot virus</i> 28 วัน (พบพันธุ์ต้านทานมาก 11 พันธุ์ และต้านทาน 14 พันธุ์)	424
ภาพที่ 17 ลักษณะอาการแผลสีดำปกคลุมด้วยสปอร์ของเชื้อราบนผลพริกที่เป็นโรคแอนแทรคโนส ที่พบในแปลงปลูกพืชของศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม	427
ภาพที่ 18 ลักษณะโคโลนีบนอาหาร PDA ของเชื้อรา <i>Colletotrichum</i> ที่แยกจากพริกที่ปลูกใน ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม	428
ภาพที่ 19 ลักษณะโคโคนีเดียของเชื้อรา <i>Colletotrichum</i> ที่แยกจากพริกในแปลงปลูก	429
ภาพที่ 20 แปลงปลูกพริกพื้นเมืองเพื่อประเมินความต้านทานต่อโรคในสภาพแปลงปลูกสำรวจโรค และประเมินการติดเชื้อ ความรุนแรง และสภาพการเกิดโรคทั่วไปพริกรวมทั้งเก็บผลผลิต เพื่อประเมินโรคบนผลพริก	431

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมพริกพื้นเมือง

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมพริกพื้นเมือง ได้รวบรวมพันธุ์พริกพื้นเมืองจำนวน 253 สายพันธุ์ จากพื้นที่ 48 จังหวัด ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และ ภาคใต้ นำมาศึกษาลักษณะพันธุ์ ได้ข้อมูลลักษณะทางพืชสวนและได้เมล็ดพันธุ์จำนวน 223 สายพันธุ์ เนื่องจากบางสายพันธุ์เก็บจากผลพริกแห้ง บางสายพันธุ์จากเชื้อพันธุ์กรรมศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อนเก็บรักษาไว้นานเกิน 15 ปี นอกจากนี้มีบางสายพันธุ์ที่นำมาปลูกแล้วไม่สามารถเจริญเติบโตให้ผลผลิตและเมล็ด จากลักษณะที่ศึกษาสามารถจัดกลุ่มพริกพื้นเมืองตามขนาดผลได้ดังนี้ พริกผลใหญ่มีขนาดความยาวผลมากกว่า 5 เซนติเมตร จำนวน 36 สายพันธุ์ พริกชี้หนูผลใหญ่ที่มีความยาวผล 3-12 เซนติเมตร จำนวน 135 สายพันธุ์ และพริกชี้หนูผลเล็กที่มีความยาวผลน้อยกว่า 3 เซนติเมตร จำนวน 82 สายพันธุ์ สายพันธุ์ที่สามารถผลิตเมล็ดได้มากกว่า 50 กรัมขึ้นไป มีจำนวน 125 สายพันธุ์ และสายพันธุ์ที่ผลิตเมล็ดได้น้อยกว่า 50 กรัม มีจำนวน 98 สายพันธุ์

การประเมินพันธุ์พริกพื้นเมืองเป็นการศึกษาการเจริญเติบโต ศักยภาพการให้ผลผลิต ปริมาณสารเผ็ด และความแปรปรวนหรือการปะปนของลักษณะต่างๆในสายพันธุ์ พันธุ์พริกพื้นเมืองทั้งหมด 253 พันธุ์ ประเมินพันธุ์ได้ 224 พันธุ์ พันธุ์ที่ไม่ได้ประเมินเป็นพันธุ์ที่ไม่ผลิตเชื่อมความงอกแล้วทำการปลูกประเมินพันธุ์ 5 ครั้งๆละ 30-60 พันธุ์ ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2556 ถึง มกราคม 2559 ซึ่งการปลูกประเมินพันธุ์แต่ละครั้งเป็นการปลูกในสภาพอากาศที่แตกต่างกันตามฤดูกาล ทำการเปรียบเทียบลักษณะทางปริมาณ เช่นความสูงต้น ความกว้างทรงพุ่ม ปริมาณสารเผ็ด และผลผลิต ซึ่งมีความแปรปรวนไปตามสภาพแวดล้อม การเปรียบเทียบพันธุ์จึงทำได้เฉพาะพันธุ์พริกที่ปลูกพร้อมกันเท่านั้น ส่วนการเปรียบเทียบพันธุ์ที่ปลูกต่างช่วงเวลาทำได้ยาก ต้องพิจารณาร่วมกับการแสดงออกของพันธุ์ CA 758 และพันธุ์ Superhot ที่ปลูกเป็นพันธุ์เปรียบเทียบทุกครั้งที่ปลูกประเมินพันธุ์

พริกพื้นเมือง 224 พันธุ์ เป็นพริกผลใหญ่ พริกชี้หนูผลใหญ่ และ พริกชี้หนูผลเล็ก พริกผลใหญ่จะออกดอกเร็วและเก็บเกี่ยวได้ก่อน โดยเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณ 110 วันหลังหยอดเมล็ด พริกชี้หนูผลเล็กมักจะออกดอกช้า อายุเริ่มเก็บผลผลิตประมาณ 130-150 วันหลังหยอดเมล็ด ส่วนพริกชี้หนูผลใหญ่ มีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 110-120 วันหลังหยอดเมล็ด พริกชี้หนูผลเล็กทุกพันธุ์เป็นพริกชนิด *C. frutescens* มีกลีบดอกสีเหลืองเขียว จำนวนดอกมากกว่า 1 ดอกต่อซ่อ อายุยืนนานกว่า 1 ปี และมีสารเผ็ดสูงกว่าพริกชนิด *C. annuum* พริกที่มีความเผ็ดมากกว่า 100,000 SHU มี 30 พันธุ์ ซึ่งทั้งหมดเป็นพันธุ์พริกชี้หนูผลเล็ก เช่น พริกชี้หนูสวน พริกกะเหรี่ยง พริกหอม พริกขาว พริกส้ม เป็นต้น

พริกเป็นพืชที่มีโอกาสผสมข้ามพันธุ์ได้ง่าย เนื่องจากเมื่อถึงระยะดอกบาน กลีบดอกเปิดออก และเกสรตัวเมียยื่นพ้นอับเกสรตัวผู้ เปิดโอกาสให้แมลงผสมเกสรได้อย่างอิสระ จึงพบว่าพริกพื้นเมืองเพียง 100 สายพันธุ์ที่มีลักษณะพันธุ์สม่ำเสมอ ส่วนอีก 124 พันธุ์มีการปะปนกันในสายพันธุ์มากบ้างน้อยบ้าง การพัฒนาพันธุ์พริกพื้นเมืองจึงเป็นการทำให้พริกพื้นเมืองมีลักษณะสม่ำเสมอภายในสายพันธุ์มากขึ้น สามารถทำได้โดยควบคุมการผสมเกสร เช่นการใช้ผ้าห่มดอกไว้ตั้งแต่ดอกยังตูมอยู่ หรือใช้กรงตาข่ายในล่อนครอบต้นพริกทั้งต้น แล้วเก็บผลที่แน่ใจว่าเกิดจากการผสมตัวเองใน

พริกต้นนั้นๆ นำไปทำเมล็ดพันธุ์ปลูกต่อ ซึ่งโครงการได้คัดเลือกต้นพริกที่ปลูกในโรงตาข่ายไนล่อน มีลักษณะผลตรงตามลักษณะดั้งเดิมของพันธุ์พริกพื้นเมืองนั้นๆ หุ้มดอกตูมด้วยสำลีและเก็บเมล็ดพันธุ์ได้ 150 พันธุ์ จากนั้นพิจารณาพริกพื้นเมืองที่ปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ต่างจากแหล่งปลูกดั้งเดิม มีศักยภาพทางผลผลิต มีลักษณะเด่นอื่นๆ เช่น ต้านทานโรค ผีเสื้อแมลงศัตรูพืช แมลงศัตรูพืชไม่ระบาด เปลือกบางตากแห้งง่าย ปริมาณสารแห้งสูง ร่วมกับการคิดเห็นของอาจารย์ วีระ ภาควิชาพืชสวน จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้รอบรู้เรื่องพริกจากการลงพื้นที่ปลูกจริง ที่รวบรวมความดีเด่นของพริกพื้นถิ่นทั่วประเทศ นำมาประมวลแล้วคัดเลือกพันธุ์พริกพื้นเมืองที่ดีที่สุดได้ 30 พันธุ์ ซึ่งพริกทั้ง 30 พันธุ์ได้รับการขยายเมล็ดพันธุ์ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นพันธุ์พริกสำหรับส่งกลับไปยังถิ่นเดิม และเป็นแหล่งพันธุ์กรรมพริกพื้นเมืองสำหรับผู้สนใจทั่วไป

ประเมินลักษณะความต้านทานต่อโรคพืชของพริกพื้นเมืองจำนวน 224 พันธุ์ที่ปลูกในแปลงสำหรับการประเมินพันธุ์ทั้งในระดับห้องปฏิบัติการ ในโรงเรือน และในแปลงทดลอง เตรียมเชื้อโรคพืช 3 ชนิด คือเชื้อรา *Choanephora cucurbitarum* สาเหตุโรคยอดเน่า เชื้อรา *Colletotrichum capsici*, *C. acutatum* สาเหตุโรคแอนแทรคโนส และเชื้อไวรัส *Tomato necrotic ringspot virus* สาเหตุโรคใบด่างจุดวงแหวนเนื้อเยื่อตาย สำหรับใช้ทดสอบการก่อโรคร่วมกับพริกในห้องปฏิบัติการและในโรงเรือน ส่วนในแปลงทดลองประเมินความต้านทานโรคในธรรมชาติโดยไม่ทำการปลูกเชื้อใดๆ โครงการนี้ได้พัฒนาวิธีการปลูกเชื้อรา *C. cucurbitarum* แบบวางชิ้นวันบนยอดพริกโดยไม่ทำแผล (intact shoot tip technique) เพื่อใช้เป็นเทคนิคปลูกเชื้อสำหรับประเมินพันธุ์พริกต้านทานโรคขึ้นใหม่ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงและวัดผลได้รวดเร็วภายใน 7 วัน สามารถจัดระดับความรุนแรงของอาการโรคได้ชัดเจน และพบว่าจากพริกพื้นเมือง 214 สายพันธุ์ที่นำมาทดสอบ มี 4 สายพันธุ์ที่ต้านทานโรค (resistant) ได้แก่ สกว 15 สกว 48 สกว 76 และ สกว 145 การปลูกเชื้อโรคแอนแทรคโนสบนผลพริกสีเขียวและสีแดงและวัดขนาดแผลที่เกิดจากการปลูกเชื้อ ทำให้ทราบระดับความรุนแรงของอาการโรคและพบว่าพริกผลเขียวที่ต้านทานโรคสูงได้แก่ สกว 73 สกว 174 สกว 106 สกว 102 สกว 139 สกว 65 และ สกว 67 ส่วนพริกผลแดงที่ต้านทานโรคสูงได้แก่ สกว 73 และ 174 นอกจากนี้ในกรณีที่ประเมินความต้านทานโรคแอนแทรคโนสจากเปอร์เซ็นต์การก่อโรคบนผลพริกสีเขียว พบว่าพันธุ์สกว 67 มีความต้านทานสูงเพียงพันธุ์เดียวเท่านั้นในขณะที่ผลสีแดงไม่พบพันธุ์ต้านทานโรคเลยสำหรับการประเมินความต้านทานโรคไวรัส พบว่ามีพริก 3 สายพันธุ์ที่ไม่เป็นโรค (immune) ได้แก่ สกว 58, สกว 72 และ สกว 94 พริก 2 สายพันธุ์ทนทานโรค (tolerant) ได้แก่ สกว 61 และ สกว 75 และพริก 22 สายพันธุ์ต้านทานโรค (resistant) การประเมินความต้านทานโรคพืชทั้ง 3 ชนิดในแปลงปลูกค่อนข้างมีอุปสรรคเนื่องจากโรคระบาดในแปลงขณะทำการทดลองไม่มีความสม่ำเสมอ จึงยังไม่มีผลสรุปของพันธุ์พริกที่มีความต้านทานต่อโรค แต่ได้รายงานข้อมูลที่เกิดขึ้นไว้เพื่อศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

บทนำ

เชื้อพันธุ์กรรมพืชถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าและควรปกป้องรักษาไว้ให้มีการปลูกอย่างยั่งยืน สร้างอาชีพให้กับชุมชน ความหลากหลายทางพันธุ์กรรมของพืชจำเป็นที่จะต้องอนุรักษ์และนำมาใช้ประโยชน์ จากการสำรวจและเก็บพันธุ์พริกโดยอาจารย์วิระ ภาคอุทัย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า ในหลายพื้นที่ของภาคต่างๆในประเทศไทย มีการปลูกพริกทั้งเป็นการค้า ปลูกแซมในสวนผลไม้หรือสวนยาง และปลูกในสวนหลังบ้านเพื่อการบริโภคในครัวเรือน มีความแตกต่างของลักษณะพันธุ์ ความนิยมในการบริโภค และลักษณะเฉพาะที่ปรับตัวเข้ากับสภาพพื้นที่ เช่น พริกที่ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพริกชี้หูผลใหญ่ ผลอ่อนสีเขียวเข้มใช้สำหรับการทำพริกแห้งและพริกป่นเมื่อผลสุกแดง หรือพริกผลอ่อนสีเขียวขาวสำหรับการบริโภคสด เป็นเครื่องเคียงในอาหารหลายชนิด ส่วนพริกที่ปลูกในภาคใต้ ส่วนมากเป็นพริกที่มีผลอ่อนสีเขียวเข้ม เพื่อใช้เป็นเครื่องปรุงในน้ำพริกแกงและน้ำจิ้มอาหารทะเล พริกชี้หูสวนมีปลูกมากในจังหวัดอุดรธานี ตราด กาญจนบุรี เป็นต้น นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ได้เก็บรวบรวมพันธุ์พริกจากพื้นที่ปลูกภายในประเทศ และนำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อศึกษาวิจัยลักษณะพันธุ์ ประเมินพันธุ์ และขยายเมล็ดพันธุ์ทั้งการเก็บรักษาและนำมาใช้ประโยชน์ต่อ จากข้อมูลเบื้องต้นของแหล่งรวมพันธุ์พริกทั้งจากอาจารย์วิระ ภาคอุทัย และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน พบว่า พริกพื้นเมืองของไทย มีทั้งพริกผลใหญ่และพริกผลเล็ก เป็นพริกที่มีลักษณะการเจริญเติบโต ลักษณะรูปร่างและคุณภาพผลพริกหลากหลาย มีลักษณะหลายๆอย่างปะปนกัน เพราะในการเก็บเมล็ดเพื่อรักษาพันธุ์ต่อไป มีทั้งการคัดเลือกต้นที่มีลักษณะดี และเก็บรวมจากต้นในแปลงปลูกที่ไม่มีการคัดเลือกต้น ทำให้พันธุ์พริกพื้นเมืองของไทย ยังคงมีความหลากหลายของลักษณะพันธุ์ ข้อดีของพริกพื้นเมือง คือ ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี ทนแล้ง ทนทานต่อการเข้าทำลายของโรคและแมลงศัตรูพืชบางชนิด ใช้ประโยชน์ได้ทั้งการบริโภคสดและแปรรูป มีการบริโภคที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น วิถีชีวิตของคนชนบท ยังคงผูกพันกับการบริโภคพริกแห้ง พริกป่น ที่ได้จากพันธุ์พริกประจำถิ่นมากกว่าการใช้พริกพันธุ์ลูกผสมตามท้องตลาดมาทำพริกแห้ง พริกป่นรับประทานในครัวเรือน

พริกพื้นเมืองส่วนใหญ่เป็นพริกชี้หู แต่ละท้องถิ่นมีพันธุ์พริกที่มีลักษณะบางประการ เฉพาะเจาะจงบ่งบอกถึงลักษณะของพันธุ์นั้นๆ ที่แตกต่างจากพันธุ์ในท้องถิ่นอื่น บางพันธุ์รู้จักกันกว้างขวางข้ามจังหวัด บางพันธุ์อาจมีเพียงภายในหมู่บ้านเล็กๆ เท่านั้นที่ใช้ประโยชน์ พันธุ์พริกพื้นเมืองบางพันธุ์ปลูกกันมานาน 2-3ชั่วอายุคน มีการเก็บเมล็ดพันธุ์สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นหรือแพร่กระจายไปตามการย้ายถิ่นที่อยู่ พันธุ์เหล่านี้จะมีลักษณะดีเด่นกว่าพันธุ์อื่นๆ จึงดำรงอยู่ได้ยาวนานและรู้จักกันแพร่หลาย อย่างไรก็ตาม การผลิตพริกเพื่อการค้าในปัจจุบันมีแนวโน้มที่เกษตรกรทั่วไปจะเน้นใช้สายพันธุ์พริกลูกผสมมากขึ้นตามความต้องการของตลาด ทำให้การปลูกพริกพื้นเมืองลดลง และอาจทำให้พันธุ์พริกพื้นเมืองสูญหายไปได้ในอนาคต ดังนั้น การรวบรวมพันธุ์ การศึกษา ลักษณะประจำพันธุ์ การประเมินความต้านทานโรค ประเมินศักยภาพผลผลิต วิเคราะห์ปริมาณสารเผ็ด คัดเลือกพันธุ์ที่ดีเด่น รวมทั้งการจัดเสวนา สร้างเครือข่ายระหว่างผู้ใช้ประโยชน์พริกพื้นเมือง จะเป็นแนวทางในการอนุรักษ์สิ่งล้ำค่าก่อนที่จะสูญหาย และยังสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพันธุ์ต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์

การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมพริกพื้นเมือง มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการเก็บรักษาพันธุ์ กำหนดลักษณะพันธุ์ เป็นแหล่งของเชื้อพันธุ์พริกที่จะนำไปพัฒนาพันธุ์ที่ดีต่อไป และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการสูญหายพันธุ์พริก
2. เป็นศูนย์เตรียมพันธุ์พริกสำหรับการสำรองใช้ในภาวะวิกฤติ
3. พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ แหล่งข้อมูลและอ้างอิงของพริกพื้นเมือง
4. เป็นศูนย์เครือข่ายการรวบรวมและพัฒนาพันธุ์พริกพื้นเมือง มีการสร้างเครือข่ายนักวิชาการสาขาต่างๆ ทั้งในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และต่างมหาวิทยาลัย เพื่อวิจัยพัฒนาพันธุ์พริกสำหรับการนำไปใช้ในการวิจัยต่อยอดและใช้ในเชิงพาณิชย์ต่อไป
5. สร้างนักวิจัยด้านการผลิตพริก สนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่านกระบวนการสร้างบัณฑิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เป็นผู้ช่วยวิจัย

โครงการย่อยที่ 1

การรวบรวมและศึกษาลักษณะพันธุกรรมพริกพื้นเมืองของไทย

Collection and Characterization of Thai Landrace Chili

โดย

นางสาวสิริกุล วะสี
นางสาวบุปผารัฐ รอดภัย
นางสาวยุพา สิทธิไกรพงษ์

นายกรุง สีตะธนี
นายทัศนัย ชัยเพชร
นางสาววราภรณ์ สิ้นสถาพรพงศ์

เครื่องมือและวิธีวิจัย (Materials and Methods)

การรวบรวมพันธุ์พริกพื้นเมืองทั้งหมด 253 สายพันธุ์ (ตารางที่ 1) ซึ่งเก็บรวบรวมจากแหล่งต่างๆ ดังนี้

1. นำมาจากเชื้อพันธุ์กรรมพริกที่ได้เก็บรวบรวมไว้ของศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม จำนวน 100 สายพันธุ์ และเก็บรวบรวมเพิ่มเติมใหม่ จำนวน 89 สายพันธุ์

2. รวบรวมจากการเก็บพริกพันธุ์พื้นเมืองโดย อาจารย์วีระ ภาควิชา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวบรวมพันธุ์พริกได้ทั้งหมดจำนวน 64 สายพันธุ์

วิธีวิจัย

เนื่องจากเมล็ดเชื้อพันธุ์กรรมพริกของศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อนและจากการเก็บพริกพันธุ์พื้นเมืองเพิ่มเติมมีจำนวนเมล็ดน้อย จึงต้องเพิ่มปริมาณเมล็ดให้เพียงพอต่อการประเมินพันธุ์ และประเมินลักษณะความต้านทานโรค โดยดำเนินงาน ดังนี้

1. ปลูกขยายเมล็ดและศึกษาลักษณะพันธุ์พริกพื้นเมืองจำนวน 253 สายพันธุ์ โดยแช่เมล็ดใน KNO_3 ความเข้มข้น 3% เป็นเวลา 6 ชั่วโมง เพื่อกระตุ้นการงอกและเพิ่มความเร็วในการงอก จากนั้นนำไปเพาะในถาดเพาะกล้าขนาด 72 หลุม จำนวน 1 เมล็ดต่อหลุม วัสดุเพาะได้แก่ พีทมอส ขุยมะพร้าว อัตราส่วน 1:1 ตันกล้าเริ่มงอกหลังเพาะประมาณ 5-7 วัน เมื่อดันกล้าอายุได้ประมาณ 30 วัน ย้ายลงแปลงปลูกแบบยกร่อง ใช้ระยะปลูก 0.75×0.50 เมตร ปลูกในโครงตาข่ายขนาด $3 \times 3 \times 2$ เมตร จำนวน 24 ต้นต่อสายพันธุ์ต่อโครงตาข่าย (ภาพที่ 1) เพื่อป้องกันการผสมข้ามพันธุ์ ให้น้ำตามร่องสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หลังย้ายปลูก 2 สัปดาห์ ให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ และ 21-0-0 อัตรา 3 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออายุต้นพริกได้ 1 เดือน เพิ่มอัตราปุ๋ยสูตร 21-0-0 เป็น 5 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากนั้น ให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ ทุก 15 วัน จนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต



ภาพที่ 1 การปลูกพริกพื้นเมืองในโครงตาข่ายขนาด $3 \times 3 \times 2$ เมตร


2. การบันทึกลักษณะด้านพืชสวน

บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต โดยใช้ Descriptor for Capsicum (*Capsicum* spp.) ของ IPGRI โดยมีรายละเอียดการบันทึกข้อมูลดังนี้

2.1 จำนวนวันออกดอกเมื่อดอกบาน 50 %


2.2 จำนวนวันเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งแรกและครั้งสุดท้าย

2.3 ลักษณะของดอก ได้แก่ ตำแหน่งดอก สีดอก



ลักษณะตำแหน่งดอก (1) Pendant (2) Intermediate (3) Erect


2.4 ลักษณะการเจริญเติบโตของทรงต้นเมื่อโตเต็มที่




ลักษณะทรงต้น (1) Prostrate (2) Intermediate or compact (3) Erect

2.5 ความสูงต้นและความกว้างทรงพุ่มเมื่อดอกบาน 50% เก็บผลผลิตครั้งแรก และเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งสุดท้าย

2.6 ลักษณะผล ได้แก่ รูปร่างผลบริเวณขั้ว รูปร่างผล สีผลแก่ สีผลสุก น้ำหนักผล (กรัม) ความกว้างผล(เซนติเมตร) ความยาวผล (เซนติเมตร) ความหนาเนื้อ (มิลลิเมตร)



รูปร่างผล (1) Elongate (2) Almost round (3) Triangular (4) Campanulate (5) Blocky



รูปร่างหัวผล (1) Acute (2) obtuse (3) Truncate (4) Cordate (5) Lobate

3. การเก็บเมล็ดพันธุ์ เก็บผลแก่ สุกแดง จากทุกต้นที่ปลูกในโรงตาข่าย เพื่อรักษารูปร่างพันธุ์กรรมของพริกแต่ละสายพันธุ์ บ่มผลในถุงตาข่ายประมาณ 2-3 วัน แล้วจึงเอาเมล็ดออกมาล้างเมล็ดให้แห้งในร่ม ประมาณ 5-7 วัน จึงเก็บใส่ถุงพลาสติก เก็บในห้องเย็น 15 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 45 เปอร์เซ็นต์

4. เพาะกล้าพริกพื้นเมือง ส่งประเมินความต้านทานโรคยอดเน่า และไวรัส ทุกเดือนๆละ 30 สายพันธุ์ จำนวน 10 ต้นต่อสายพันธุ์

5. ปลูกพริกพื้นเมืองในกระถาง เก็บผลส่งประเมินความต้านทานโรคแอนแทรคโนส ทุก 2 เดือนๆละ 10 สายพันธุ์

ตารางที่ 1 สายพันธุ์พริกพื้นเมือง จำนวน 253 สายพันธุ์

ลำดับ	รหัส	ชื่อพันธุ์	แหล่งรวบรวมพันธุ์	ผู้รวบรวม
1	สกว 1	พริกหัวเรียว	ต.อึปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ	อ.วีระ ภาควัตถุ
2	สกว 2	พริกหัวเรียว	ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ	อ.วีระ ภาควัตถุ
3	สกว 3	พริกขี้นุสว	ต.ชัยชุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์	อ.วีระ ภาควัตถุ
4	สกว 4	พริกมัน	ต.ชัยชุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์	อ.วีระ ภาควัตถุ
5	สกว 5	พริกสีดา	ต.คูคำ อ.ข้าสูง จ.ขอนแก่น	อ.วีระ ภาควัตถุ
6	สกว 6	พริกขี้นุสว	ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด	อ.วีระ ภาควัตถุ
7	สกว 7	พริกบางลี	ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์	อ.วีระ ภาควัตถุ
8	สกว 8	พริกวัดโบสถ์	อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก	อ.วีระ ภาควัตถุ
9	สกว 9	พริกวัดโบสถ์	อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก	อ.วีระ ภาควัตถุ
10	สกว 10	พริกวัดโบสถ์	อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก	อ.วีระ ภาควัตถุ
11	สกว 11	พริกมันพิชัย	ต.ป่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์	อ.วีระ ภาควัตถุ
12	สกว 12	พริกขี้นุสว	อ.สวี จ.ชุมพร	อ.วีระ ภาควัตถุ
13	สกว 13	พริกพม่า	ตลาดสดระนอง จ.ระนอง	อ.วีระ ภาควัตถุ
14	สกว 14	พริกขี้นุสว	อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์	อ.วีระ ภาควัตถุ
15	สกว 15	พริกยอดสนเล็ก	ตลาดสดเทศบาลชุมพร จ.ชุมพร	อ.วีระ ภาควัตถุ
16	สกว 16	พริกยอดสนเล็ก	ตลาดชุมพร จ.ชุมพร	อ.วีระ ภาควัตถุ
17	สกว 17	พริกขี้นุสว	ตลาดหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช	อ.วีระ ภาควัตถุ
18	สกว 18	พริกกะเหรี่ยง	อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์	อ.วีระ ภาควัตถุ
19	สกว 19	พริกกะเหรี่ยงหนองหญ้าปล้อง	ตลาดกลางท่ายาง จ.เพชรบุรี	อ.วีระ ภาควัตถุ
20	สกว 20	พริกแก้ว	ต.พันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์	อ.วีระ ภาควัตถุ
21	สกว 21	พริกแดง (ขี้นุสว)	ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน	อ.วีระ ภาควัตถุ
22	สกว 22	พริกเล็บมือนาง	ต.โพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย	อ.วีระ ภาควัตถุ
23	สกว 23	พริกหัวเรียว	จ.อุบลราชธานี	อ.วีระ ภาควัตถุ
24	สกว 24	พริกขี้นุสว	จ.ชุมพร	อ.วีระ ภาควัตถุ
25	สกว 25	พริกแซว	อ.ท่าวังผา จ.น่าน	อ.วีระ ภาควัตถุ
26	สกว 26	พริกข่อ	ต.เขื่อนใน อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี	อ.วีระ ภาควัตถุ
27	สกว 27	พริกมัน	ต.ศรีราษฎร์ อ.พพระ จ.ตาก	อ.วีระ ภาควัตถุ
28	สกว 28	พริกมัน	ตลาดพพระ อ.พพระ จ.ตาก	อ.วีระ ภาควัตถุ
29	สกว 29	พริกแดง/แดง	อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่	อ.วีระ ภาควัตถุ
30	สกว 30	พริกปอบพวง	ต.เจ้าทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ	อ.วีระ ภาควัตถุ

ตารางที่ 1 (ต่อ) สายพันธุ์พริกพื้นเมือง จำนวน 253 สายพันธุ์

ลำดับ	รหัส	ชื่อพันธุ์	แหล่งรวบรวมพันธุ์	ผู้รวบรวม
31	สกว 31	พริกน้อย	ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น	อ.วีระ ภาคอุทัย
32	สกว 32	พริกน้อย	ต.นาเสียว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ	อ.วีระ ภาคอุทัย
33	สกว 33	พริกกะเหรี่ยง	ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี	อ.วีระ ภาคอุทัย
34	สกว 34	พริกยอดสนเล็ก	ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ	อ.วีระ ภาคอุทัย
35	สกว 35	พริกเหลืองทอง	ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร	อ.วีระ ภาคอุทัย
36	สกว 36	พริกปลัก/พลาสติก	จ.นครพนม	อ.วีระ ภาคอุทัย
37	สกว 37	พริกกันชั้น	อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์	อ.วีระ ภาคอุทัย
38	สกว 38	พริกเหลือง	จ.นครปฐม	อ.วีระ ภาคอุทัย
39	สกว 39	พริกขี้หนูนา	ต.ท่าพริก อ.เมือง จ.ตราด	อ.วีระ ภาคอุทัย
40	สกว 40	พริกขี้หนูสวน	จ.ตราด	อ.วีระ ภาคอุทัย
41	สกว 41	พริกยอดสนด้านขุนทด	บุญธรรม หล้าทุ่ง	ศูนย์พืชผักฯ
42	สกว 42	พริกกะเหรี่ยงหนองหญ้าปล้อง	ตลาดท้ายาง จ.เพชรบุรี	ศูนย์พืชผักฯ
43	สกว 43	พริกขาว	เย็น ตาคำ อ.ร่องกวาง จ.แพร่	ศูนย์พืชผักฯ
44	สกว 44	พริก Off-Type หยกสยาม	จ.แพร่	ศูนย์พืชผักฯ
45	สกว 45	พริกบ้านยอด	อ.สองแคว จ.น่าน	อ.วีระ ภาคอุทัย
46	สกว 46	พริกบ้านยอด	อ.สองแคว จ.น่าน	อ.วีระ ภาคอุทัย
47	สกว 47	พริกกะเหรี่ยงทุ่งช้าง	อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน	อ.วีระ ภาคอุทัย
48	สกว 48	พริกอีปาด	งาน สกว.	ศูนย์พืชผักฯ
49	สกว 49	พริกขี้อ้วน	งาน สกว.	ศูนย์พืชผักฯ
50	สกว 50	พริกจินดายอดสน	งาน สกว.	ศูนย์พืชผักฯ
51	สกว 51	พริกดีปลาไหล	ตลาดบัว อ.บัว จ.น่าน	ศูนย์พืชผักฯ
52	สกว 52	พริกดอย	ตลาดบัว อ.บัว จ.น่าน	ศูนย์พืชผักฯ
53	สกว 53	พริกกระเทียม	ตลาดบัว อ.บัว จ.น่าน	ศูนย์พืชผักฯ
54	สกว 54	พริกดอย	ประถม พรหมวังชา ต.ศิลาเพชร อ.บัว จ.น่าน	ศูนย์พืชผักฯ
55	สกว 55	พริกขี้หนูนาแล	ทวิกา แจ้งดี ต.ศิลาแลง อ.บัว จ.น่าน	ศูนย์พืชผักฯ
56	สกว 56	พริกเมือง/กันห้อย	คำหล้า ระลึก ต.เจดีย์ชัย อ.บัว จ.น่าน	ศูนย์พืชผักฯ
57	สกว 57	พริกใหญ่บ้านก่ง	ชม คำแสน ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน	ศูนย์พืชผักฯ
58	สกว 58	พริกใหญ่ทุ่งน้าว	สุนทร มูลมามี ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่	ศูนย์พืชผักฯ
59	สกว 59	พริกขี้หนูสวน	วิลาพร ประนาถกุล ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์	ศูนย์พืชผักฯ
60	สกว 60	พริกสวนลับแล	ตลาดสดอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์	ศูนย์พืชผักฯ

ตารางที่ 1 (ต่อ) สายพันธุ์พริกพื้นเมือง จำนวน 253 สายพันธุ์

ลำดับ	รหัส	ชื่อพันธุ์	แหล่งรวบรวมพันธุ์	ผู้รวบรวม
61	สกว 61	พริกตุ้ม	ตลาดสดอุดรดิตถ์ จ. อุดรดิตถ์	ศูนย์พืชผักฯ
62	สกว 62	พริกชี้หนุห้องสูงแปลง 1	จันทร์ ทีจันทร์ ต.ชัยชุมพล อ.ลับแล จ.อุดรดิตถ์	ศูนย์พืชผักฯ
63	สกว 63	พริกชี้หนุห้องสูงแปลง 2	รวม ปิ่นทอง ต.ชัยชุมพล อ.ลับแล จ.อุดรดิตถ์	ศูนย์พืชผักฯ
64	สกว 64	พริกชี้หนุห้องสูงแปลง 3	สำเนียง อินทร์กัน ต.ชัยชุมพล อ.ลับแล จ.อุดรดิตถ์	ศูนย์พืชผักฯ
65	สกว 65	พริกหนุ่มลับแล	ประมวล พงษ์พิชิต ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุดรดิตถ์	ศูนย์พืชผักฯ
66	สกว 66	พริกแจว	บุญธรรม อุ่นวงศ์ ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก	ศูนย์พืชผักฯ
67	สกว 67	พริกใหญ่	บุญธรรม อุ่นวงศ์ ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก	ศูนย์พืชผักฯ
68	สกว 68	พริกหอม	ตลาดสดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก	ศูนย์พืชผักฯ
69	สกว 69	พริกแจวหอม	ตลาดสดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก	ศูนย์พืชผักฯ
70	สกว 70	พริกแม่แม่สอด	ตลาดสดฉัตรแก้ว อ.เมือง จ.พิษณุโลก	ศูนย์พืชผักฯ
71	สกว 71	พริกกะเหรี่ยง	ขจร ทองผาภูมิ จ. ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี	ศูนย์พืชผักฯ
72	สกว 72	พริกจินดา	วินิต คุณาคณ ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี	ศูนย์พืชผักฯ
73	สกว 73	พริกหัวเรือ	แดง สุ่มเมือง ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี	ศูนย์พืชผักฯ
74	สกว 74	พริกขาว	หน้อย จิตสิงห์ ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี	ศูนย์พืชผักฯ
75	สกว 75	พริกหัวเรือเย็น	ชม ศาสตรา ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ	ศูนย์พืชผักฯ
76	สกว 76	พริกหัวเรือเย็นบ้านอีปาด	คำผ่าน พุ่มแถว ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ	ศูนย์พืชผักฯ
77	สกว 77	พริกขาว	ตลาดสดเมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ	ศูนย์พืชผักฯ
78	สกว 78	พริกขาว/เครือ	ตลาดสดเมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ	ศูนย์พืชผักฯ
79	สกว 79	พริกบ้าน	ตลาดสดเมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ	ศูนย์พืชผักฯ
80	สกว 80	พริกชี้/หนัก	ภพ ชูทอง ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง	ศูนย์พืชผักฯ
81	สกว 81	พริกกะเหรี่ยง	พัชร สวัสดิ์กระจาย ต.ด่านแม่ฉลอป อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี	ศูนย์พืชผักฯ
82	สกว 82	พริกกะเหรี่ยงข้อ	พัชร สวัสดิ์กระจาย ต.ด่านแม่ฉลอป อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี	ศูนย์พืชผักฯ
83	สกว 83	พริกใหญ่	ตลาดนัดป่าจั่ว ต.ป่าจั่ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	ศูนย์พืชผักฯ
84	สกว 84	พริกเคียว	ตลาดสดแม่ชะจาน ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	ศูนย์พืชผักฯ
85	สกว 85	พริกแซว	ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน	อ.วีระ ภาควิทย
86	สกว 86	พริกม้ง	ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน	อ.วีระ ภาควิทย
87	สกว 87	พริกดำป่น1	ตลาดหนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ	ศูนย์พืชผักฯ
88	สกว 88	พริกดำป่น2	ตลาดหนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ	ศูนย์พืชผักฯ
89	สกว 89	พริกแจว	ครบ มีสันเทียะ ต.ลุ่มน้ำชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ	ศูนย์พืชผักฯ
90	สกว 90	พริกแจว	ครบ มีสันเทียะ ต.ลุ่มน้ำชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ	ศูนย์พืชผักฯ

ตารางที่ 1 (ต่อ) สายพันธุ์พริกพื้นเมือง จำนวน 253 สายพันธุ์

ลำดับ	รหัส	ชื่อพันธุ์	แหล่งรวบรวมพันธุ์	ผู้รวบรวม
91	สกว 91	พริกแจว	ครบ มีสันเทียะ ต.ลุ่มน้ำชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ	ศูนย์พืชผักฯ
92	สกว 92	พริกแจว	ครบ มีสันเทียะ ต.ลุ่มน้ำชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ	ศูนย์พืชผักฯ
93	สกว 93	พริกยอดสนใหญ่	ปัน อากกล้า ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ	ศูนย์พืชผักฯ
94	สกว 94	พริกยอดสนเล็ก	ปัน อากกล้า ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ	ศูนย์พืชผักฯ
95	สกว 95	พริกกระดุม	ต.โป่งน้ำร้อน อ.ผาง จ.เชียงใหม่	อ.วีระ ภาคอุทัย
96	สกว 96	พริกแขวหลังนา	ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน	อ.วีระ ภาคอุทัย
97	สกว 97	พริกชี้หูบ้านห้องสูง	ต.ชัยมงคล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์	อ.วีระ ภาคอุทัย
98	สกว 98	พริกครกแตก	-	อ.วีระ ภาคอุทัย
99	สกว 99	พริกจินดา	ตลาดหนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ	ศูนย์พืชผักฯ
100	สกว 100	พริกชี้หูบ้านห้องสูง	จันทร์ ทิจันทร์ ต.ชัยชุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์	ศูนย์พืชผักฯ
101	สกว 101	พริกชี้หู	รวม ปันทอง ต.ชัยชุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์	ศูนย์พืชผักฯ
102	สกว 102	พริกใหญ่	รวม ปันทอง ต.ชัยชุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์	ศูนย์พืชผักฯ
103	สกว 103	พริกอีโต้ะ	อุปลัมภ์ ฉายาเรือง ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด	ศูนย์พืชผักฯ
104	สกว 104	พริกนา-1	อุปลัมภ์ ฉายาเรือง ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด	ศูนย์พืชผักฯ
105	สกว 105	พริกนา-2	อุปลัมภ์ ฉายาเรือง ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด	ศูนย์พืชผักฯ
106	สกว 106	พริกหอมตราด	อุปลัมภ์ ฉายาเรือง ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด	ศูนย์พืชผักฯ
107	สกว 107	พริกแหลมกลัด	อุปลัมภ์ ฉายาเรือง ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด	ศูนย์พืชผักฯ
108	สกว 108	พริกชี้หูสวน	สายัน ศรีสำราญ ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด	ศูนย์พืชผักฯ
109	สกว 109	พริกชี้หูสวน	ตลาดสดเทศบาลจันทบุรี จ.จันทบุรี	ศูนย์พืชผักฯ
110	สกว 110	พริกจินดาเขมร	ตลาดวัดลุ่ม ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง	ศูนย์พืชผักฯ
111	สกว 111	พริกชี้หูสวน	ตลาดวัดลุ่ม ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง	ศูนย์พืชผักฯ
112	สกว 112	พริกชี้หูสวน	วินัย เจริญพงศ์ ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง	ศูนย์พืชผักฯ
113	สกว 113	พริกชี้หูสวน ต้น1	มานพ คงควาริ ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง	ศูนย์พืชผักฯ
114	สกว 114	พริกชี้หูสวน ต้น2	มานพ คงควาริ ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง	ศูนย์พืชผักฯ
115	สกว 115	พริกชี้หูสวน ต้น3	มานพ คงควาริ ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง	ศูนย์พืชผักฯ
116	สกว 116	พริกตุ้ม	รานี แก้วบัวขาว ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง	ศูนย์พืชผักฯ
117	สกว 117	พริกยอดสนเล็ก	ตลาดริมโขง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	อ.วีระ ภาคอุทัย
118	สกว 118	พริกชี้หูเมือง	อุทัย จันทรหอม ต.ม่อนปิ่น อ.ผาง จ.เชียงใหม่	ศูนย์พืชผักฯ
119	สกว 119	พริกชี้หูแต่	สุรพงษ์ ดีบมา ต.เวียง อ.ผาง จ.เชียงใหม่	ศูนย์พืชผักฯ
120	สกว 120	พริกแตกลาง	เพ็ญศรี กันที ต.เวียง อ.ผาง จ.เชียงใหม่	ศูนย์พืชผักฯ

ตารางที่ 1 (ต่อ) สายพันธุ์พริกพื้นเมือง จำนวน 253 สายพันธุ์

ลำดับ	รหัส	ชื่อพันธุ์	แหล่งรวบรวมพันธุ์	ผู้รวบรวม
121	สกว 121	พริกแด็กกลาง	ขวัญ เครือเงิน ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่	ศูนย์พืชผักฯ
122	สกว 122	พริกเขียว	ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	ศูนย์พืชผักฯ
123	สกว 123	พริกแด็กเชียงดาว	ตลาดเมืองใหม่ ต.ช้างม่วย อ.เมือง จ.เชียงใหม่	ศูนย์พืชผักฯ
124	สกว 124	พริกแด็กใหญ่ลำพูน	ตลาดเมืองใหม่ ต.ช้างม่วย อ.เมือง จ.เชียงใหม่	ศูนย์พืชผักฯ
125	สกว 125	พริกค้อยแม่สะเรียง	ตลาดเมืองใหม่ ต.ช้างม่วย อ.เมือง จ.เชียงใหม่	ศูนย์พืชผักฯ
126	สกว 126	พริกส้ม/ป๊อป/พวง	ตลาดชุมแพ จ.ขอนแก่น	อ.วีระ ภาควิชา
127	สกว 127	พริกเดือยไก่	ต.เขาวีเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง	ศูนย์พืชผักฯ
128	สกว 128	พริกซี	จ.นครศรีธรรมราช	ศูนย์พืชผักฯ
129	สกว 129	พริกยอดสนเล็ก	จ.หนองคาย	อ.วีระ ภาควิชา
130	สกว 130	พริกขี้หนูบ้านปางแก	บ.ปางแก ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน	อ.วีระ ภาควิชา
131	สกว 131	พริกน้อย/พริกตุ้ม	อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย	อ.วีระ ภาควิชา
132	สกว 132	พริกห้อยฝาง/พริกป๊อป	อ.คอนลาน จ.ชัยภูมิ	อ.วีระ ภาควิชา
133	สกว 133	พริกช่อระย้า	จ.ราชบุรี	ศูนย์พืชผักฯ
134	สกว 134	พริกกะเหรี่ยง	จ.ราชบุรี	ศูนย์พืชผักฯ
135	สกว 135	พริกป๊อป	จ.กาญจนบุรี	ศูนย์พืชผักฯ
136	สกว 136	พริกกะเหรี่ยงหนองหญ้าปล้อง	ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี	ศูนย์พืชผักฯ
137	สกว 137	พริกม้ง	อ.พบพระ จ.ตาก	ศูนย์พืชผักฯ
138	สกว 138	พริกม้ง	อ.พบพระ จ.ตาก	ศูนย์พืชผักฯ
139	สกว 139	พริกขี้หนู/ติปลี่	ต.สังาม อ.สมุย จ.สุราษฎร์ธานี	ศูนย์พืชผักฯ
140	สกว 140	พริกกะเหรี่ยง	ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่	ศูนย์พืชผักฯ
141	สกว 141	พริกเลื้อย	ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม	ศูนย์พืชผักฯ
142	สกว 142	พริกกะเหรี่ยง	จ.กาญจนบุรี	ศูนย์พืชผักฯ
143	สกว 143	พริกขาว	ต.ด่านแม่ฉลอป อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี	ศูนย์พืชผักฯ
144	สกว 144	พริกส้มปากปวน	ต.ผาบ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย	ศูนย์พืชผักฯ
145	สกว 145	พริกใหญ่วัดโบสถ์	อ. วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก	อ.วีระ ภาควิชา
146	สกว 146	พริกจินดาวัดโบสถ์	อ. วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก	อ.วีระ ภาควิชา
147	สกว 147	พริกแซวพื้นเมือง	ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน	อ.วีระ ภาควิชา
148	สกว 148	พริกพื้นเมืองบ้านก่ง	ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน	อ.วีระ ภาควิชา
149	สกว 149	พริกจินดาพื้นเมือง	ต.ดอนแดงใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี	อ.วีระ ภาควิชา
150	สกว 150	พริกแซวกระเทียม	ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน	อ.วีระ ภาควิชา

ตารางที่ 1 (ต่อ) สายพันธุ์พริกพื้นเมือง จำนวน 253 สายพันธุ์

ลำดับ	รหัส	ชื่อพันธุ์	แหล่งรวบรวมพันธุ์	ผู้รวบรวม
151	สกว 151	พริกจินดาดำ	ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์	อ.วีระ ภาคอุทัย
152	สกว 152	พริกสร้อยสน	ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์	อ.วีระ ภาคอุทัย
153	สกว 153	พริกยอดสน	อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ	อ.วีระ ภาคอุทัย
154	สกว 154	CA032 พริกเตี้ยไก่	อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี	ศูนย์พืชผักฯ
155	สกว 155	CA034 พริกหอมสีขาว	อ.สระแก้ว จ.ปราจีนบุรี	ศูนย์พืชผักฯ
156	สกว 156	CA050 พริกขี้หนู	อ.เมือง จ.ตราด	ศูนย์พืชผักฯ
157	สกว 157	CA052 พริกขี้หนู	อ.เมือง จ.ตราด	ศูนย์พืชผักฯ
158	สกว 158	CA053 พริกขี้หนู-กรุงเทพ	อ.เมือง จ.ตราด	ศูนย์พืชผักฯ
159	สกว 159	CA054 พริกขี้หนูป้านยาว	อ.เมือง จ.ตราด	ศูนย์พืชผักฯ
160	สกว 160	CA062 พริกขี้หนู	จ.ระยอง	ศูนย์พืชผักฯ
161	สกว 161	CA071 พริกหอม	อ.บ้านนา จ.นครนายก	ศูนย์พืชผักฯ
162	สกว 162	CA111 พริกจินดา	อ.เมือง จ.เลย	ศูนย์พืชผักฯ
163	สกว 163	CA130 พริกขี้หนู	อ.เมือง จ.สกลนคร	ศูนย์พืชผักฯ
164	สกว 164	CA131 พริกขี้หนู	อ.เมือง จ.สกลนคร	ศูนย์พืชผักฯ
165	สกว 165	CA138 พริกขี้หนู	อ.เมือง จ.นครพนม	ศูนย์พืชผักฯ
166	สกว 166	CA139 พริกขี้หนู	อ.เมือง จ.นครพนม	ศูนย์พืชผักฯ
167	สกว 167	CA141 พริกขี้หนู	อ.เมือง จ.นครพนม	ศูนย์พืชผักฯ
168	สกว 168	CA143 พริกขี้หนู	อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม	ศูนย์พืชผักฯ
169	สกว 169	CA150 พริกขี้หนู	อ.เมือง จ.นครพนม	ศูนย์พืชผักฯ
170	สกว 170	CA170 พริกขี้หนู	อ.เมือง จ.อุบลราชธานี	ศูนย์พืชผักฯ
171	สกว 171	CA172 พริกขี้หนู	อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ	ศูนย์พืชผักฯ
172	สกว 172	CA175 พริกขี้หนู	อ.ราศรีไศล จ.ศรีสะเกษ	ศูนย์พืชผักฯ
173	สกว 173	CA177 พริกขี้หนู	อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ	ศูนย์พืชผักฯ
174	สกว 174	CA189 พริกขี้หนู	อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น	ศูนย์พืชผักฯ
175	สกว 175	CA198 พริกขี้หนู	อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	ศูนย์พืชผักฯ
176	สกว 176	CA218 พริกขี้หนู	อ.เมือง จ.อุบลราชธานี	ศูนย์พืชผักฯ
177	สกว 177	CA224 พริกขี้หนู	อ.เมือง จ.อุบลราชธานี	ศูนย์พืชผักฯ
178	สกว 178	CA225 พริกขี้หนู	อ.เมือง จ.อุบลราชธานี	ศูนย์พืชผักฯ
179	สกว 179	CA262 พริกขี้หนูเหลือง	อ.เมือง จ.ยะลา	ศูนย์พืชผักฯ
180	สกว 180	CA274 พริกขี้หนู	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	ศูนย์พืชผักฯ

ตารางที่ 1 (ต่อ) สายพันธุ์พริกพื้นเมือง จำนวน 253 สายพันธุ์

ลำดับ	รหัส	ชื่อพันธุ์	แหล่งรวบรวมพันธุ์	ผู้รวบรวม
181	สกว 181	CA275 พริกขี้หนุเกษตร	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	ศูนย์พืชผักฯ
182	สกว 182	CA276 พริกขี้หนุเกษตร	อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี	ศูนย์พืชผักฯ
183	สกว 183	CA281 พริกขี้หนุ	อ.เมือง จ.ชุมพร	ศูนย์พืชผักฯ
184	สกว 184	CA283 พริกขี้หนุ	อ.กระบุรี จ.ระนอง	ศูนย์พืชผักฯ
185	สกว 185	CA285 พริกสวน	อ.กระบุรี จ.ระนอง	ศูนย์พืชผักฯ
186	สกว 186	CA286 พริกขี้หนุ	อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา	ศูนย์พืชผักฯ
187	สกว 187	CA291 พริกขี้หนุสวน	อ.เมือง จ.ลพบุรี	ศูนย์พืชผักฯ
188	สกว 188	CA312 พริกขี้หนุ	อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี	ศูนย์พืชผักฯ
189	สกว 189	CA316 พริกขี้หนุ	อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี	ศูนย์พืชผักฯ
190	สกว 190	CA317 พริกขี้หนุสวน	อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี	ศูนย์พืชผักฯ
191	สกว 191	CA318 พริกขี้หนุ	อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี	ศูนย์พืชผักฯ
192	สกว 192	CA320 พริกจินดา	อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี	ศูนย์พืชผักฯ
193	สกว 193	CA322 พริกขี้หนุ	อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี	ศูนย์พืชผักฯ
194	สกว 194	CA335 พริกขี้หนุ	อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี	ศูนย์พืชผักฯ
195	สกว 195	CA341 พริกขี้หนุสวน	อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี	ศูนย์พืชผักฯ
196	สกว 196	CA346 พริกจินดา	อ.จอมบึง จ.ราชบุรี	ศูนย์พืชผักฯ
197	สกว 197	CA350 พริกกะเหรี่ยง	อ.จอมบึง จ.ราชบุรี	ศูนย์พืชผักฯ
198	สกว 198	CA353 พริกขี้หนุ	อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี	ศูนย์พืชผักฯ
199	สกว 199	CA355 พริกกะเหรี่ยง	อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี	ศูนย์พืชผักฯ
200	สกว 200	CA364 พริกหัวสีท่น	-	ศูนย์พืชผักฯ
201	สกว 201	CA368 พริกขี้หนุบางเลน	-	ศูนย์พืชผักฯ
202	สกว 202	CA369 พริกหัวเรืออุบล	จ.อุบลราชธานี	ศูนย์พืชผักฯ
203	สกว 203	CA372 พริกขี้หนุสวน	-	ศูนย์พืชผักฯ
204	สกว 204	CA387 พริกขี้หนุดอน	จ.อุดรธานี	ศูนย์พืชผักฯ
205	สกว 205	CA394 พริกขี้หนุเมืองเพชรบูรณ์	จ.เพชรบูรณ์	ศูนย์พืชผักฯ
206	สกว 206	CA397 พริกนกบ้านโป่ง	-	ศูนย์พืชผักฯ
207	สกว 207	CA398 พริกขี้หนุไทย	-	ศูนย์พืชผักฯ
208	สกว 208	CA399 พริกขี้หนุพิษณุโลก	จ.พิษณุโลก	ศูนย์พืชผักฯ
209	สกว 209	CA848 พริกกะเหรี่ยง	อ.แม่สอด-ดอยมูเซอ จ.ตาก	ศูนย์พืชผักฯ
210	สกว 210	CA854 พริกขี้หนุ	จ.ตราด	ศูนย์พืชผักฯ

ตารางที่ 1 (ต่อ) สายพันธุ์พริกพื้นเมือง จำนวน 253 สายพันธุ์

ลำดับ	รหัส	ชื่อพันธุ์	แหล่งรวบรวมพันธุ์	ผู้รวบรวม
211	สกว 211	CA857 พริกขี้หนุผลห้อย	-	ศูนย์พืชผัก
212	สกว 212	CA858 พริกขี้หนุผลยาว	จ.ขอนแก่น	ศูนย์พืชผัก
213	สกว 213	CA859 พริกขี้หนุผลยาว	จ.ขอนแก่น	ศูนย์พืชผัก
214	สกว 214	CA860 พริกขี้หนุผลสั้น	จ.ขอนแก่น	ศูนย์พืชผัก
215	สกว 215	CA884 พริกขี้หนุเม็ดใหญ่	จ.กาญจนบุรี	ศูนย์พืชผัก
216	สกว 216	CA933 พริกขี้หนุ	อ.ธาตุพนม จ.นครพนม	ศูนย์พืชผัก
217	สกว 217	CA935 พริกขี้หนุ	อ.ธาตุพนม จ.นครพนม	ศูนย์พืชผัก
218	สกว 218	CA943 พริกขี้หนุ	อ.ผาง จ.เชียงใหม่	ศูนย์พืชผัก
219	สกว 219	CA945 พริกขี้หนุ	ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร	ศูนย์พืชผัก
220	สกว 220	CA976 พริกขี้หนุ	บ.เก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี	ศูนย์พืชผัก
221	สกว 221	CA984 พริกขี้หนุ	อ.เมือง จ.ระยอง	ศูนย์พืชผัก
222	สกว 222	CA985 พริกขี้หนุ	อ.เมือง จ.ระยอง	ศูนย์พืชผัก
223	สกว 223	CA986 พริกขี้หนุ	อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี	ศูนย์พืชผัก
224	สกว 224	CA987 พริกขี้หนุ	อ.เมือง จ.สระแก้ว	ศูนย์พืชผัก
225	สกว 225	CA988 พริกขี้หนุสวน	ต.วังดัง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี	ศูนย์พืชผัก
226	สกว 226	CA1017 พริกขี้หนุสีทน MG-21	จ.นครพนม	ศูนย์พืชผัก
227	สกว 227	CA1018 พริกขี้หนุสีทน MG-22	จ.นครพนม	ศูนย์พืชผัก
228	สกว 228	CA1143 พริกขี้หนุ	อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม	ศูนย์พืชผัก
229	สกว 229	CA1161 พริกขี้หนุ	อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม	ศูนย์พืชผัก
230	สกว 230	CA1175 พริกขี้หนุ	อ.บันนังสตา จ.ยะลา	ศูนย์พืชผัก
231	สกว 231	CA1176 พริกขี้หนุ	อ.แกลง จ.จันทบุรี	ศูนย์พืชผัก
232	สกว 232	CA1259 พริกขี้หนุเม็ดใหญ่	อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี	ศูนย์พืชผัก
233	สกว 233	CA1260 พริกขี้หนุเม็ดใหญ่	อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	ศูนย์พืชผัก
234	สกว 234	CA1261 พริกขี้หนุ	อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา	ศูนย์พืชผัก
235	สกว 235	CA1263 พริกขี้หนุ	อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี	ศูนย์พืชผัก
236	สกว 236	CA1271 พริกขี้หนุเม็ดใหญ่	อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี	ศูนย์พืชผัก
237	สกว 237	CA1280 พริกขี้หนุ	อ.เมือง จ.พิจิตร	ศูนย์พืชผัก
238	สกว 238	CA1282 พริกขี้หนุ	อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร	ศูนย์พืชผัก
239	สกว 239	CA1288 พริกขี้หนุเม็ดขาว	-	ศูนย์พืชผัก
240	สกว 240	CA1290 พริกขี้หนุ	อ.เมือง จ.น่าน	ศูนย์พืชผัก

ตารางที่ 1 (ต่อ) สายพันธุ์พริกพื้นเมือง จำนวน 253 สายพันธุ์ และปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้

ลำดับ	รหัส	ชื่อพันธุ์	แหล่งรวบรวมพันธุ์	ผู้รวบรวม
241	สกว 241	CA1329 พริกขี้หนู	จ.ขอนแก่น	ศูนย์พืชผัก
242	สกว 242	CA1338 พริกขี้หนู P#348	จ.กรุงเทพมหานคร	ศูนย์พืชผัก
243	สกว 243	CA1366 พริกหอม	อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร	ศูนย์พืชผัก
244	สกว 244	CA1372 พริกขี้หนู	จ.สระแก้ว	ศูนย์พืชผัก
245	สกว 245	CA1381 พริกขี้หนู	อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี	ศูนย์พืชผัก
246	สกว 246	CA1399 พริกขี้หนู	อ.แม่ทะ จ.ลำปาง	ศูนย์พืชผัก
247	สกว 247	CA1412 พริกขี้หนู	จ.นครราชสีมา	ศูนย์พืชผัก
248	สกว 248	CA1413 พริกขี้หนู	จ.ศรีสะเกษ	ศูนย์พืชผัก
249	สกว 249	CA1435 พริกขี้หนู	อ.เมือง จ.ขอนแก่น	ศูนย์พืชผัก
250	สกว 250	CA1453 พริกสามเดือน ผล 1	อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร	ศูนย์พืชผัก
251	สกว 251	CA1884 พริกขี้หนู	-	ศูนย์พืชผัก
252	สกว 252	CA1888 พริกขี้หนูสวนกระเทียม	-	ศูนย์พืชผัก
253	สกว 253	CA1891 พริกขี้หนู	-	ศูนย์พืชผัก

ผลการดำเนินงาน

1. การรวบรวมและศึกษาลักษณะพันธุ์พริกพื้นเมือง

การเก็บรวบรวมพริกพื้นเมืองจำนวน 253 สายพันธุ์ เก็บรวบรวมมาจาก ภาคเหนือ ในพื้นที่ 8 จังหวัด จำนวน 64 สายพันธุ์ ภาคกลาง ในพื้นที่ 9 จังหวัด จำนวน 22 สายพันธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่ 14 จังหวัด จำนวน 73 สายพันธุ์ ภาคตะวันออก ในพื้นที่ 5 จังหวัด จำนวน 30 สายพันธุ์ ภาคตะวันตก ในพื้นที่ 5 จังหวัด จำนวน 30 สายพันธุ์ ภาคใต้ ในพื้นที่ 7 จังหวัด จำนวน 20 สายพันธุ์ และไม่ได้ระบุแหล่งที่มา 14 สายพันธุ์ (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 รายชื่อสายพันธุ์พริกพื้นเมืองที่เก็บรวบรวมโดยแยกแต่ละจังหวัด

ลำดับ	แหล่งที่มา	รหัส สกว																			จำนวน สายพันธุ์
ภาคเหนือ																					
1	เชียงใหม่	สกว 29	สกว 95	สกว 118	สกว 119	สกว 120	สกว 121	สกว 123	สกว 124	สกว 125	สกว 140	สกว 218									11
2	เชียงราย	สกว 83	สกว 84	สกว 122																	3
3	ลำพูน	สกว 21																			1
4	ลำปาง	สกว 246																			1
5	แพร่	สกว 43	สกว 44	สกว 58	สกว 149																4
6	น่าน	สกว 25	สกว 45	สกว 46	สกว 47	สกว 51	สกว 52	สกว 53	สกว 54	สกว 55	สกว 56	สกว 57	สกว 85	สกว 86	สกว 96	สกว 130	สกว 147	สกว 148	สกว 150	สกว 240	19
7	พิษณุโลก	สกว 8	สกว 9	สกว 10	สกว 66	สกว 67	สกว 68	สกว 69	สกว 70	สกว 145	สกว 146	สกว 208									11
8	อุตรดิตถ์	สกว 3	สกว 4	สกว 11	สกว 59	สกว 60	สกว 61	สกว 62	สกว 63	สกว 64	สกว 65	สกว 97	สกว 100	สกว 101	สกว 102						14
ภาคกลาง																					
4	นครสวรรค์	สกว 7	สกว 20																		2
5	พิจิตร	สกว 237	สกว 238																		2
6	เพชรบูรณ์	สกว 151	สกว 152	สกว 205																	3
7	นครนายก	สกว 161																			1
8	กรุงเทพมหานคร	สกว 219	สกว 242																		2
9	พระนครศรีอยุธยา	สกว 186																			1
10	นครปฐม	สกว 38	สกว 141	สกว 228	สกว 229																4
11	สุพรรณบุรี	สกว 188	สกว 189	สกว 190	สกว 191	สกว 192	สกว 193														6
12	ลพบุรี	สกว 187																			1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ																					
13	ศรีสะเกษ	สกว 1	สกว 2	สกว 75	สกว 76	สกว 77	สกว 78	สกว 79	สกว 171	สกว 172	สกว 173	สกว 248									11
14	ขอนแก่น	สกว 5	สกว 31	สกว 126	สกว 174	สกว 212	สกว 213	สกว 214	สกว 241	สกว 249											9
15	อุบลราชธานี	สกว 23	สกว 26	สกว 72	สกว 73	สกว 74	สกว 170	สกว 175	สกว 176	สกว 177	สกว 178	สกว 202									11
16	มหาสารคาม	สกว 168																			1
17	ชัยภูมิ	สกว 30	สกว 32	สกว 34	สกว 87	สกว 88	สกว 89	สกว 90	สกว 91	สกว 92	สกว 93	สกว 94	สกว 99	สกว 132	สกว 153						14
18	อุดรธานี	สกว 204																			1
19	สกลนคร	สกว 35	สกว 163	สกว 164	สกว 243																4
20	นครพนม	สกว 36	สกว 165	สกว 166	สกว 167	สกว 169	สกว 216	สกว 217	สกว 226	สกว 227											9
21	กาฬสินธุ์	สกว 37																			1
22	นครราชสีมา	สกว 41	สกว 44	สกว 233	สกว 234	สกว 247															5
23	บึงกาฬ	สกว 117																			1
24	มุกดาหาร	สกว 250																			1
25	หนองคาย	สกว 22	สกว 129	สกว 131																	3
26	เลย	สกว 144	สกว 162																		2

ตารางที่ 2 (ต่อ) รายชื่อสายพันธุ์พริกพื้นเมืองที่เก็บรวบรวมโดยแยกแต่ละจังหวัด

ลำดับ	แหล่งที่มา	รหัส สกว																		จำนวน สายพันธุ์	
ภาคตะวันออก																					
27	ตราด	สกว 6	สกว 39	สกว 40	สกว 103	สกว 104	สกว 105	สกว 106	สกว 107	สกว 108	สกว 156	สกว 157	สกว 158	สกว 159	สกว 210						14
28	จันทบุรี	สกว 109	สกว 223	สกว 231																	3
29	ระยอง	สกว 111	สกว 112	สกว 113	สกว 114	สกว 115	สกว 116	สกว 160	สกว 221	สกว 222										9	
30	ปราจีนบุรี	สกว 154	สกว 155																		2
31	สระแก้ว	สกว 224	สกว 244																		2
ภาคตะวันตก																					
32	ตาก	สกว 27	สกว 28	สกว 137	สกว 138	สกว 209															5
33	กาญจนบุรี	สกว 33	สกว 71	สกว 81	สกว 82	สกว 135	สกว 142	สกว 143	สกว 194	สกว 215	สกว 220	สกว 225	สกว 232	สกว 236	สกว 245						14
34	เพชรบุรี	สกว 19	สกว 42	สกว 198	สกว 199																4
35	ราชบุรี	สกว 133	สกว 134	สกว 195	สกว 196	สกว 197															5
36	ประจวบคีรีขันธ์	สกว 14	สกว 18																		2
ภาคใต้																					
37	ชุมพร	สกว 12	สกว 15	สกว 16	สกว 24	สกว 183															5
38	ระนอง	สกว 13	สกว 184	สกว 185																	3
39	สุราษฎร์ธานี	สกว 139	สกว 136	สกว 182	สกว 235																4
40	นครศรีธรรมราช	สกว 17	สกว 128	สกว 180	สกว 181																4
41	ตรัง	สกว 127																			1
42	พัทลุง	สกว 80																			1
43	ยะลา	สกว 179	สกว 230																		2
ไม่ระบุแหล่งที่มา		สกว 48	สกว 49	สกว 50	สกว 98	สกว 200	สกว 201	สกว 203	สกว 206	สกว 207	สกว 211	สกว 239	สกว 251	สกว 252	สกว 253						14
รวม																					253

2. การศึกษาลักษณะทางพืชสวนและขยายเมล็ดพันธุ์

การศึกษาลักษณะทางพืชสวนและขยายเมล็ดพันธุ์จำนวน 253 สายพันธุ์ ได้ข้อมูลลักษณะทางพืชสวน (ตารางที่ 4 และ ตารางที่ 5) ได้เมล็ดพันธุ์ 223 สายพันธุ์ สายพันธุ์ที่เมล็ดไม่งอกมี 10 สายพันธุ์ มี 2 สายพันธุ์ที่เก็บเมล็ดจากพริกแห้ง คือ สกว 129 และ สกว 132 เนื่องจากก่อนการตากแห้งเกษตรกรอาจทำการลวกพริก เพื่อให้พริกแห้งเร็ว จึงทำให้สูญเสียคุณภาพการงอกของเมล็ด ส่วน สกว 215 สกว 218 สกว 222 สกว 230 สกว 244 สกว 246 สกว 247 และ สกว 252 เป็นพริกที่คัดเลือกจากเชื้อพันธุ์กรรมของศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อนซึ่งเก็บเป็นระยะเวลานานกว่า 15 ปี สำหรับปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ได้ 0 กรัม มีทั้งหมด 20 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ที่เกิดการระบาดของเพลี้ยไฟเกิดการหลุดร่วงของดอกและไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม (ปลูกช่วงเดือน ต.ค.-เม.ย) จำนวน 16 สายพันธุ์ คือ สกว 103 สกว 105 สกว 108 สกว 111 สกว 113 สกว 114 สกว 115 สกว 127 สกว 134 สกว 142 สกว 143 สกว 144 สกว 216 สกว 221 สกว 245 และ สกว 253 (ภาพที่ 2ก) ส่วนมากเป็นพริกชี้หนูผลเล็ก พริกชี้หนูสวน พริกกะเหรี่ยงบางสายพันธุ์ สายพันธุ์ที่เกิดการระบาดของโรคน้ำเน่า (ปลูกช่วง พ.ค.-ต.ค.) จำนวน 1 สายพันธุ์ คือ สกว 194 (ภาพที่ 2ข) สายพันธุ์ที่เกิดการระบาดของโรคไวรัส (ปลูกช่วง ก.ค.-ต.ค.) จำนวน 3 สายพันธุ์ คือ สกว 12 สกว 36 และ สกว 64 (ภาพที่ 2ค)

ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ได้น้อยกว่า 1 กรัม มีทั้งหมด 4 สายพันธุ์ สายพันธุ์ที่ได้เมล็ดน้อยสุดคือ สกว 233 (CA1260 พริกกะเหรี่ยง) จากจังหวัดนครราชสีมา เป็นพริกที่มีขนาดเล็ก ติดผลยาก เก็บเมล็ดได้เพียง 0.23 กรัม สายพันธุ์ที่ได้เมล็ดมากกว่า 500 กรัม มี 7 สายพันธุ์ ได้แก่ สกว 4 (พริกมันได้เมล็ด 697.72 กรัม) สกว 37 (พริกกันชนได้เมล็ด 530.35 กรัม) สกว 131 (พริกน้อย/ตุ้ม ได้เมล็ด 661.00 กรัม) สกว 186 (CA 286 พริกชี้หนูสวน ได้เมล็ด 741.41 กรัม) สกว 200 (CA364 พริกห้วยสีทน ได้เมล็ด 627.33 กรัม) สกว 207 (CA398 พริกชี้หนูไทย ได้เมล็ด 530.35) สกว 212 (CA 858 พริกข่อผลยาว ได้เมล็ด 691.40 กรัม)

เมื่อจัดกลุ่มพริกที่ได้ปริมาณเมล็ดในช่วง 0.10 – 1.00 กรัม 1.01 – 50.00 กรัม 50.01 – 100.00 กรัม 100.01 – 150.00 กรัม และมากกว่า 150.01 ขึ้นไป พบว่า 63 สายพันธุ์จาก 253 สายพันธุ์ ได้ปริมาณเมล็ดมากกว่า 150.01 ขึ้นไป (ตารางที่ 3) ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ต่อยอดงานวิจัยและเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับการเผยแพร่ต่อไป

ตารางที่ 3 ปริมาณเมล็ดพันธุ์ และ จำนวนสายพันธุ์พริกที่เก็บเมล็ดพันธุ์ได้

น้ำหนักเมล็ด (กรัม)	จำนวนสายพันธุ์พริก (acc.)
เมล็ดไม่งอก	10
0	20
0.10 – 1.00	4
1.01 – 50.00	94
50.01 – 100.0	42
100.01 – 150.00	20
150.01 – 750.00	63
รวม	253



ก) อาการระบาดของเฟลียวไฟ และการหลุดร่วงของดอก



ข) อาการโรคยอดเน่า



ค) อาการโรคไวรัส

ภาพที่ 2 ลักษณะอาการโรคที่พบในแปลง

ตารางที่ 4 ลักษณะการเจริญเติบโต ลักษณะดอก อายุเก็บเกี่ยวของพริกพื้นเมือง 253 สายพันธุ์

ลำดับ	รหัส	สายพันธุ์	ประเภท	ชนิด	การ เจริญเติบโต ของทรงต้น	ความสูงต้นเมื่อ เก็บเกี่ยวครั้งแรก (ซ.ม.)	ความกว้างทรง พุ่มเมื่อเก็บเกี่ยว ครั้งแรก (ซ.ม.)	จำนวน ดอกต่อข้อ	สีดอก	ตำแหน่งดอก	อายุดอกบาน 50% (วันหลังเพาะ)	อายุเก็บเกี่ยว ครั้งแรก (วันหลังเพาะ)
1	สกว 1	พริกหัวเรียว่น	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	100	63	1	ขาว	erect	66	124
2	สกว 2	พริกหัวเรียว่น	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	101	62	1	ขาว	erect	63	124
3	สกว 3	พริกชี้หนูสวน	พริกชี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	intermediate	102	72	1-2	เขียว	erect	91	135
4	สกว 4	พริกมัน	พริกผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	95	78	1	ขาว	pendant	66	135
5	สกว 5	พริกสีดา	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	96	65	1	ขาว	erect	76	124
6	สกว 6	พริกชี้หนูสวน	พริกชี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	erect	118	74	1-2	เขียว	erect	91	162
7	สกว 7	พริกบางลี่	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	erect	139	76	1	ขาว	erect	76	135
8	สกว 8	พริกวัดโบสถ์ (ผลใหญ่ยาว)	พริกผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	146	91	1	ขาว	intermediate	66	157
9	สกว 9	พริกวัดโบสถ์ (ผลอ้วนป้อม)	พริกผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	104	68	1	ขาว	pendant	63	132
10	สกว 10	พริกวัดโบสถ์ (ผลผอมยาว)	พริกผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	141	87	1	ขาว	pendant	83	149
11	สกว 11	พริกมันพิชัย	พริกผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	146	89	1	ขาว	pendant	78	157
12	สกว 12	พริกชี้หนูขึ้นนก	พริกชี้หนูผลเล็ก	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	สกว 13	พริกพม่า	พริกผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	101	56	1	ขาว	pendant	63	124
14	สกว 14	พริกชี้หนูขึ้นนก	พริกชี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	intermediate	104	84	1-3	เขียว	erect	91	135
15	สกว 15	พริกยอดสนเล็ก	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	108	74	1	ขาว	erect	76	124
16	สกว 16	พริกยอดสนเล็ก	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	83	72	1	ขาว	erect	63	135
17	สกว 17	พริกขี้เผือกไก่	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>frutescens</i>	intermediate	129	79	1-2	เขียว	erect	93	150
18	สกว 18	พริกกะเหรี่ยง	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>frutescens</i>	erect	99	58	1	เขียว	erect	99	157
19	สกว 19	พริกกะเหรี่ยงหนองหญ้าปล้อง	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>frutescens</i>	intermediate	110	77	1-2	เขียว	erect	99	150
20	สกว 20	พริกแกว	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	erect	140	69	1	ขาว	erect	78	124

ตารางที่ 4 (ต่อ) ลักษณะการเจริญเติบโต ลักษณะดอก อายุเก็บเกี่ยวของพริกพื้นเมือง 253 สายพันธุ์

ลำดับ	รหัส	สายพันธุ์	ประเภท	ชนิด	การ เจริญเติบโต ของทรงต้น	ความสูงต้นเมื่อ เก็บเกี่ยวครั้งแรก (ซ.ม.)	ความกว้างทรง พุ่มเมื่อเก็บเกี่ยว ครั้งแรก (ซ.ม.)	จำนวน ดอกต่อข้อ	สีดอก	ตำแหน่งดอก	อายุดอกบาน 50% (วันหลังเพาะ)	อายุเก็บเกี่ยว ครั้งแรก (วันหลังเพาะ)
21	สกว 21	พริกแดง(ชี้หนู)	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>frutescens</i>	intermediate	86	63	1-2	เขียว	erect	91	135
22	สกว 22	พริกเล็บมือนาง	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>frutescens</i>	erect	123	85	1-2	เขียว	erect	99	135
23	สกว 23	พริกหัวเรียว	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	81	59	1-2	ขาว	erect	76	124
24	สกว 24	พริกชี้ตาลิง	พริกชี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	intermediate	102	75	1-2	เขียว	erect	87	135
25	สกว 25	พริกแซว	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	100	82	1	ขาว	erect	61	124
26	สกว 26	พริกข่อ	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	erect	98	42	3-7	ขาว	erect	78	124
27	สกว 27	พริกม้ง	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>frutescens</i>	intermediate	81	67	1-2	เขียว	erect	76	135
28	สกว 28	พริกม้ง	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>frutescens</i>	intermediate	125	90	1	เขียว	erect	91	149
29	สกว 29	พริกแดง/แดง	พริกชี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	intermediate	117	74	1-2	เขียว	erect	91	135
30	สกว 30	พริกปือบพวง	พริกชี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	erect	94	58	3-6	เขียว	erect	91	169
31	สกว 31	พริกน้อย	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>frutescens</i>	intermediate	109	68	1	เขียว	erect	91	135
32	สกว 32	พริกน้อย	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>frutescens</i>	erect	122	71	1-2	เขียว	erect	91	135
33	สกว 33	พริกกะเหรี่ยง	พริกชี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	intermediate	105	76	1-2	เขียว	erect	93	135
34	สกว 34	พริกยอดสนเล็ก	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	erect	134	80	1	ขาว	erect	78	162
35	สกว 35	พริกเหลืองทอง	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>frutescens</i>	erect	108	77	1	เขียว	erect	93	149
36	สกว 36	พริกปลัก/พลาสติก	พริกชี้หนูผลใหญ่	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	สกว 37	พริกกันชน	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	67	68	1	ขาว	erect	61	124
38	สกว 38	พริกเหลือง	พริกผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	107	66	1	ขาว	erect	83	162
39	สกว 39	พริกชี้หนูนา	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>frutescens</i>	intermediate	107	89	1-2	เขียวขาว	erect	78	124
40	สกว 40	พริกชี้หนูสวน	พริกชี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	erect	123	71	1-2	เขียวขาว	erect	99	162

ตารางที่ 4 (ต่อ) ลักษณะการเจริญเติบโต ลักษณะดอก อายุเก็บเกี่ยวของพริกพื้นเมือง 253 สายพันธุ์

ลำดับ	รหัส	สายพันธุ์	ประเภท	ชนิด	การ เจริญเติบโต ของทรงต้น	ความสูงต้นเมื่อ เก็บเกี่ยวครั้งแรก (ซ.ม.)	ความกว้างทรง พุ่มเมื่อเก็บเกี่ยว ครั้งแรก (ซ.ม.)	จำนวน ดอกต่อข้อ	สีดอก	ตำแหน่งดอก	อายุดอกบาน 50% (วันหลังเพาะ)	อายุเก็บเกี่ยว ครั้งแรก (วันหลังเพาะ)
41	สกว 41	พริกยอดสนด้านขุนทด	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	erect	85	52	1	ขาว	erect	84	120
42	สกว 42	พริกกะเหรี่ยงหนองหญ้าปล้อง	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>frutescens</i>	intermediate	79	52	1-2	เขียว	erect	90	177
43	สกว 43	พริกขาว	พริกชี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	erect	98	56	1	เขียว	erect	94	127
44	สกว 44	พริก off-type หยกสยาม	พริกผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	67	57	1	ขาว	pendant	80	112
45	สกว 45	พริกบ้านยอด	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>frutescens</i>	erect	114	45	1	เขียว	erect	90	127
46	สกว 46	พริกบ้านยอด	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>frutescens</i>	erect	130	67	1	เขียว	erect	90	127
47	สกว 47	พริกกะเหรี่ยงทุ่งช้าง	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>frutescens</i>	erect	111	60	1	เขียว	erect	90	134
48	สกว 48	พริกอีปาด	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	78	52	1	ขาว	erect	84	120
49	สกว 49	พริกช่อวังขน	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	erect	76	41	1-8	ขาว	erect	90	112
50	สกว 50	พริกจินดายอดสน	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	81	63	1	ขาว	erect	80	120
51	สกว 51	พริกดีปลาไหล	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	70	52	1	ขาว	erect	80	112
52	สกว 52	พริกดอย	พริกชี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	intermediate	112	73	1	เขียว	erect	94	127
53	สกว 53	พริกกระเทียม	พริกผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	89	59	1	ขาว	intermediate	80	134
54	สกว 54	พริกดอย	พริกชี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	intermediate	80	52	1	เขียว	erect	97	191
55	สกว 55	พริกชี้หนุนาแล	พริกชี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	intermediate	108	62	1-2	เขียว	erect	92	191
56	สกว 56	พริกเมือง/กันห้อย	พริกผลใหญ่	<i>annuum</i>	erect	113	62	1	ขาว	intermediate	84	127
57	สกว 57	พริกผลใหญ่บ้านก่ง	พริกผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	69	64	1	ขาว	pendant	80	114
58	สกว 58	พริกผลใหญ่ทุ่งน้าว	พริกผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	69	66	1	ขาว	pendant	80	112
59	สกว 59	พริกชี้หนูสวน	พริกชี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	intermediate	70	61	1	เขียว	erect	90	120
60	สกว 60	พริกสวนลับแล	พริกชี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	erect	106	61	1-2	เขียว	erect	90	134

ตารางที่ 4 (ต่อ) ลักษณะการเจริญเติบโต ลักษณะดอก อายุเก็บเกี่ยวของพริกพื้นเมือง 253 สายพันธุ์

ลำดับ	รหัส	สายพันธุ์	ประเภท	ชนิด	การ เจริญเติบโต ของทรงต้น	ความสูงต้นเมื่อ เก็บเกี่ยวครั้งแรก (ซ.ม.)	ความกว้างทรง พุ่มเมื่อเก็บเกี่ยว ครั้งแรก (ซ.ม.)	จำนวน ดอกต่อซ่อ	สีดอก	ตำแหน่งดอก	อายุดอกบาน 50% (วันหลังเพาะ)	อายุเก็บเกี่ยว ครั้งแรก (วันหลังเพาะ)
61	สกว 61	พริกตุ้ม	พริกชี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	intermediate	80	55	1	เขียว	erect	90	156
62	สกว 62	พริกชี้หนูห้องสูงแปลง 1	พริกชี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	erect	83	54	1	เขียว	erect	90	120
63	สกว 63	พริกชี้หนูห้องสูงแปลง 2	พริกชี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	intermediate	78	52	2	เขียว	erect	90	170
64	สกว 64	พริกชี้หนูห้องสูงแปลง 3	พริกชี้หนูผลเล็ก	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	สกว 65	พริกหนุ่มลับแล	พริกผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	75	51	1	ขาว	pendant	80	120
66	สกว 66	พริกแจว	พริกชี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	erect	85	43	1	เขียว	erect	90	134
67	สกว 67	พริกผลใหญ่	พริกผลใหญ่	<i>annuum</i>	erect	93	47	1	ขาว	intermediate	90	127
68	สกว 68	พริกหอม	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>frutescens</i>	intermediate	94	49	1-2	เขียว	erect	90	191
69	สกว 69	พริกแจวหอม	พริกชี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	intermediate	102	50	1-2	เขียว	erect	90	127
70	สกว 70	พริกแม่แว่สอด	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>frutescens</i>	intermediate	81	50	1	เขียว	erect	90	120
71	สกว 71	พริกกะเหรียง	พริกชี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	intermediate	94	60	1	เขียว	erect	90	127
72	สกว 72	พริกจินดา	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	88	57	1	ขาว	erect	80	112
73	สกว 73	พริกหัวเรือ	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	68	51	1	ขาว	erect	80	112
74	สกว 74	พริกขาว	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>frutescens</i>	erect	126	64	1	เขียว	erect	90	127
75	สกว 75	พริกหัวเรือยัน	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	74	53	1	ขาว	erect	80	112
76	สกว 76	พริกหัวเรือยันบ้านอีป่าด	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	76	51	1	ขาว	erect	80	112
77	สกว 77	พริกขาว	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>frutescens</i>	erect	116	51	1	เขียว	erect	92	170
78	สกว 78	พริกขาว/เครือ	พริกชี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	erect	129	49	1	ขาวเขียว	erect	94	142
79	สกว 79	พริกบ้าน	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>frutescens</i>	erect	143	71	1	เขียว	erect	97	142
80	สกว 80	พริกซี/หนัก	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>frutescens</i>	erect	130	47	1	เขียว	erect	92	142

ตารางที่ 4 (ต่อ) ลักษณะการเจริญเติบโต ลักษณะดอก อายุเก็บเกี่ยวของพริกพื้นเมือง 253 สายพันธุ์

ลำดับ	รหัส	สายพันธุ์	ประเภท	ชนิด	การ เจริญเติบโต ของทรงต้น	ความสูงต้นเมื่อ เก็บเกี่ยวครั้งแรก (ซ.ม.)	ความกว้างทรง พุ่มเมื่อเก็บเกี่ยว ครั้งแรก (ซ.ม.)	จำนวน ดอกต่อข้อ	สีดอก	ตำแหน่งดอก	อายุดอกบาน 50% (วันหลังเพาะ)	อายุเก็บเกี่ยว ครั้งแรก (วันหลังเพาะ)
81	สกว 81	พริกกะเหรียง	พริกชี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	erect	118	53	1	เขียว	erect	97	156
82	สกว 82	พริกกะเหรียงข้อ	พริกชี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	erect	91	48	2-7	เขียว	erect	90	134
83	สกว 83	พริกผลใหญ่	พริกผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	70	58	1	ขาว	pendant	80	112
84	สกว 84	พริกเตี้อย	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	77	65	1	ขาว	erect	80	112
85	สกว 85	พริกแซว	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	90	63	1	ขาว	intermediate	80	112
86	สกว 86	พริกม้ง	พริกชี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	intermediate	94	65	1-2	เขียว	intermediate	97	170
87	สกว 87	พริกดำป่น 1	พริกผลใหญ่	<i>annuum</i>	erect	124	75	1	ขาว	pendant	80	127
88	สกว 88	พริกดำป่น 2	พริกผลใหญ่	<i>annuum</i>	erect	116	55	1	ขาว	intermediate	80	127
89	สกว 89	พริกแจ่ว	พริกผลใหญ่	<i>annuum</i>	erect	76	51	1	ขาว	intermediate	90	120
90	สกว 90	พริกแจ่ว	พริกผลใหญ่	<i>annuum</i>	erect	120	57	1	ขาว	intermediate	80	112
91	สกว 91	พริกแจ่ว	พริกผลใหญ่	<i>annuum</i>	erect	154	63	1	ขาว	erect	80	120
92	สกว 92	พริกแจ่ว	พริกผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	110	57	1	ขาว	erect	84	120
93	สกว 93	พริกยอดสนใหญ่	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	erect	157	69	1	ขาว	erect	84	120
94	สกว 94	พริกยอดสนเล็ก	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	erect	128	54	1	ขาว	erect	84	127
95	สกว 95	พริกกระดุม	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	erect	103	47	1	ขาว	erect	84	120
96	สกว 96	พริกแซวหลังนา	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	79	48	1	ขาว	intermediate, erect	80	120
97	สกว 97	พริกพื้นเมืองห้องสูง	พริกชี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	intermediate	107	59	1	เขียว	erect	90	170
98	สกว 98	พริกครกแตก	พริกผลใหญ่	<i>annuum</i>	erect	128	49	1	ขาว	intermediate	80	120
99	สกว 99	พริกจินดา	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	99	54	4	ขาว	intermediate	80	112
100	สกว 100	พริกชี้หนูบ้านห้องสูง	พริกชี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	intermediate	112	58	1	เขียว	erect	92	134

ตารางที่ 4 (ต่อ) ลักษณะการเจริญเติบโต ลักษณะดอก อายุเก็บเกี่ยวของพริกพื้นเมือง 253 สายพันธุ์

ลำดับ	รหัส	สายพันธุ์	ประเภท	ชนิด	การเจริญเติบโตของทรงต้น	ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก (ซ.ม.)	ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก (ซ.ม.)	จำนวนดอกต่อข้อ	สีดอก	ตำแหน่งดอก	อายุดอกบาน 50% (วันหลังเพาะ)	อายุเก็บเกี่ยวครั้งแรก (วันหลังเพาะ)
101	สกว 101	พริกขี้หนู	พริกขี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	erect	95	116	1	เหลืองเขียว	erect	81	134
102	สกว 102	พริกผลใหญ่	พริกผลใหญ่	<i>annuum</i>	erect	78	104	1	ขาว	intermediate	81	134
103	สกว 103	พริกอีโต้ะ	พริกขี้หนูผลเล็ก	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	สกว 104	พริกนา-1	พริกขี้หนูผลเล็ก	<i>annuum</i>	prostrate	69	77	1	ขาว	erect	81	134
105	สกว 105	พริกนา-2	พริกขี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	-	-	1	ขาว	erect	74	-
106	สกว 106	พริกหอมตราด	พริกขี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	75	63	1	ขาว	erect	74	134
107	สกว 107	พริกแหลมกลัด	พริกขี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	68	70	1	ขาว	erect	81	134
108	สกว 108	พริกขี้หนูสวน	พริกขี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	erect	-	-	1	เหลืองเขียว	erect	91	-
109	สกว 109	พริกขี้หนูสวน	พริกขี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	erect	70	94	1	เหลืองเขียว	erect	87	134
110	สกว 110	พริกจินดาเขมร	พริกขี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	90	95	1	ขาว	erect	74	134
111	สกว 111	พริกขี้หนูสวน	พริกขี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	erect	-	-	1	เหลืองเขียว	erect	91	-
112	สกว 112	พริกขี้หนูสวน	พริกขี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	erect	98	122	1	เหลืองเขียว	erect	81	134
113	สกว 113	พริกขี้หนูสวน ต้น1	พริกขี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	erect	-	-	1	เหลืองเขียว	erect	91	-
114	สกว 114	พริกขี้หนูสวน ต้น2	พริกขี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	erect	-	-	1	เหลืองเขียว	erect	91	-
115	สกว 115	พริกขี้หนูสวน ต้น3	พริกขี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	intermediate	-	-	1	เหลืองเขียว	erect	81	-
116	สกว 116	พริกตุ้ม	พริกขี้หนูผลเล็ก	<i>annuum</i>	erect	72	110	1	ขาว	erect	81	134
117	สกว 117	พริกยอดสนเล็ก	พริกขี้หนูผลเล็ก	<i>annuum</i>	intermediate	83	86	1	ขาว	erect	74	134
118	สกว 118	พริกขี้หนูเมือง	พริกขี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	95	128	1	ขาว	erect	81	134
119	สกว 119	พริกขี้หนูแต้	พริกขี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	erect	88	121	1	เหลืองเขียว	erect	91	151
120	สกว 120	พริกแต้กลาง	พริกขี้หนูผลใหญ่	<i>frutescens</i>	erect	97	133	1	เหลืองเขียว	erect	81	151

ตารางที่ 4 (ต่อ) ลักษณะการเจริญเติบโต ลักษณะดอก อายุเก็บเกี่ยวของพริกพื้นเมือง 253 สายพันธุ์

ลำดับ	รหัส	สายพันธุ์	ประเภท	ชนิด	การเจริญเติบโตของทรงต้น	ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก (ซ.ม.)	ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก (ซ.ม.)	จำนวนดอกต่อข้อ	สีดอก	ตำแหน่งดอก	อายุดอกบาน 50% (วันหลังเพาะ)	อายุเก็บเกี่ยวครั้งแรก (วันหลังเพาะ)
121	สกว 121	พริกแต้กลาง	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>frutescens</i>	erect	82	120	1	เหลืองเขียว	erect	81	151
122	สกว 122	พริกเขียว	พริกผลใหญ่	<i>annuum</i>	prostrate	93	133	1	ขาว	intermediate	74	134
123	สกว 123	พริกแต่เขียงดาว	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>frutescens</i>	erect	77	117	1	เหลืองเขียว	erect	81	151
124	สกว 124	พริกแต่ใหญ่ลำพูน	พริกชี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	intermediate	83	101	1	เหลืองเขียว	erect	81	151
125	สกว 125	พริกตอยแม่สะเรียง	พริกชี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	erect	95	99	1	เหลืองเขียว	erect	81	134
126	สกว 126	พริกส้ม/ป๊อป/พวง	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>frutescens</i>	prostrate	78	118	2-3	เหลืองเขียว	erect	81	134
127	สกว 127	พริกเตี้ยไก่	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>frutescens</i>	erect	-	-	1	ขาวเขียว	erect	77	-
128	สกว 128	พริกชี	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>frutescens</i>	erect	85	123	1	เหลืองเขียว	erect	77	134
129	สกว 129	พริกยอดสนเล็ก	พริกชี้หนูผลใหญ่	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	สกว 130	พริกชี้หนูบ้านปางแก	พริกชี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	erect	72	109	1-2	เหลืองเขียว	erect	81	134
131	สกว 131	พริกน้อย/พริกตุ้ม	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	erect	74	120	-	เขียว	erect	81	134
132	สกว 132	พริกห้อยฝาว/พริกป๊อป	พริกชี้หนูผลเล็ก	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	สกว 133	พริกช่อระย้า	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	76	97	7-8	ขาว	erect	77	134
134	สกว 134	พริกกะเหรียง	พริกชี้หนูผลเล็ก	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	สกว 135	พริกป๊อป	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>frutescens</i>	erect	88	128	1	เหลืองเขียว	erect	77	134
136	สกว 136	พริกกะเหรียงหนองหญ้าปล้อง	พริกชี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	erect	83	99	1-2	เหลืองเขียว	erect	81	134
137	สกว 137	พริกมั่ง	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>frutescens</i>	erect	81	96	1-3	เหลืองเขียว	erect	77	144
138	สกว 138	พริกมั่ง	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>frutescens</i>	erect	79	111	1-3	เหลืองเขียว	erect	81	134
139	สกว 139	พริกชี้หนู/ติปลี	พริกชี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	erect	107	137	1-2	เหลืองเขียว	erect	91	144
140	สกว 140	พริกกะเหรียง	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>frutescens</i>	erect	92	108	1	เหลืองเขียว	erect	87	151

ตารางที่ 4 (ต่อ) ลักษณะการเจริญเติบโต ลักษณะดอก อายุเก็บเกี่ยวของพริกพื้นเมือง 253 สายพันธุ์

ลำดับ	รหัส	สายพันธุ์	ประเภท	ชนิด	การ เจริญเติบโต ของทรงต้น	ความสูงต้นเมื่อ เก็บเกี่ยวครั้งแรก (ซ.ม.)	ความกว้างทรง พุ่มเมื่อเก็บเกี่ยว ครั้งแรก (ซ.ม.)	จำนวน ดอกต่อข้อ	สีดอก	ตำแหน่งดอก	อายุดอกบาน 50% (วันหลังเพาะ)	อายุเก็บเกี่ยว ครั้งแรก (วันหลังเพาะ)
141	สกว 141	พริกเลื้อย	พริกชี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	erect	97	115	1-2	เหลืองเขียว	erect	81	151
142	สกว 142	พริกกะเหรี่ยง	พริกชี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	intermediate	-	-	1	เหลืองเขียว	erect	81	-
143	สกว 143	พริกขาว	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>frutescens</i>	erect	-	-	1	เหลืองเขียว	erect	81	-
144	สกว 144	พริกส้มปากปวน	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>frutescens</i>	erect	-	-	1	เหลืองเขียว	erect	87	-
145	สกว 145	พริกผลใหญ่วัดโบสถ์	พริกผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	89	100	1	ขาว	pendant	77	134
146	สกว 146	พริกจินดาวัดโบสถ์	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	89	100	1-2	ขาว	pendant	74	134
147	สกว 147	พริกแซวพื้นเมือง	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	98	112	1	ขาว	erect	74	134
148	สกว 148	พริกพื้นเมืองบ้านก่ง	พริกผลใหญ่	<i>annuum</i>	erect	102	126	1	ขาว	erect	74	134
149	สกว 149	พริกจินดาพื้นเมือง	พริกผลใหญ่	<i>annuum</i>	erect	83	101	1	ขาว	erect	74	134
150	สกว 150	พริกแซวกระเทียม	พริกผลใหญ่	<i>annuum</i>	erect	109	102	1	ขาว	erect	74	134
151	สกว 151	พริกจินดาดำ	พริกผลใหญ่	<i>annuum</i>	erect	80	132	1	ขาว	erect	81	134
152	สกว 152	พริกสร้อยสน	พริกผลใหญ่	<i>annuum</i>	erect	106	152	1	ขาว	erect	81	134
153	สกว 153	พริกยอดสน	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	erect	113	151	1	ขาว	erect	81	134
154	สกว 154	CA032 พริกเดือยไก่	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>frutescens</i>	intermediate	103	71	1-2	เหลืองเขียว	erect	98	145
155	สกว 155	CA034 พริกหอมสีขาว	พริกชี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	erect	95	47	1-2	เหลืองเขียว	erect	98	129
156	สกว 156	CA050 พริกชี้หนู	พริกชี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	erect	106	57	1-2	เขียว	erect	104	150
157	สกว 157	CA052 พริกชี้หนู	พริกชี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	erect	104	62	1-2	เขียว	erect	104	158
158	สกว 158	CA053 พริกชี้หนู-กรุงเทพ	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	erect	69	40	1	ขาว	erect	89	129
159	สกว 159	CA054 พริกชี้หนูบ้านยาว	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	78	47	1	ขาว	erect	96	129
160	สกว 160	CA062 พริกชี้หนู	พริกชี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	erect	120	65	1-3	เขียว	erect	100	136

ตารางที่ 4 (ต่อ) ลักษณะการเจริญเติบโต ลักษณะดอก อายุเก็บเกี่ยวของพริกพื้นเมือง 253 สายพันธุ์

ลำดับ	รหัส	สายพันธุ์	ประเภท	ชนิด	การ เจริญเติบโต ของทรงต้น	ความสูงต้นเมื่อ เก็บเกี่ยวครั้งแรก (ซ.ม.)	ความกว้างทรง พุ่มเมื่อเก็บเกี่ยว ครั้งแรก (ซ.ม.)	จำนวน ดอกต่อข้อ	สีดอก	ตำแหน่งดอก	อายุดอกบาน 50% (วันหลังเพาะ)	อายุเก็บเกี่ยว ครั้งแรก (วันหลังเพาะ)
161	สกว 161	CA071 พริกหอม	พริกชี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	intermediate	93	58	2	เหลืองเขียว	erect	109	129
162	สกว 162	CA111 พริกจินดา	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>frutescens</i>	erect	138	61	1	เหลืองเขียว	erect	104	145
163	สกว 163	CA130 พริกชี้หนู	พริกชี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	erect	94	57	1	เหลืองเขียว	erect	104	145
164	สกว 164	CA131 พริกชี้หนู	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>frutescens</i>	erect	90	54	1	เหลืองเขียว	erect	89	145
165	สกว 165	CA138 พริกชี้หนู	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	71	45	1	ขาวม่วง	erect	84	129
166	สกว 166	CA139 พริกชี้หนู	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	64	50	1	ขาว	erect	109	129
167	สกว 167	CA141 พริกชี้หนู	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>frutescens</i>	erect	140	66	1-2	เขียว	erect	84	145
168	สกว 168	CA143 พริกชี้หนู	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	80	48	1	ขาว	erect	104	129
169	สกว 169	CA150 พริกชี้หนู	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>frutescens</i>	erect	140	68	1	เขียว	erect	84	145
170	สกว 170	CA170 พริกชี้หนู	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	81	53	1	ขาว	erect	84	129
171	สกว 171	CA172 พริกชี้หนู	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	70	44	1	ขาว	erect	84	129
172	สกว 172	CA175 พริกชี้หนู	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	67	47	1	ขาว	erect	75	129
173	สกว 173	CA177 พริกชี้หนู	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	69	61	1	ขาว	erect	76	129
174	สกว 174	CA189 พริกชี้หนู	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	76	56	1	ขาว	intermediate	84	129
175	สกว 175	CA198 พริกชี้หนู	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	68	55	1	ขาว	erect	86	129
176	สกว 176	CA218 พริกชี้หนู	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	55	49	1	ขาว	intermediate	84	129
177	สกว 177	CA224 พริกชี้หนู	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	65	49	1	ขาว	erect	89	129
178	สกว 178	CA225 พริกชี้หนู	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	56	52	1	ขาว	erect	86	129
179	สกว 179	CA262 พริกชี้หนูเหลือง	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	54	52	1	ขาว	erect	86	129
180	สกว 180	CA274 พริกขี้หนู	พริกชี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	erect	110	80	1-2	เขียว	erect	104	145

ตารางที่ 4 (ต่อ) ลักษณะการเจริญเติบโต ลักษณะดอก อายุเก็บเกี่ยวของพริกพื้นเมือง 253 สายพันธุ์

ลำดับ	รหัส	สายพันธุ์	ประเภท	ชนิด	การ เจริญเติบโต ของทรงต้น	ความสูงต้นเมื่อ เก็บเกี่ยวครั้งแรก (ซ.ม.)	ความกว้างทรง พุ่มเมื่อเก็บเกี่ยว ครั้งแรก (ซ.ม.)	จำนวน ดอกต่อข้อ	สีดอก	ตำแหน่งดอก	อายุดอกบาน 50% (วันหลังเพาะ)	อายุเก็บเกี่ยว ครั้งแรก (วันหลังเพาะ)
181	สกว 181	CA275 พริกขี้หนุเกสร	พริกขี้หนุผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	66	41	1	ขาว	erect	86	129
182	สกว 182	CA276 พริกขี้หนุเกสร	พริกขี้หนุผลใหญ่	<i>annuum</i>	erect	86	54	1	ขาว	erect	96	136
183	สกว 183	CA281 พริกขี้หนุ	พริกขี้หนุผลใหญ่	<i>annuum</i>	erect	72	48	1	ขาว	erect	89	129
184	สกว 184	CA283 พริกขี้หนุ	พริกขี้หนุผลเล็ก	<i>frutescens</i>	erect	122	57	1-2	เหลืองเขียว	erect	100	129
185	สกว 185	CA285 พริกขี้หนุ	พริกขี้หนุผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	78	52	1	ขาว	erect	93	129
186	สกว 186	CA286 พริกขี้หนุ	พริกขี้หนุผลใหญ่	<i>annuum</i>	erect	78	37	1	ขาว	erect	89	129
187	สกว 187	CA291 พริกขี้หนุ	พริกขี้หนุผลเล็ก	<i>frutescens</i>	erect	97	63	1-3	เหลืองเขียว	erect	93	129
188	สกว 188	CA312 พริกขี้หนุ	พริกขี้หนุผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	71	45	1	ขาว	pendant	89	129
189	สกว 189	CA316 พริกขี้หนุ	พริกขี้หนุผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	79	37	1	ขาว	erect	89	129
190	สกว 190	CA317 พริกขี้หนุ	พริกขี้หนุผลเล็ก	<i>frutescens</i>	intermediate	86	56	1-2	เขียว	erect	98	129
191	สกว 191	CA318 พริกขี้หนุ	พริกผลใหญ่	<i>annuum</i>	erect	136	75	1	ขาว	erect	96	129
192	สกว 192	CA320 พริกจินดา	พริกขี้หนุผลใหญ่	<i>annuum</i>	erect	124	89	1	ขาว	erect	96	129
193	สกว 193	CA322 พริกขี้หนุ	พริกขี้หนุผลเล็ก	<i>frutescens</i>	erect	99	59	1-2	เขียว	erect	98	129
194	สกว 194	CA335 พริกขี้หนุ	พริกขี้หนุผลเล็ก	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	สกว 195	CA341 พริกขี้หนุ	พริกขี้หนุผลเล็ก	<i>frutescens</i>	erect	111	68	1-2	เหลืองเขียว	erect	100	129
196	สกว 196	CA346 พริกจินดา	พริกขี้หนุผลใหญ่	<i>annuum</i>	erect	98	60	1-2	ขาว	erect	96	129
197	สกว 197	CA350 พริกกะเหรี่ยง	พริกขี้หนุผลเล็ก	<i>frutescens</i>	erect	114	72	1	เขียว	erect	104	145
198	สกว 198	CA353 พริกขี้หนุ	พริกขี้หนุผลเล็ก	<i>frutescens</i>	erect	123	77	1-3	เหลืองเขียว	erect	104	129
199	สกว 199	CA355 พริกกะเหรี่ยง	พริกขี้หนุผลเล็ก	<i>frutescens</i>	intermediate	119	75	2-3	เหลืองเขียว	erect	104	129
200	สกว 200	CA364 พริกห้วยสีทน	พริกขี้หนุผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	69	49	1	ขาว	erect	84	129

ตารางที่ 4 (ต่อ) ลักษณะการเจริญเติบโต ลักษณะดอก อายุเก็บเกี่ยวของพริกพื้นเมือง 253 สายพันธุ์

ลำดับ	รหัส	สายพันธุ์	ประเภท	ชนิด	การ เจริญเติบโต ของทรงต้น	ความสูงต้นเมื่อ เก็บเกี่ยวครั้งแรก (ซ.ม.)	ความกว้างทรง พุ่มเมื่อเก็บเกี่ยว ครั้งแรก (ซ.ม.)	จำนวน ดอกต่อข้อ	สีดอก	ตำแหน่งดอก	อายุดอกบาน 50% (วันหลังเพาะ)	อายุเก็บเกี่ยว ครั้งแรก (วันหลังเพาะ)
201	สกว 201	CA368 พริกนกบางเลน	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	77	47	1	ขาว	erect	86	129
202	สกว 202	CA369 พริกหัวเรืออุบล	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	erect	73	53	1	ขาว	erect	84	136
203	สกว 203	CA372 พริกชี้หนูสวน	พริกชี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	erect	101	53	1-2	เหลืองเขียว	erect	98	129
204	สกว 204	CA387 พริกชี้หนูดอน	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>frutescens</i>	erect	137	56	1-2	เหลืองเขียว	erect	104	145
205	สกว 205	CA394 พริกชี้หนูเมืองเพชรบูรณ์	พริกชี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	erect	126	79	1-2	เหลืองเขียว	erect	104	145
206	สกว 206	CA397 พริกนกบ้านโป่ง	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	61	33	1	ขาว	erect	84	129
207	สกว 207	CA398 พริกชี้หนูไทย	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	erect	74	56	1	ขาว	erect	89	129
208	สกว 208	CA399 พริกชี้หนูพิษณุโลก	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	erect	81	51	1	ขาว	erect	93	129
209	สกว 209	CA848 พริกกะเหรี่ยง	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	63	55	1	ขาว	erect	84	129
210	สกว 210	CA854 พริกชี้หนู	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	61	47	1	ขาว	erect	86	129
211	สกว 211	CA857 พริกซ่อมผลห้อย	พริกผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	52	48	5-6	ขาว	intermediate	93	129
212	สกว 212	CA858 พริกซ่อมผลยาว	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	70	50	8-9	ขาว	erect	84	129
213	สกว 213	CA859 พริกซ่อมระย้า	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	66	53	5-6	ขาว	intermediate	86	129
214	สกว 214	CA860 พริกซ่อมผลสั้น	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	87	84	8-9	ขาว	erect	77	134
215	สกว 215	CA884 พริกชี้หนูเม็ดใหญ่	พริกชี้หนูผลใหญ่	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216	สกว 216	CA933 พริกชี้หนู	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	erect	-	-	2-3	ขาว	erect	81	-
217	สกว 217	CA935 พริกชี้หนู	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	erect	88	116	1	ขาว	erect	81	134
218	สกว 218	CA943 พริกชี้หนู	พริกชี้หนูผลใหญ่	-	-	-	-	-	-	-	-	-
219	สกว 219	CA945 พริกชี้หนู	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	erect	93	138	1	ขาว	erect	81	134
220	สกว 220	CA976 พริกชี้หนู	พริกชี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	erect	91	129	1	ขาว	intermediate, erect	81	134

ตารางที่ 4 (ต่อ) ลักษณะการเจริญเติบโต ลักษณะดอก อายุเก็บเกี่ยวของพริกพื้นเมือง 253 สายพันธุ์

ลำดับ	รหัส	สายพันธุ์	ประเภท	ชนิด	การ เจริญเติบโต ของทรงต้น	ความสูงต้นเมื่อ เก็บเกี่ยวครั้งแรก (ซ.ม.)	ความกว้างทรง พุ่มเมื่อเก็บเกี่ยว ครั้งแรก (ซ.ม.)	จำนวน ดอกต่อข้อ	สีดอก	ตำแหน่งดอก	อายุดอกบาน 50% (วันหลังเพาะ)	อายุเก็บเกี่ยว ครั้งแรก (วันหลังเพาะ)
221	สกว 221	CA984 พริกขี้หนู	พริกขี้หนูผลใหญ่	<i>frutescens</i>	erect	-	-	1	เหลืองเขียว	erect	-	-
222	สกว 222	CA985 พริกขี้หนู	พริกขี้หนูผลเล็ก	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	สกว 223	CA986 พริกขี้หนู	พริกขี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	80	124	1	ขาว	erect	74	134
224	สกว 224	CA987 พริกขี้หนู	พริกขี้หนูผลเล็ก	<i>annuum</i>	intermediate	90	76	1	ขาว	erect	87	134
225	สกว 225	CA988 พริกขี้หนูสวน	พริกขี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	erect	89	113	1	เหลืองเขียว	erect	77	134
226	สกว 226	CA1017 พริกห้วยสีทน MG-21	พริกขี้หนูผลเล็ก	<i>annuum</i>	erect	98	97	1	ขาว	erect	77	134
227	สกว 227	CA1018 พริกห้วยสีทน MG-22	พริกขี้หนูผลเล็ก	<i>annuum</i>	erect	66	94	1	ขาว	erect	74	134
228	สกว 228	CA1143 พริกขี้หนู	พริกขี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	erect	70	80	1	ขาว	intermediate	81	134
229	สกว 229	CA1161 พริกขี้หนู	พริกขี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	erect	107	142	1	ขาว	erect	84	134
230	สกว 230	CA1175 พริกขี้หนู	พริกขี้หนูผลเล็ก	-	-	-	-	-	-	-	-	-
231	สกว 231	CA1176 พริกขี้หนู	พริกขี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	erect	88	124	1	ขาว	erect	84	144
232	สกว 232	CA1259 พริกขี้หนูเม็ดใหญ่	พริกขี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	erect	99	133	1	ขาว	erect	84	134
233	สกว 233	CA1260 พริกขี้หนู	พริกขี้หนูผลเล็ก	<i>annuum</i>	erect	86	128	1	ขาว	erect	81	167
234	สกว 234	CA1261 พริกขี้หนู	พริกขี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	erect	84	90	1	เหลืองเขียว	erect	77	144
235	สกว 235	CA1263 พริกขี้หนู	พริกขี้หนูผลเล็ก	<i>annuum</i>	intermediate	96	127	1	ขาว	erect	77	134
236	สกว 236	CA1271 พริกขี้หนูเม็ดใหญ่	พริกขี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	erect	91	133	1	ขาว	erect	84	144
237	สกว 237	CA1280 พริกขี้หนู	พริกขี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	erect	92	100	1	ขาว	erect	77	134
238	สกว 238	CA1282 พริกขี้หนู	พริกขี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	84	79	1	ขาว	pendant	87	134
239	สกว 239	CA1288 พริกขี้หนูเม็ดขาว	พริกขี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	erect	83	107	1	เหลืองเขียว	erect	77	144
240	สกว 240	CA1290 พริกขี้หนู	พริกขี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	99	103	1	ขาว	erect	77	134

ตารางที่ 4 (ต่อ) ลักษณะการเจริญเติบโต ลักษณะดอก อายุเก็บเกี่ยวของพริกพื้นเมือง 253 สายพันธุ์

ลำดับ	รหัส	สายพันธุ์	ประเภท	ชนิด	การ เจริญเติบโต ของทรงต้น	ความสูงต้นเมื่อ เก็บเกี่ยวครั้งแรก (ซ.ม.)	ความกว้างทรง พุ่มเมื่อเก็บเกี่ยว ครั้งแรก (ซ.ม.)	จำนวน ดอกต่อข้อ	สีดอก	ตำแหน่งดอก	อายุดอกบาน 50% (วันหลังเพาะ)	อายุเก็บเกี่ยว ครั้งแรก (วันหลังเพาะ)
241	สกว 241	CA1329 พริกขี้หนู	พริกขี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	erect	57	87	3-5	ขาว	erect	77	134
242	สกว 242	CA1338 พริกขี้หนู P#348	พริกขี้หนูผลเล็ก	<i>annuum</i>	intermediate	100	111	1	ขาว	erect	77	134
243	สกว 243	CA1366 พริกหอม	พริกขี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	erect	103	120	1	เหลืองเขียว	erect	84	144
244	สกว 244	CA1372 พริกขี้หนู	พริกขี้หนูผลเล็ก	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245	สกว 245	CA1381 พริกกะเหรี่ยง	พริกขี้หนูผลใหญ่	<i>frutescens</i>	erect	-	-	1	เหลืองเขียว	erect	-	-
246	สกว 246	CA1399 พริกขี้หนู	พริกผลใหญ่	-	-	-	-	-	-	-	-	-
247	สกว 247	CA1412 พริกยอดสน	พริกผลใหญ่	-	-	-	-	-	-	-	-	-
248	สกว 248	CA1413 พริกอีสาน	พริกขี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	82	94	1	ขาว	erect	91	134
249	สกว 249	CA1435 พริกขี้หนูหอม	พริกขี้หนูผลเล็ก	<i>frutescens</i>	erect	83	137	1-2	เขียว	erect	77	144
250	สกว 250	CA1453 พริกสามเดือน ผล 1	พริกขี้หนูผลใหญ่	<i>annuum</i>	intermediate	94	117	1	ขาว	erect	77	134
251	สกว 251	CA1884 พริกขี้หนู	พริกผลใหญ่	<i>annuum</i>	prostrate	89	90	1	ขาว	intermediate	63	134
252	สกว 252	CA1888 พริกขี้หนูสวนกะเหรี่ยง	พริกขี้หนูผลเล็ก	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253	สกว 253	CA1891 พริกแต้อย่าง	พริกขี้หนูผลใหญ่	<i>frutescens</i>	erect	-	-	1	เหลืองเขียว	erect	91	-

ตารางที่ 5 ผลผลิต ลักษณะผล และน้ำหนักเมล็ด (Bulk) ของพริกพื้นเมือง 253 สายพันธุ์

ลำดับ	รหัส	สายพันธุ์	ผลผลิต		ลักษณะผล								น้ำหนักเมล็ด Bulk (กรัม)
			จำนวนผล ต่อต้น	น้ำหนัก ผลผลิตต่อต้น (กรัม)	รูปร่างผล	สีผลอ่อน	สีผลสุก	รูปร่างขั้วผล	น้ำหนักผล (กรัม)	กว้างผล (ซ.ม.)	ยาวผล (ซ.ม.)	หนาเนื้อ (มม.)	
1	สกว 1	พริกหัวเรียว	0.3	0.4	elongate	เขียว	แดง	obtuse	2.1	0.6	6.0	0.33	282.33
2	สกว 2	พริกหัวเรียว	0.3	0.3	elongate	เขียว	แดง	obtuse	2.8	0.8	7.2	0.80	270.26
3	สกว 3	พริกขี้นุสว	4	1	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.4	0.5	2.2	0.43	241.19
4	สกว 4	พริกมัน	45	21	elongate	เขียว	แดง	obtuse	2.6	0.9	6.5	0.73	697.72
5	สกว 5	พริกสีดา	93	123	elongate	เขียว	แดง	obtuse	2.7	0.7	7.2	0.66	106.46
6	สกว 6	พริกขี้นุสว	18	41	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.6	0.5	3.3	0.47	240.01
7	สกว 7	พริกบางลี่	0	0	elongate	เขียว	แดง	obtuse	2.4	0.8	5.9	0.67	395.61
8	สกว 8	พริกวัดโบสถ์ (ผลใหญ่ยาว)	2	8	elongate	เขียว	แดง	obtuse	6.5	1.5	8.4	1.34	168.48
9	สกว 9	พริกวัดโบสถ์ (ผลอ้วนป้อม)	1	1	elongate	เขียว	แดง	obtuse	6.2	1.4	7.2	1.35	286.48
10	สกว 10	พริกวัดโบสถ์ (ผลผอมยาว)	1	1	elongate	เขียว	แดง	obtuse	5.8	1.3	9.6	1.02	219.94
11	สกว 11	พริกมันพิชัย	0	0	elongate	เขียว	แดง	obtuse	10.1	1.6	11.0	1.35	172.86
12	สกว 12	พริกขี้นุสว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
13	สกว 13	พริกพม่า	2	6	campanulate	เขียว	แดง	truncate/obtuse	0.9	1.9	3.8	1.41	310.38
14	สกว 14	พริกขี้นุสว	46	88	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.7	0.4	1.9	0.25	153.74
15	สกว 15	พริกยอดสนเล็ก	6	9	elongate	เขียว	แดง	obtuse	1.9	0.5	4.6	0.50	100.28
16	สกว 16	พริกยอดสนเล็ก	1	0.4	elongate	เขียวอ่อน	แดง	obtuse	1.8	0.6	7.7	0.68	146.72
17	สกว 17	พริกขี้นุสว	36	25	elongate	เขียวอมขาว	แดงส้ม	obtuse	1	0.6	4.7	0.46	207.08
18	สกว 18	พริกกะเหรี่ยง	1	1	elongate	ขาว	แดง	acute	1.2	0.8	3.8	0.50	156.76
19	สกว 19	พริกกะเหรี่ยงหนองหญ้าปล้อง	0	0	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.7	0.5	3.6	0.38	94.91
20	สกว 20	พริกแก้ว	0	0	elongate	เขียว	แดง	obtuse	2.4	0.8	5.4	0.85	474.05

ตารางที่ 5 (ต่อ) ผลผลิต ลักษณะผล และน้ำหนักเมล็ด (Bulk) ของพริกพื้นเมือง 253 สายพันธุ์

ลำดับ	รหัส	สายพันธุ์	ผลผลิต		ลักษณะผล								น้ำหนักเมล็ด Bulk (กรัม)
			จำนวนผลที่ ต่อต้น	น้ำหนัก ผลผลิตต่อต้น (กรัม)	รูปร่างผล	สีผลอ่อน	สีผลสุก	รูปร่างขั้วผล	น้ำหนักผล (กรัม)	กว้างผล (ซ.ม.)	ยาวผล (ซ.ม.)	หนาเนื้อ (มม.)	
21	สกว 21	พริกแดง(ขี้หนู)	8	16	elongate	เขียว	แดง	acute	2.5	1.0	5.0	0.77	118.4
22	สกว 22	พริกเล็บมือนาง	3	14	elongate	เขียวอ่อน	แดง	obtuse	2.7	0.9	7.6	0.82	52.24
23	สกว 23	พริกหัวเรียว	0	0	elongate	เขียว	แดง	obtuse	4.4	1.1	7.5	1.11	166.28
24	สกว 24	พริกขี้ดา	2	1	elongate	เขียว	แดง	acute	0.4	0.5	2.5	0.58	88.69
25	สกว 25	พริกแซว	6	6	elongate	เขียว	แดง	obtuse	2.3	0.8	5.9	0.97	299.25
26	สกว 26	พริกข่อ	4	38	elongate	เขียว	แดง	obtuse	2.5	1.0	8.8	1.19	161.41
27	สกว 27	พริกม้ง	2	5	elongate	เขียว	แดง	obtuse	1.5	0.7	4.9	0.60	297.41
28	สกว 28	พริกม้ง	0	0	elongate	เขียว	แดง	acute	1.6	0.7	5.1	0.59	225.52
29	สกว 29	พริกแดง/แดง	1	1	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.8	0.6	3.7	0.43	249.82
30	สกว 30	พริกปอบพวง	19	46	elongate	เขียว	แดง	obtuse	1.2	1.0	3.4	0.62	76.4
31	สกว 31	พริกน้อย	13	15	elongate	เขียว	แดง	acute	1.9	0.6	3.8	0.37	196.33
32	สกว 32	พริกน้อย	19	26	elongate	ขาว	แดง	acute	2.5	1.4	4.3	1.14	147.56
33	สกว 33	พริกกะเหรี่ยง	0	0	elongate	ขาว	แดง	acute	2	1.0	4.7	0.98	467.42
34	สกว 34	พริกยอดสนเล็ก	14	17	elongate	เขียว	แดง	obtuse	1.5	0.6	7.9	0.54	159.15
35	สกว 35	พริกเหลืองทอง	0	0	elongate	เขียวอ่อน	แดง	obtuse	2	0.7	7.2	0.71	38.57
36	สกว 36	พริกปลัก/พลาสดัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
37	สกว 37	พริกกันขันธ์	1	1	elongate	เหลืองอ่อน	แดงส้ม	obtuse	2.5	0.9	6.1	0.78	530.35
38	สกว 38	พริกเหลือง	1	1	elongate	เขียว	เหลือง	obtuse	10.5	1.9	6.8	2.35	172.62
39	สกว 39	พริกขี้หนูนา	2	6	elongate	เขียว	แดง	acute	0.9	0.6	3.7	0.57	239.58
40	สกว 40	พริกขี้หนูสวน	39	42	elongate	เขียว	แดง	acute	0.8	0.6	2.7	0.66	10.73

ตารางที่ 5 (ต่อ) ผลผลิต ลักษณะผล และน้ำหนักเมล็ด (Bulk) ของพริกพื้นเมือง 253 สายพันธุ์

ลำดับ	รหัส	สายพันธุ์	ผลผลิต		ลักษณะผล								น้ำหนักเมล็ด Bulk (กรัม)
			จำนวนผลดีต่อต้น	น้ำหนักผลผลิตดีต่อต้น (กรัม)	รูปร่างผล	สีผลอ่อน	สีผลสุก	รูปร่างขั้วผล	น้ำหนักผล (กรัม)	กว้างผล (ซ.ม.)	ยาวผล (ซ.ม.)	หนาเนื้อ (มม.)	
41	สกว 41	พริกยอดสนด้านขุนทด	15	15	elongate	เขียว	แดง	acute	1.0	0.6	5.9	0.67	49.05
42	สกว 42	พริกกะเหรี่ยงหนองหญ้าปล้อง	4	5	elongate	เขียว	แดง	acute	1.3	0.5	3.5	0.58	15.51
43	สกว 43	พริกขาว	40	45	elongate	ขาว	แดงส้ม	obtuse	1.1	0.9	3.0	0.91	130.86
44	สกว 44	พริก off-type หยกสยาม	8	38	elongate	เขียวเข้ม	แดง	obtuse	4.8	1.2	9.0	1.42	34.1
45	สกว 45	พริกบ้านยอด	18	21	elongate	เขียว	แดง	obtuse	1.2	0.8	5.5	0.86	42.77
46	สกว 46	พริกบ้านยอด	101	146	elongate	เขียว	แดง	obtuse	1.4	0.9	4.1	1.15	438.37
47	สกว 47	พริกกะเหรี่ยงทุ่งช้าง	51	22	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.4	0.5	3.7	0.75	94.29
48	สกว 48	พริกอีปาด	10	19	elongate	เขียว	แดง	obtuse	1.9	0.8	5.6	1.18	53.65
49	สกว 49	พริกข่อวังชน	13	28	elongate	เขียว	แดง	obtuse	2.2	0.9	5.9	1.17	62.27
50	สกว 50	พริกจินดายอดสน	27	14	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.5	0.6	4.0	0.79	42.62
51	สกว 51	พริกดีปลาลือ	18	27	elongate	เขียว	แดง	acute	1.5	0.8	4.8	0.99	49.09
52	สกว 52	พริกคอย	69	25	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.4	0.5	2.0	0.34	111.43
53	สกว 53	พริกกระเทียม	30	59	elongate	เขียวเข้ม	แดง	truncate	2.0	1.0	6.2	1.17	158.68
54	สกว 54	พริกคอย	4	3	elongate	ขาว	แดง	obtuse	0.8	0.7	3.1	0.84	11.64
55	สกว 55	พริกขี้หนูนาแล	2	0.3	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.2	0.4	1.2	0.34	0.62
56	สกว 56	พริกเมือง/กันห้อย	14	30	elongate	เขียว	แดง	obtuse	2.1	0.9	6.6	0.90	189.24
57	สกว 57	พริกใหญ่บ้านก่ง	10	132	elongate	เขียวเข้ม	แดง	truncate	13.2	1.9	11.2	2.05	138.36
58	สกว 58	พริกใหญ่ทุ่งนาว	14	250	elongate	เขียว	แดง	truncate	17.9	2.4	15.3	3.01	169.12
59	สกว 59	พริกขี้หนูสวน	29	7	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.2	0.6	1.8	0.24	17.97
60	สกว 60	พริกสวนลับแล	28	12	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.4	0.5	2.0	0.48	48.18

ตารางที่ 5 (ต่อ) ผลผลิต ลักษณะผล และน้ำหนักเมล็ด (Bulk) ของพริกพื้นเมือง 253 สายพันธุ์

ลำดับ	รหัส	สายพันธุ์	ผลผลิต		ลักษณะผล								น้ำหนักเมล็ด Bulk (กรัม)
			จำนวนผลดี ต่อต้น	น้ำหนัก ผลผลิตดีต่อต้น (กรัม)	รูปร่างผล	สีผลอ่อน	สีผลสุก	รูปร่างขั้วผล	น้ำหนักผล (กรัม)	กว้างผล (ซ.ม.)	ยาวผล (ซ.ม.)	หนาเนื้อ (ม.ม.)	
61	สกว 61	พริกตุ้ม	2	1	elongate	เขียวเข้ม	แดง	obtuse	0.5	0.6	1.9	0.45	12.03
62	สกว 62	พริกชี้หูห้องสูงแปลง 1	55	17	elongate	เขียวอ่อน	แดง	obtuse	0.3	0.5	1.7	0.56	71.14
63	สกว 63	พริกชี้หูห้องสูงแปลง 2	20	5	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.3	0.5	1.7	0.53	28.21
64	สกว 64	พริกชี้หูห้องสูงแปลง 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
65	สกว 65	พริกหนุ่มลัปลาด	10	114	elongate	เขียว	แดง	truncate	11.4	2.0	10.2	2.03	132.88
66	สกว 66	พริกแจว	4	3	elongate	เขียว	แดง	obtuseT	0.8	0.7	2.6	0.58	8.41
67	สกว 67	พริกใหญ่	1	6	elongate	เขียว	แดง	truncate	6.0	1.1	5.5	1.19	18.79
68	สกว 68	พริกหอม	24	12	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.5	0.9	3.5	0.99	54.65
69	สกว 69	พริกแจวหอม	26	15	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.6	0.7	2.9	0.88	71.05
70	สกว 70	พริกแม่แวแม่สอด	15	11	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.7	0.7	4.1	0.77	21.35
71	สกว 71	พริกกะเหรี่ยง	31	9	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.3	0.4	2.8	0.69	27.48
72	สกว 72	พริกจินดา	18	56	elongate	เขียว	แดง	obtuse	3.1	1.1	7.5	1.18	69.29
73	สกว 73	พริกหัวเรือ	6	13	elongate	เขียว	แดง	obtuse	2.2	0.9	6.1	0.93	7.36
74	สกว 74	พริกขาว	36	80	elongate	ขาว	ส้ม	obtuse	2.2	1.1	5.3	1.04	132.39
75	สกว 75	พริกหัวเรือยัน	29	52	elongate	เขียว	แดง	obtuse	1.8	0.8	4.6	1.14	176.45
76	สกว 76	พริกหัวเรือยันบ้านอึปาด	25	38	elongate	เขียวอ่อน	แดง	obtuse	1.5	0.8	5.0	0.99	86.18
77	สกว 77	พริกขาว	8	27	elongate	ขาวเขียว	แดง	obtuse	3.4	0.9	3.9	1.18	90.91
78	สกว 78	พริกขาว/เครือ	65	21	elongate	ขาว	แดง	obtuse	0.3	0.7	2.9	0.73	90.77
79	สกว 79	พริกบ้าน	31	28	elongate	ขาว	แดง	obtuse	0.9	0.9	3.7	1.19	42.37
80	สกว 80	พริกชี้/หนัก	2	2	elongate	ขาว	แดง	obtuse	1.0	0.5	-	0.69	2.26

ตารางที่ 5 (ต่อ) ผลผลิต ลักษณะผล และน้ำหนักเมล็ด (Bulk) ของพริกพื้นเมือง 253 สายพันธุ์

ลำดับ	รหัส	สายพันธุ์	ผลผลิต		ลักษณะผล								น้ำหนักเมล็ด Bulk (กรัม)
			จำนวนผลดีต่อต้น	น้ำหนักผลผลิตดีต่อต้น (กรัม)	รูปร่างผล	สีผลอ่อน	สีผลสุก	รูปร่างขั้วผล	น้ำหนักผล (กรัม)	กว้างผล (ซ.ม.)	ยาวผล (ซ.ม.)	หนาเนื้อ (ม.ม.)	
81	สกว 81	พริกกะเหรียง	6	4	elongate	เขียวอ่อน	แดงส้ม	obtuse	0.7	0.9	3.0	1.05	8.83
82	สกว 82	พริกกะเหรียงข้อ	12	5	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.4	0.5	2.6	0.64	18.48
83	สกว 83	พริกใหญ่	31	126	elongate	เขียว	แดง	truncate	4.1	1.4	7.0	1.39	290.14
84	สกว 84	พริกเดือย	79	120	elongate	เขียว	แดง	obtuse	1.5	0.8	5.4	1.16	415.5
85	สกว 85	พริกแซว	29	47	elongate	เขียว	แดง	obtuse	1.6	1.0	6.7	1.23	125.83
86	สกว 86	พริกมั่ง	12	4	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.3	0.6	3.2	0.60	14.63
87	สกว 87	พริกดำป่น 1	15	68	elongate	เขียวอ่อน	แดง	truncate	4.5	1.1	7.6	1.32	119.14
88	สกว 88	พริกดำป่น 2	5	18	elongate	เขียว	แดง	truncate	3.6	0.9	7.4	1.11	9.12
89	สกว 89	พริกแจ่ว	6	21	elongate	เขียวอ่อน	แดง	truncate	3.5	1.1	6.0	1.20	39.52
90	สกว 90	พริกแจ่ว	8	27	elongate	เขียวอ่อน	แดง	truncate	3.4	1.1	6.5	0.95	43.41
91	สกว 91	พริกแจ่ว	24	93	elongate	เขียว	แดง	truncate	3.9	0.9	9.0	1.28	119.34
92	สกว 92	พริกแจ่ว	1	3	elongate	เขียวอ่อน	แดง	truncate	3.0	1.1	8.9	1.17	18.02
93	สกว 93	พริกยอดสนใหญ่	17	25	elongate	เขียว	แดง	obtuse	1.5	0.6	6.5	0.82	117.41
94	สกว 94	พริกยอดสนเล็ก	6	10	elongate	เขียว	แดง	obtuse	1.7	0.6	4.7	0.57	56.87
95	สกว 95	พริกกระดุม	10	14	elongate	เขียว	แดง	obtuse	1.4	0.9	4.4	0.88	95.87
96	สกว 96	พริกแซวหลังนา	19	30	elongate	เขียว	แดง	obtuse	1.6	0.8	6.3	1.00	40.9
97	สกว 97	พริกพื้นเมืองห้องสูง	50	16	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.3	0.6	2.0	0.62	47.83
98	สกว 98	พริกครกแตก	16	49	elongate	เขียว	แดง	Obtuse	3.1	0.9	6.7	0.78	58.52
99	สกว 99	พริกจินดา	14	24	elongate	เขียว	แดง	obtuse	1.7	0.7	6.4	0.96	56.03
100	สกว 100	พริกขี้นุบ้านห้องสูง	54	16	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.3	0.5	1.9	0.60	56.92

ตารางที่ 5 (ต่อ) ผลผลิต ลักษณะผล และน้ำหนักเมล็ด (Bulk) ของพริกพื้นเมือง 253 สายพันธุ์

ลำดับ	รหัส	สายพันธุ์	ผลผลิต		ลักษณะผล								น้ำหนักเมล็ด Bulk (กรัม)
			จำนวนผลดีต่อต้น	น้ำหนักผลผลิตดีต่อต้น (กรัม)	รูปร่างผล	สีผลอ่อน	สีผลสุก	รูปร่างขั้วผล	น้ำหนักผล (กรัม)	กว้างผล (ซ.ม.)	ยาวผล (ซ.ม.)	หนาเนื้อ (มม.)	
101	สกว 101	พริกขี้หนู	59	17	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.3	0.6	2.2	0.58	30.44
102	สกว 102	พริกใหญ่	7	49	elongate	เขียว	แดง	truncate	7.0	1.6	10.3	1.68	52.2
103	สกว 103	พริกอีโตะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
104	สกว 104	พริกนา-1	7	8	elongate	เขียว	แดง	obtuse	1.1	0.5	1.9	0.40	16.53
105	สกว 105	พริกนา-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
106	สกว 106	พริกหอมตราด	10	6	elongate	เขียวอ่อน	แดง	obtuse	0.6	0.8	4.9	0.23	12.14
107	สกว 107	พริกแหลมกลัด	16	7	elongate	เขียวอ่อน	แดง	obtuse	0.4	0.6	3.2	0.70	19.37
108	สกว 108	พริกขี้หนูสวน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
109	สกว 109	พริกขี้หนูสวน	5	1	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.2	0.5	1.9	0.55	2.37
110	สกว 110	พริกจินดาเขมร	35	23	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.7	0.6	3.3	0.66	56.22
111	สกว 111	พริกขี้หนูสวน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
112	สกว 112	พริกขี้หนูสวน	10	5	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.5	0.7	2.6	0.75	11.78
113	สกว 113	พริกขี้หนูสวน ต้น1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
114	สกว 114	พริกขี้หนูสวน ต้น2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
115	สกว 115	พริกขี้หนูสวน ต้น3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
116	สกว 116	พริกตุ้ม	12	9	almost round	เขียว	แดง	truncate	0.8	1.3	1.4	1.26	25.14
117	สกว 117	พริกยอดสนเล็ก	41	19	elongate	เขียว	แดง	acute	0.5	0.5	4.6	0.46	38.13
118	สกว 118	พริกขี้หนูเมือง	15	24	elongate	เขียว	แดง	obtuse	1.6	0.9	7.2	0.90	52.48
119	สกว 119	พริกขี้หนูแต้	4	2	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.5	0.6	2.4	0.74	3.86
120	สกว 120	พริกแดกกลาง	1	1	elongate	เขียว	แดง	obtuse	1.0	0.9	3.8	0.63	1.86

ตารางที่ 5 (ต่อ) ผลผลิต ลักษณะผล และน้ำหนักเมล็ด (Bulk) ของพริกพื้นเมือง 253 สายพันธุ์

ลำดับ	รหัส	สายพันธุ์	ผลผลิต		ลักษณะผล								น้ำหนักเมล็ด Bulk (กรัม)
			จำนวนผลดี ต่อต้น	น้ำหนัก ผลผลิตดีต่อต้น (กรัม)	รูปร่างผล	สีผลอ่อน	สีผลสุก	รูปร่างขั้วผล	น้ำหนักผล (กรัม)	กว้างผล (ซ.ม.)	ยาวผล (ซ.ม.)	หนาเนื้อ (มม.)	
121	สกว 121	พริกแฉกกลาง	4	3	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.8	0.8	3.5	0.79	4.54
122	สกว 122	พริกเขียว	13	134	elongate	เขียว	แดง	truncate	10.3	1.8	11.5	2.02	75.07
123	สกว 123	พริกแฉกเขียงดาว	2	1	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.5	0.5	3.1	0.85	1.86
124	สกว 124	พริกแฉกใหญ่ลำพูน	1	1	elongate	เขียว	แดง	obtuse	1.0	0.7	3.0	0.32	2.19
125	สกว 125	พริกค้อยแม่สะเรียง	5	1	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.2	0.5	2.0	0.62	4.13
126	สกว 126	พริกส้ม/ป๊อป/พวง	7	25	elongate	เขียวขาว	แดง	obtuse	3.6	0.8	3.8	0.99	10.95
127	สกว 127	พริกเดี่ยวไก่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
128	สกว 128	พริกซี	14	11	elongate	ขาว	แดง	obtuse	0.8	0.8	3.6	-	29.21
129	สกว 129	พริกยอดสนเล็ก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เมล็ดไม่งอก
130	สกว 130	พริกขี้หนูบ้านปางแก	2	1	elongate	เขียว	แดง	acute	0.5	0.4	1.5	0.35	0.76
131	สกว 131	พริกน้อย/พริกตุ้ม	7	4	elongate	เขียวขาว	แดงส้ม	obtuse	0.6	0.6	3.4	0.73	661
132	สกว 132	พริกห้อยฝา/พริกป๊อป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เมล็ดไม่งอก
133	สกว 133	พริกช่อระย้า	58	35	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.6	0.6	3.0	0.60	74.4
134	สกว 134	พริกกะเหรี่ยง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
135	สกว 135	พริกป๊อป	28	32	elongate	เขียวขาว	แดงส้ม	obtuse	1.1	0.9	5.1	0.83	80.93
136	สกว 136	พริกกะเหรี่ยงหนองหญ้าปล้อง	2	2	elongate	เขียว	แดง	acute	1.0	0.3	2.3	0.46	1.31
137	สกว 137	พริกม้ง	4	2	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.5	0.7	4.3	0.64	3.55
138	สกว 138	พริกม้ง	9	4	elongate	เขียว	แดง	acute	0.4	0.5	3.4	0.60	7.41
139	สกว 139	พริกขี้หนู/ติปลี	3	2	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.7	0.7	2.4	0.80	4.21
140	สกว 140	พริกกะเหรี่ยง	1	1	elongate	เขียว	แดง	acute	1.0	0.6	3.3	0.70	1.62

ตารางที่ 5 (ต่อ) ผลผลิต ลักษณะผล และน้ำหนักเมล็ด (Bulk) ของพริกพื้นเมือง 253 สายพันธุ์

ลำดับ	รหัส	สายพันธุ์	ผลผลิต		ลักษณะผล								น้ำหนักเมล็ด Bulk (กรัม)
			จำนวนผลดีต่อต้น	น้ำหนักผลผลิตดีต่อต้น (กรัม)	รูปร่างผล	สีผลอ่อน	สีผลสุก	รูปร่างขั้วผล	น้ำหนักผล (กรัม)	กว้างผล (ซ.ม.)	ยาวผล (ซ.ม.)	หนาเนื้อ (ม.ม.)	
141	สกว 141	พริกเลื้อย	1	0.3	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.3	0.6	2.1	0.69	0.98
142	สกว 142	พริกกะเหรี่ยง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
143	สกว 143	พริกขาว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
144	สกว 144	พริกส้มปากปวน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
145	สกว 145	พริกใหญ่วัดโบสถ์	4	8	elongate	เขียวอ่อน	แดง	obtuse	2.0	0.8	6.3	0.70	16.37
146	สกว 146	พริกจินดาวัดโบสถ์	23	23	elongate	เขียว	แดง	obtuse	1.0	0.7	6.5	0.70	62.76
147	สกว 147	พริกแซวพื้นเมือง	40	37	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.9	0.6	4.4	0.70	91.74
148	สกว 148	พริกพื้นเมืองบ้านก่ง	5	66	elongate	เขียว	แดง	obtuse	13.2	1.8	15.2	2.10	52.92
149	สกว 149	พริกจินดาพื้นเมือง	7	14	elongate	เขียว	แดง	obtuse	2.0	1.9	6.9	0.25	24.18
150	สกว 150	พริกแซวกระเทียม	22	76	elongate	เขียว	แดง	truncate	3.5	1.2	7.1	1.41	103.76
151	สกว 151	พริกจินดาดำ	1	2	elongate	เขียว	แดง	obtuse	2.0	1.8	7.5	0.49	5.12
152	สกว 152	พริกสร้อยสน	3	8	elongate	เขียว	แดง	obtuse	2.7	1.1	6.9	0.95	17.71
153	สกว 153	พริกยอดสน	3	3	elongate	เขียว	แดง	obtuse	1.0	0.5	4.7	0.67	7.11
154	สกว 154	CA032 พริกเดือยไก่	75	67	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.9	0.7	4.7	0.69	129.85
155	สกว 155	CA034 พริกหอมสีขาว	107	45	elongate	ขาว	แดงส้ม	truncate	0.4	0.7	2.5	0.51	96.59
156	สกว 156	CA050 พริกขี้หนู	10	2	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.2	0.5	1.8	0.36	3.92
157	สกว 157	CA052 พริกขี้หนู	4	1	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.3	0.5	2.1	0.38	1.73
158	สกว 158	CA053 พริกขี้หนู-กรุงเทพ	117	76	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.6	0.6	4.4	0.60	157.85
159	สกว 159	CA054 พริกขี้หนูบ้านยาว	61	61	elongate	เขียว	แดง	acute	1.0	0.6	6.3	0.98	112.99
160	สกว 160	CA062 พริกขี้หนู	99	74	elongate	เขียว	แดง	truncate	0.7	1.0	2.4	0.32	123.03

ตารางที่ 5 (ต่อ) ผลผลิต ลักษณะผล และน้ำหนักเมล็ด (Bulk) ของพริกพื้นเมือง 253 สายพันธุ์

ลำดับ	รหัส	สายพันธุ์	ผลผลิต		ลักษณะผล								น้ำหนักเมล็ด Bulk (กรัม)
			จำนวนผลดีต่อต้น	น้ำหนักผลผลิตดีต่อต้น (กรัม)	รูปร่างผล	สีผลอ่อน	สีผลสุก	รูปร่างขั้วผล	น้ำหนักผล (กรัม)	กว้างผล (ซ.ม.)	ยาวผล (ซ.ม.)	หนาเนื้อ (ม.ม.)	
161	สกว 161	CA071 พริกหอม	67	16	elongate	เขียวอ่อน	แดง	acute	0.2	0.5	2.3	0.50	31.63
162	สกว 162	CA111 พริกจินดา	16	20	elongate	เขียวอมขาว	แดงส้ม	acute	1.3	0.9	5.1	1.21	18.12
163	สกว 163	CA130 พริกขี้หนู	52	45	elongate	เขียวอ่อน	แดง	truncate	0.9	0.9	3.0	0.82	71.27
164	สกว 164	CA131 พริกขี้หนู	22	23	elongate	เขียวอ่อน	แดง	acute	1.0	0.7	4.4	0.89	30.69
165	สกว 165	CA138 พริกขี้หนู	70	118	elongate	เขียว	แดง	obtuse	1.7	0.7	6.1	0.58	207.18
166	สกว 166	CA139 พริกขี้หนู	105	125	elongate	เขียว	แดง	obtuse	1.2	0.8	5.3	0.76	251.52
167	สกว 167	CA141 พริกขี้หนู	18	22	elongate	เขียวอมขาว	แดงส้ม	acute	1.2	0.7	5.1	0.62	16.34
168	สกว 168	CA143 พริกขี้หนู	28	36	elongate	เขียว	แดง	obtuse	1.3	0.8	6.6	1.03	51.16
169	สกว 169	CA150 พริกขี้หนู	45	59	elongate	เขียวอ่อน	แดง	acute	1.3	0.9	4.7	0.93	46.26
170	สกว 170	CA170 พริกขี้หนู	220	420	elongate	เขียวอ่อน	แดง	obtuse	1.9	1.0	6.4	1.13	350.21
171	สกว 171	CA172 พริกขี้หนู	112	219	elongate	เขียว	แดง	obtuse	2.0	0.9	6.8	1.25	199.72
172	สกว 172	CA175 พริกขี้หนู	205	272	elongate	เขียว	แดง	obtuse	1.3	0.8	9.2	1.02	376.09
173	สกว 173	CA177 พริกขี้หนู	205	368	elongate	เขียวอ่อน	แดง	obtuse	1.8	1.3	6.5	0.95	332.04
174	สกว 174	CA189 พริกขี้หนู	128	259	elongate	เขียว	แดง	obtuse	2.0	1.0	5.5	0.74	347.9
175	สกว 175	CA198 พริกขี้หนู	52	89	elongate	เขียว	แดง	obtuse	1.7	0.9	6.3	1.18	77.05
176	สกว 176	CA218 พริกขี้หนู	103	222	elongate	เขียว	แดง	truncate	2.2	0.6	8.5	1.19	194.22
177	สกว 177	CA224 พริกขี้หนู	159	400	elongate	เขียว	แดง	acute	2.5	1.0	6.9	1.45	285.57
178	สกว 178	CA225 พริกขี้หนู	86	143	elongate	เขียว	แดง	acute	1.7	0.9	6.1	0.93	122.6
179	สกว 179	CA262 พริกขี้หนูเหลือง	110	149	elongate	เขียวอ่อน	แดง	acute	1.4	0.8	5.5	0.96	196.61
180	สกว 180	CA274 พริกขี้หนู	24	14	elongate	ขาว	แดงส้ม	truncate	0.6	0.8	2.6	0.55	30.01

ตารางที่ 5 (ต่อ) ผลผลิต ลักษณะผล และน้ำหนักเมล็ด (Bulk) ของพริกพื้นเมือง 253 สายพันธุ์

ลำดับ	รหัส	สายพันธุ์	ผลผลิต		ลักษณะผล								น้ำหนักเมล็ด Bulk (กรัม)
			จำนวนผลดีต่อต้น	น้ำหนักผลผลิตดีต่อต้น (กรัม)	รูปร่างผล	สีผลอ่อน	สีผลสุก	รูปร่างขั้วผล	น้ำหนักผล (กรัม)	กว้างผล (ซ.ม.)	ยาวผล (ซ.ม.)	หนาเนื้อ (ม.ม.)	
181	สกว 181	CA275 พริกขี้หนุเกสร	88	117	elongate	เขียว	แดง	obtuse	1.3	0.9	4.9	0.82	265.8
182	สกว 182	CA276 พริกขี้หนุเกสร	38	27	elongate	เขียว	แดง	acute	0.7	0.6	4.4	0.72	57.26
183	สกว 183	CA281 พริกขี้หนุ	189	94	elongate	เขียว	แดง	acute	0.5	0.6	4.4	0.96	180.24
184	สกว 184	CA283 พริกขี้หนุ	106	31	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.3	0.5	2.3	0.65	81.21
185	สกว 185	CA285 พริกสวน	96	36	elongate	เขียว	แดง	acute	0.4	0.4	6.8	0.41	79.22
186	สกว 186	CA286 พริกขี้หนุ	265	303	elongate	เขียว	แดง	obtuse	1.1	0.9	4.5	0.65	741.41
187	สกว 187	CA291 พริกขี้หนุสวน	78	22	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.3	0.5	2.2	0.40	32.64
188	สกว 188	CA312 พริกขี้หนุ	98	292	elongate	เขียว	แดง	acute	3.0	1.0	6.9	0.99	252.68
189	สกว 189	CA316 พริกขี้หนุ	34	61	elongate	เขียว	แดง	acute	1.8	0.9	6.5	0.97	71.96
190	สกว 190	CA317 พริกขี้หนุสวน	66	16	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.2	0.5	1.1	0.31	45.28
191	สกว 191	CA318 พริกขี้หนุ	27	65	elongate	เขียว	แดง	truncate	2.4	1.1	6.4	0.84	57.74
192	สกว 192	CA320 พริกจินดา	189	169	elongate	เขียว	แดง	acute	0.9	0.5	5.3	0.56	422.24
193	สกว 193	CA322 พริกขี้หนุ	21	11	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.5	0.6	2.2	0.35	18.31
194	สกว 194	CA335 พริกขี้หนุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
195	สกว 195	CA341 พริกขี้หนุสวน	27	6	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.2	0.5	1.4	0.35	12.7
196	สกว 196	CA346 พริกจินดา	44	40	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.9	0.7	3.8	0.76	80.85
197	สกว 197	CA350 พริกกะเหรี่ยง	46	21	elongate	เขียว	แดง	acute	0.5	0.6	2.6	0.57	41.32
198	สกว 198	CA353 พริกขี้หนุ	46	24	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.5	0.6	3.0	0.65	45.36
199	สกว 199	CA355 พริกกะเหรี่ยง	72	34	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.5	0.5	2.4	0.59	65.12
200	สกว 200	CA364 พริกห้วยสีทน	231	263	elongate	เขียว	แดง	obtuse	1.1	0.8	4.1	0.52	627.33

ตารางที่ 5 (ต่อ) ผลผลิต ลักษณะผล และน้ำหนักเมล็ด (Bulk) ของพริกพื้นเมือง 253 สายพันธุ์

ลำดับ	รหัส	สายพันธุ์	ผลผลิต		ลักษณะผล								น้ำหนักเมล็ด Bulk (กรัม)
			จำนวนผลดีต่อต้น	น้ำหนักผลผลิตดีต่อต้น (กรัม)	รูปร่างผล	สีผลอ่อน	สีผลสุก	รูปร่างขั้วผล	น้ำหนักผล (กรัม)	กว้างผล (ซ.ม.)	ยาวผล (ซ.ม.)	หนาเนื้อ (มม.)	
201	สกว 201	CA368 พริกนกบางเลน	125	249	elongate	เขียว	แดง	obtuse	2.0	0.7	7.0	0.55	393.97
202	สกว 202	CA369 พริกหัวเรืออุบล	196	331	elongate	เขียวอ่อน	แดง	obtuse	1.7	0.7	5.4	0.70	311.95
203	สกว 203	CA372 พริกขี้หนูสวน	106	41	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.4	0.5	2.3	0.37	69.47
204	สกว 204	CA387 พริกขี้หนูดอง	20	36	elongate	เขียว	แดง	acute	1.8	0.8	5.8	1.07	15.39
205	สกว 205	CA394 พริกขี้หนูเมืองเพชรบูรณ์	49	16	elongate	เขียว	แดง	acute	0.3	0.5	2.8	0.48	21.12
206	สกว 206	CA397 พริกนกบ้านโป่ง	141	126	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.9	0.7	4.0	0.47	289.22
207	สกว 207	CA398 พริกขี้หนูไทย	225	254	elongate	เขียว	แดง	acute	1.1	0.8	5.0	0.64	597.56
208	สกว 208	CA399 พริกขี้หนูพิษณุโลก	137	118	elongate	เขียว	แดง	acute	0.9	0.7	3.4	0.46	309.11
209	สกว 209	CA848 พริกกะเหรี่ยง	123	200	elongate	เขียว	แดง	obtuse	1.6	1.0	5.7	0.96	232.38
210	สกว 210	CA854 พริกขี้หนู	137	83	elongate	เขียว	แดง	acute	0.6	0.6	4.4	0.63	203.38
211	สกว 211	CA857 พริกข้อมผลห้อย	109	370	elongate	เขียว	แดง	truncate	3.4	1.1	8.8	1.23	125.49
212	สกว 212	CA858 พริกข้อมผลยาว	369	334	elongate	เขียว	แดง	acute	0.9	0.7	4.7	0.57	691.4
213	สกว 213	CA859 พริกข้อมระย้า	245	196	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.8	0.5	12.9	0.59	333.35
214	สกว 214	CA860 พริกข้อมผลสั้น	120	77	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.6	0.7	3.6	0.63	217.38
215	สกว 215	CA884 พริกขี้หนูเม็ดใหญ่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เมล็ดไม่ออก
216	สกว 216	CA933 พริกขี้หนู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
217	สกว 217	CA935 พริกขี้หนู	9	9	elongate	เขียว	แดง	obtuse	1.0	0.9	6.5	0.90	26.16
218	สกว 218	CA943 พริกขี้หนู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เมล็ดไม่ออก
219	สกว 219	CA945 พริกขี้หนู	1	1	elongate	เขียว	แดง	obtuse	1.0	0.7	3.9	0.71	4.23
220	สกว 220	CA976 พริกขี้หนู	4	6	elongate	เขียวเข้ม	แดง	obtuse	1.5	0.7	5.5	0.82	9.55

ตารางที่ 5 (ต่อ) ผลผลิต ลักษณะผล และน้ำหนักเมล็ด (Bulk) ของพริกพื้นเมือง 253 สายพันธุ์

ลำดับ	รหัส	สายพันธุ์	ผลผลิต		ลักษณะผล								น้ำหนักเมล็ด Bulk (กรัม)
			จำนวนผลดีต่อต้น	น้ำหนักผลผลิตดีต่อต้น (กรัม)	รูปร่างผล	สีผลอ่อน	สีผลสุก	รูปร่างขั้วผล	น้ำหนักผล (กรัม)	กว้างผล (ซ.ม.)	ยาวผล (ซ.ม.)	หนาเนื้อ (มม.)	
221	สกว 221	CA984 พริกชี้หนู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
222	สกว 222	CA985 พริกชี้หนู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เมล็ดไม่ออก
223	สกว 223	CA986 พริกชี้หนู	14	13	elongate	เขียว	แดง	acute	0.9	0.7	4.1	0.75	29.75
224	สกว 224	CA987 พริกชี้หนู	2	2	elongate	เขียว	แดง	obtuse	1.0	0.5	2.8	0.66	4.3
225	สกว 225	CA988 พริกชี้หนูสวน	2	1	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.5	0.7	2.7	0.73	3.02
226	สกว 226	CA1017 พริกห้วยสีทน MG-21	18	9	elongate	เขียว	แดง	acute	0.5	0.6	2.3	0.53	23.32
227	สกว 227	CA1018 พริกห้วยสีทน MG-22	3	2	elongate	เขียว	แดง	acute	0.7	0.6	1.7	0.53	5.84
228	สกว 228	CA1143 พริกข่อ	8	11	elongate	เขียว	แดง	obtuse	1.4	0.6	5.0	0.68	13.64
229	สกว 229	CA1161 พริกขี้นก	2	2	elongate	เขียว	แดง	obtuse	1.0	1.2	7.4	1.18	6.99
230	สกว 230	CA1175 พริกป่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เมล็ดไม่ออก
231	สกว 231	CA1176 พริกชี้หนู	2	1	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.5	0.7	4.2	0.70	1.04
232	สกว 232	CA1259 พริกชี้หนูเม็ดใหญ่	3	5	elongate	เขียว	แดง	obtuse	1.7	0.7	4.2	0.67	13.47
233	สกว 233	CA1260 พริกกะเหรี่ยง	3	0.4	elongate	เขียวขาว	แดงส้ม	obtuse	0.1	0.7	2.0	0.59	0.23
234	สกว 234	CA1261 พริกชี้หนู	3	1	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.3	0.5	3.1	0.63	1.72
235	สกว 235	CA1263 พริกชี้หนู	1	0.3	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.3	0.5	2.6	0.48	1.67
236	สกว 236	CA1271 พริกชี้หนูเม็ดใหญ่	20	33	elongate	เขียวเข้ม	แดง	truncate	1.7	0.9	7.2	0.96	84.7
237	สกว 237	CA1280 พริกชี้หนู	9	8	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.9	0.8	4.3	0.72	19.58
238	สกว 238	CA1282 พริกชี้หนู	1	2	elongate	เขียว	แดง	truncate	2.0	1.1	5.4	0.71	4
239	สกว 239	CA1288 พริกชี้หนูเม็ดขาว	7	7	elongate	เขียว	แดง	obtuse	1.0	0.8	3.0	0.86	10.22
240	สกว 240	CA1290 พริกชี้หนู	18	21	elongate	เขียว	แดง	obtuse	1.2	0.8	4.8	0.77	44.88

ตารางที่ 5 (ต่อ) ผลผลิต ลักษณะผล และน้ำหนักเมล็ด (Bulk) ของพริกพื้นเมือง 253 สายพันธุ์

ลำดับ	รหัส	สายพันธุ์	ผลผลิต		ลักษณะผล								น้ำหนักเมล็ด Bulk (กรัม)
			จำนวนผลดี ต่อต้น	น้ำหนัก ผลผลิตดีต่อต้น (กรัม)	รูปร่างผล	สีผลอ่อน	สีผลสุก	รูปร่างขั้วผล	น้ำหนักผล (กรัม)	กว้างผล (ซ.ม.)	ยาวผล (ซ.ม.)	หนาเนื้อ (มม.)	
241	สกว 241	CA1329 พริกขี้ไผ่	6	6	elongate	เขียว	แดง	obtuse	1.0	0.7	3.4	0.72	12.04
242	สกว 242	CA1338 พริกขี้หนู P#348	11	8	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.7	0.7	2.4	0.77	15.17
243	สกว 243	CA1366 พริกหอม	2	1	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.5	0.6	2.6	0.65	2.05
244	สกว 244	CA1372 พริกขี้หนู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เมล็ดไม่งอก
245	สกว 245	CA1381 พริกกะเหรี่ยง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
246	สกว 246	CA1399 พริกขี้หนู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เมล็ดไม่งอก
247	สกว 247	CA1412 พริกยอดสน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เมล็ดไม่งอก
248	สกว 248	CA1413 พริกฮีสาน	40	36	elongate	ขาว	แดง	acute	0.9	0.7	4.3	0.73	69.03
249	สกว 249	CA1435 พริกขี้หนูหอม	6	3	elongate	เขียว	แดง	obtuse	0.5	0.6	2.6	0.66	5.31
250	สกว 250	CA1453 พริกสามเดือน ผล 1	92	71	elongate	เขียวอ่อน	แดง	obtuse	0.8	0.7	4.0	0.76	167.28
251	สกว 251	CA1884 พริกขี้หนู	4	19	elongate	เขียว	แดง	obtuse	4.8	2.5	3.1	1.16	20.99
252	สกว 252	CA1888 พริกขี้หนูสวนกะเหรี่ยง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เมล็ดไม่งอก
253	สกว 253	CA1891 พริกแต้อย่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

ลักษณะพันธุ์ของพริกพื้นเมือง มีลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะพันธุ์ ขึ้นกับความนิยมในการบริโภคของแต่ละท้องถิ่น มีความโดดเด่นของรสชาติ กลิ่น รูปร่างผลและสีผล ซึ่งเมื่อนำไปปลูกต่างพื้นที่ ลักษณะเหล่านี้อาจเปลี่ยนไปด้วย ดังนั้น พริกพื้นเมืองของแต่ละท้องถิ่น จึงมีลักษณะเฉพาะตัวที่สืบทอดกันมา และอาจมีชื่อเรียกเฉพาะประจำถิ่น เช่น พริกขาว (อุบลราชธานี) พริกเหลืองทอง (สกลนคร) พริกหัวเรียวยื่นอูปาด (ศรีสะเกษ) พริกมันพิชัย (อุดรดิตถ์) พริกกะเหรี่ยงหนองหญ้าปล้อง (เพชรบุรี) เป็นต้น

จากข้อมูลแหล่งปลูกพริกพื้นเมือง และการศึกษาลักษณะพันธุ์ พบว่า พริกพื้นเมืองมีลักษณะรูปร่างผล สีผล รสชาติ ความเผ็ดต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้มีการเลือกพันธุ์ไปใช้ประโยชน์ทั้งการวิจัยต่อยอด และ การปลูกเพื่อบริโภค ตรงตามวัตถุประสงค์ จึงจัดกลุ่มพริกพื้นเมืองโดยอาศัยลักษณะที่สามารถเห็นได้ชัดเจน คือ ขนาดผล ดังนี้

1. พริกผลใหญ่ เป็นกลุ่มพริกชี้ฟ้า พริกมัน พริกเหลือง เป็นพริกที่มีขนาดความยาวผลมากกว่า 5 เซนติเมตร ความกว้างผล 1-3 เซนติเมตร จำนวน 36 สายพันธุ์ (ตารางที่ 6)
2. พริกผลเล็ก เป็นกลุ่มพริกชี้หนู แบ่งออกได้ 2 ชนิด คือ
 - 2.1 พริกชี้หนูผลใหญ่ เป็นพริกที่มีขนาดความยาวผล 3-12 เซนติเมตร ความกว้างผล 0.3-1.0 เซนติเมตร จำนวน 134 สายพันธุ์ (ตารางที่ 6)
 - 2.2 พริกชี้หนูผลเล็ก เป็นพริกที่มีขนาดความยาวผลน้อยกว่า 3 เซนติเมตร มีพริกผลอ่อนสีเขียวเข้ม จำนวน 83 สายพันธุ์ (ตารางที่ 6) (สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2547)

จะเห็นได้ว่า พริกพื้นเมืองของไทย ส่วนใหญ่เป็นพริกผลเล็ก อยู่ในกลุ่มพริกชี้หนู ซึ่งเป็นพริกที่มีต้นเป็นพุ่มสูง มีการแตกแขนงมาก สามารถเจริญเติบโตให้ผลผลิตได้ยาวนานกว่าพริกผลใหญ่ บางสายพันธุ์มีอายุมากกว่าหนึ่งปีขึ้นไป ขนาดผลเล็ก ผลยาวเรียว ผลอ่อนมีสีขาว สีสียวอ่อน และสีเขียวเข้ม ผลสุก มีทั้งสีเหลือง สีส้ม และ สีแดง ใช้บริโภคทั้งผลสด และทำเป็นพริกแห้งสำหรับการปรุงอาหาร พริกชี้หนูที่เป็นพริกพื้นเมือง หรืออาจจะเรียกว่าพริกพื้นถิ่น หรือพริกพื้นบ้าน ส่วนมากจะทนต่อสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้ง จึงพบว่า พริกพื้นเมืองเหล่านี้จะปลูกโดยอาศัยน้ำฝน หรือปลูกหลังนา หรือปลูกร่วมกับพืชหลักอื่นๆ เช่น ข้าวไร่ ข้าวโพด ยาสูบ เป็นต้น นอกจากนี้ อาจปลูกร่วมกับไม้ใหญ่เพื่ออาศัยร่มเงาในการเจริญเติบโต เช่น ยางพารา ต้นสัก หรือปลูกในสวนผลไม้ เช่น เงาะ เป็นต้น

การจัดกลุ่มพริกพื้นเมือง หรือพริกพื้นบ้าน ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า มี 2 species คือ *Capsicum annuum* และ *Capsicum frutescens* โดยพิจารณาจากสีของดอกเป็นหลัก พริกในกลุ่ม *Capsicum annuum* มีดอกสีขาว อาจพบดอกสีม่วงบ้าง แต่เป็นส่วนน้อย เกสรตัวผู้สีม่วงหรือน้ำเงินเข้ม ส่วนปลายของกลีบรองดอกมีลักษณะเป็นฟันเลื่อย ในหนึ่งช่อมีดอกเพียงดอกเดียว มีส่วนน้อยที่พบหลายดอกในหนึ่งช่อ เช่นพริกขี้หนู ส่วนพริกในกลุ่ม *Capsicum frutescens* มีดอกสี

เขียวอ่อน เกสรตัวผู้สีม่วงหรือน้ำเงินเข้ม ฐานรองดอกมีลักษณะเรียบ ไม่มีร่อง ในหนึ่งซ้อมีดอกมากกว่าหนึ่งดอก ส่วนมากจะมี 2-3 ดอกต่อซ้อ (Smith, P.G. *et al.*, 1987; Andrew, J., 1998)



(ก)

(ข)

ภาพที่ 3 (ก) ดอกพริก *Capsicum annuum* กลีบดอกสีขาว เกสรตัวผู้สีม่วง

(ข) ดอกพริก *Capsicum frutescens* กลีบดอกสีเหลือง เกสรตัวผู้สีม่วง มีจำนวนดอกหลายดอกต่อซ้อ

พริกพื้นเมือง หรือพริกพื้นบ้านของไทย จากสายพันธุ์พริกที่เก็บรวบรวม 253 สายพันธุ์ พบว่า มีในกลุ่ม *C. annuum* จำนวน 131 สายพันธุ์ อยู่ในกลุ่ม *C. frutescens* จำนวน 106 สายพันธุ์ และไม่สามารถระบุได้ชัดเจน 16 สายพันธุ์ เนื่องจาก บางสายพันธุ์ เก็บเป็นผลพริกแห้ง ซึ่งอาจผ่านการอบแห้งมาก่อน เมื่อเพาะเมล็ดจึงไม่ออก บางสายพันธุ์ อ่อนแอต่อการเข้าทำลายโดยโรคและแมลง ไม่สามารถเจริญเติบโตได้จนถึงออกดอก ติดผล พริกผลใหญ่ทั้งหมด 36 สายพันธุ์เป็นพริกในกลุ่ม *C. annuum* ส่วนพริกผลเล็ก ซึ่งได้แก่ พริกขี้หนูผลใหญ่ และ พริกขี้หนูผลเล็ก จะมีทั้ง *C. annuum* และ *C. frutescens*

พริกขี้หนูผลใหญ่ จำนวน 134 สายพันธุ์ ส่วนใหญ่จะเป็น *C. annuum* มีจำนวน 88 สายพันธุ์ และมีจำนวน 42 สายพันธุ์ที่เป็น *C. frutescens* สายพันธุ์พริกขี้หนูผลใหญ่ ที่อยู่ในกลุ่ม *C. annuum* เช่น พริกหัวเรียว่น พริกยอดสน พริกซี่ พริกเตี๋ย พริกจินดา และพริกแซว เป็นต้น ส่วนสายพันธุ์ที่อยู่ในกลุ่ม *C. frutescens* เช่น พริกกะเหรี่ยง พริกขาว พริกเตี๋ยไก่ พริกแดกกลาง และพริกเหลืองทอง เป็นต้น

พริกขี้หนูผลเล็ก จำนวน 83 สายพันธุ์ ส่วนใหญ่เป็น *C. frutescens* มีจำนวน 64 สายพันธุ์ และเป็น *C. annuum* เพียง 9 สายพันธุ์ พริกในกลุ่มนี้ เช่น พริกขี้หนูสวน พริกกะเหรี่ยง พริกตุ้ม พริกขี้หนูนาแล พริกสวนลับแล พริกขาวหรือพริกเครือ และพริกขี้นก เป็นต้น สายพันธุ์ที่เป็น *C.*

annuum ได้แก่ พริกนา พริกตุ้ม พริกยอดสนเล็ก พริกขี้หนู พริกห้วยสีทนMG-21 พริกห้วยสีทนMG-22 พริกกะเหรียง เป็นต้น

จากการเก็บรวบรวมพริกกะเหรียง พริกม้ง พริกแม้ว จากหลากหลายแหล่งปลูก เช่น จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี ราชบุรี น่าน ตาก เชียงใหม่ นครราชสีมา พบว่า ถึงจะเรียกชื่อเหมือนกัน แต่ลักษณะผลพริกต่างกัน ในจำนวนสายพันธุ์ทั้งหมด 23 สายพันธุ์ เป็นพริกขี้หนูผลใหญ่ 11 สายพันธุ์ และในจำนวนนี้ เป็นพริกในกลุ่ม *C. frutescens* จำนวน 10 สายพันธุ์ อยู่ในกลุ่ม *C. annum* เพียงหนึ่งสายพันธุ์เท่านั้น เป็นพริกขี้หนูผลเล็ก 12 สายพันธุ์ และในจำนวนนี้ เป็นพริกในกลุ่ม *C. frutescens* จำนวน 9 สายพันธุ์ อยู่ในกลุ่ม *C. annum* เพียงหนึ่งสายพันธุ์เช่นกัน และมาสามารถระบุได้ 2 สายพันธุ์ จะเห็นได้ว่า แม้ลักษณะผลจะต่างกัน แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่ม *C. frutescens*

พริกพื้นเมืองหรือพริกพื้นบ้านของไทย ที่เก็บรวบรวมมาเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไว้ และศึกษาลักษณะพันธุ์ เป็นการเก็บสายพันธุ์ที่ปลูกทั้งที่เป็นการค้า มีการคัดเลือกพันธุ์ และที่ปลูกเพื่อใช้บริโภคในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงตามความนิยมของชุมชน รวมทั้งสายพันธุ์ต่างๆที่ขึ้นอยู่ทั่วไป เช่นในสวนหลังบ้าน การเก็บเมล็ดเพื่อใช้เป็นตัวแทนของสายพันธุ์ ต้องเก็บจากต้นที่มีลักษณะเหมือนกันเป็นส่วนมากของการปลูกในแต่ละพื้นที่ ควรเก็บจากหลายต้นและแต่ละต้นควรเก็บจำนวนผลเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน เพื่อรักษาฐานพันธุกรรมของสายพันธุ์ไว้ สายพันธุ์พริกที่ปลูกเป็นการค้าแล้ว จะมีความสม่ำเสมอของลักษณะพันธุ์มากกว่าสายพันธุ์ที่ปลูกทั่วไป เนื่องจากเกษตรกรบางรายมีการคัดเลือกว่าจะเก็บเมล็ดไว้ทำพันธุ์ต่อไป การเก็บเชื้อพันธุกรรมพริกจากผลที่ซื้อมาจากตลาด อาจจะไม่มีความแปรปรวนของลักษณะค่อนข้างมาก โดยเฉพาะพันธุ์ที่เป็นการค้าแล้ว ทั้งนี้ อาจเกิดจากการที่ผู้รวบรวมพริกมาจากหลายแหล่งปลูกถึงแม้ว่าจะเป็นพันธุ์เดียวกัน นอกจากนี้ การเก็บเชื้อพันธุกรรมพริกในรูปผลพริกแห้ง เมื่อนำมาปลูก เมล็ดอาจจะงอกได้น้อยหรือไม่งอกเลย เช่น สายพันธุ์ สกว 129 และ สกว 132 เมล็ดไม่งอก อาจเกิดจากการลวกพริก อบพริก หรือตากแดดโดยตรง นอกจากนี้ ยังพบว่า เมล็ดพันธุ์ที่เก็บไว้นานมากกว่า 10 ปี ซึ่งเป็นเชื้อพันธุกรรมพริกของศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน มีเมล็ดไม่งอกเลย 8 สายพันธุ์ ถึงแม้ว่าจะเก็บเมล็ดไว้ในห้องเย็นที่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ดังนั้น จึงควรเก็บเชื้อพันธุกรรมและมีการเก็บรักษาที่เหมาะสม เพื่อเป็นการเก็บรักษาพันธุ์พริกที่ดีไว้ ไม่ให้สูญหาย และต้องมีระบบหรือวิธีการที่จะรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้ให้คงความมีชีวิต เพื่อที่จะได้นำมาขยายพันธุ์ต่อไปในอนาคต

การขยายเมล็ดพันธุ์พริกพื้นเมืองที่เป็นพริกขี้หนูผลเล็ก เช่น พริกขี้หนูสวนเขาสมิง พริกขี้หนูขึ้นก พริกขี้หนูสวน พริกอีโตะ เป็นต้น ซึ่งมีขนาดผลเล็กมาก ติดผลน้อย บางสายพันธุ์ อ่อนแอต่อโรคแมลง ถึงแม้ว่าในแปลงปลูกหรือในพื้นที่ที่เก็บพันธุ์มา สายพันธุ์เหล่านี้เจริญเติบโตได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดชุมชนและใกล้เคียง แต่เมื่อนำมาปลูกที่แปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างออกไป ทำให้ได้เมล็ดน้อยมากหรือบางสายพันธุ์

ไม่ได้เมล็ดเลย ในขณะที่พริกผลใหญ่ และพริกชี้ใหญ่ผลใหญ่สามารถผลิตเมล็ดได้มากกว่า บางสายพันธุ์ได้มากกว่า 500 กรัม เช่น พริกมัน พริกกันชน พริกน้อยหรือพริกตุ้ม พริกชี้ใหญ่ไทย พริกห้วยสีทน พริกจินดา เป็นต้น ดังนั้น ควรมีการศึกษาพันธุ์ดั้งเดิมในพื้นที่ปลูกเดิมก่อน ทั้งลักษณะพันธุ์ ความดีเด่นของสายพันธุ์ การใช้ประโยชน์ วัฒนธรรมการบริโภค เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน และเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนเห็นถึงความสำคัญของการรักษาพันธุ์ไว้ เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเอง

การจะรักษาเชื้อพันธุกรรมพืชให้คงอยู่และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต ภาครัฐควรมีนโยบายที่จะต้องรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติต่อไป รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนหรือท้องถิ่นเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุ์พืชไว้กับชุมชน และส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์มากขึ้น

ตารางที่ 6 การจัดกลุ่มพริกพื้นเมืองตามสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

กลุ่มพริก	รหัส											รวม
พริกผลใหญ่	สกว 4	สกว 8	สกว 9	สกว 10	สกว 11	สกว 13	สกว 38	สกว 44	สกว 53	สกว 56	สกว 57	36
	สกว 58	สกว 65	สกว 67	สกว 83	สกว 87	สกว 88	สกว 89	สกว 90	สกว 91	สกว 92	สกว 98	
	สกว 102	สกว 122	สกว 145	สกว 148	สกว 149	สกว 150	สกว 151	สกว 152	สกว 191	สกว 211	สกว 238	
	สกว 246	สกว 247	สกว 251									
พริกขี้หนูผลใหญ่	สกว 1	สกว 2	สกว 5	สกว 7	สกว 15	สกว 16	สกว 17	สกว 18	สกว 19	สกว 20	สกว 21	134
	สกว 22	สกว 23	สกว 25	สกว 26	สกว 27	สกว 28	สกว 31	สกว 32	สกว 34	สกว 35	สกว 36	
	สกว 37	สกว 39	สกว 41	สกว 42	สกว 45	สกว 46	สกว 47	สกว 48	สกว 49	สกว 50	สกว 51	
	สกว 68	สกว 70	สกว 72	สกว 73	สกว 74	สกว 75	สกว 76	สกว 77	สกว 79	สกว 80	สกว 84	
	สกว 85	สกว 93	สกว 94	สกว 95	สกว 96	สกว 99	สกว 105	สกว 106	สกว 107	สกว 110	สกว 118	
	สกว 120	สกว 121	สกว 123	สกว 126	สกว 127	สกว 128	สกว 129	สกว 131	สกว 133	สกว 135	สกว 137	
	สกว 138	สกว 140	สกว 143	สกว 144	สกว 146	สกว 147	สกว 153	สกว 154	สกว 158	สกว 159	สกว 162	
	สกว 164	สกว 165	สกว 166	สกว 167	สกว 168	สกว 169	สกว 170	สกว 171	สกว 172	สกว 173	สกว 174	
	สกว 175	สกว 176	สกว 177	สกว 178	สกว 179	สกว 181	สกว 182	สกว 183	สกว 185	สกว 186	สกว 188	
	สกว 189	สกว 192	สกว 196	สกว 200	สกว 201	สกว 202	สกว 204	สกว 206	สกว 207	สกว 208	สกว 209	
	สกว 210	สกว 212	สกว 213	สกว 214	สกว 215	สกว 216	สกว 217	สกว 218	สกว 219	สกว 220	สกว 221	
	สกว 223	สกว 228	สกว 229	สกว 231	สกว 232	สกว 236	สกว 237	สกว 240	สกว 241	สกว 245	สกว 248	
	สกว 250	สกว 253										
พริกขี้หนูผลเล็ก	สกว 3	สกว 6	สกว 12	สกว 14	สกว 24	สกว 29	สกว 30	สกว 33	สกว 40	สกว 43	สกว 52	83
	สกว 54	สกว 55	สกว 59	สกว 60	สกว 61	สกว 62	สกว 63	สกว 64	สกว 66	สกว 69	สกว 71	
	สกว 78	สกว 81	สกว 82	สกว 86	สกว 97	สกว 100	สกว 101	สกว 103	สกว 104	สกว 108	สกว 109	
	สกว 111	สกว 112	สกว 113	สกว 114	สกว 115	สกว 116	สกว 117	สกว 119	สกว 124	สกว 125	สกว 130	
	สกว 132	สกว 134	สกว 136	สกว 139	สกว 141	สกว 142	สกว 155	สกว 156	สกว 157	สกว 160	สกว 161	
	สกว 163	สกว 180	สกว 184	สกว 187	สกว 190	สกว 193	สกว 194	สกว 195	สกว 197	สกว 198	สกว 199	
	สกว 203	สกว 205	สกว 222	สกว 224	สกว 225	สกว 226	สกว 227	สกว 230	สกว 233	สกว 234	สกว 234	
	สกว 239	สกว 242	สกว 243	สกว 244	สกว 249	สกว 252						
รวม												253

3. การเพาะกล้า และปลูกพริกพื้นเมืองส่งวิเคราะห์ความต้านทานโรค

การเพาะกล้าพริกพื้นเมือง เพื่อส่งประเมินโรคยอดเน่า *Choanephora cucurbitarum* และ โรคไวรัส *Tomato necrotic ring spot* (TNRV) ให้กับโครงการย่อยที่ 3 สรุปผลได้ดังนี้ (ตารางที่ 7)

1. ส่งต้นกล้าพริกพื้นเมืองอายุ 1 เดือน ส่งประเมินเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 30 สายพันธุ์ ประเมินโรคยอดเน่า *Choanephora cucurbitarum* ได้จำนวน 217 สายพันธุ์ มีต้นกล้าตายก่อนส่งประเมิน 4 สายพันธุ์ และไม่มีเมล็ดสำหรับเพาะกล้าเพื่อส่งประเมิน 32 สายพันธุ์
2. ส่งต้นกล้าพริกพื้นเมืองอายุ 2 เดือน ส่งประเมินเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 30 สายพันธุ์ ประเมินโรคไวรัส *Tomato necrotic ring spot* (TNRV) ได้จำนวน 217 สายพันธุ์ มีต้นกล้าตายก่อนส่งประเมิน 4 สายพันธุ์ และไม่มีเมล็ดสำหรับเพาะกล้าเพื่อส่งประเมิน 32 สายพันธุ์
3. ส่งผลพริกประเมินโรคแอนแทรคโนส *Colletotrichum capsici* และ *Colletotrichum acutatum* ส่งประเมินจำนวน 216 สายพันธุ์ ไม่ได้ผลผลิต 5 สายพันธุ์ และ ไม่มีเมล็ดสำหรับเพาะกล้าเพื่อส่งประเมิน 32 สายพันธุ์ โดยส่งผลเขียว จำนวน 5 ผลต่อเชื้อ และผลแดง จำนวน 5 ผลต่อเชื้อ

ตารางที่ 7 ส่งพริกประเมินโรคแอนแทรคโนส *Colletotrichum* spp. โรคยอดเน่า *Choanephora cucurbitarum* และโรคไวรัส *Tomato necrotic ring spot* (TNRV)

ลำดับ	รหัส	ชื่อพันธุ์	โรคแอนแทรคโนส	โรคยอดเน่า	โรคไวรัส
1	สกว 1	พริกหัวเรียว	✓	✓	✓
2	สกว 2	พริกหัวเรียว	✓	✓	✓
3	สกว 3	พริกชี้หูสวน	✓	✓	✓
4	สกว 4	พริกมัน	✓	✓	✓
5	สกว 5	พริกสีดา	✓	✓	✓
6	สกว 6	พริกชี้หูสวน	✓	✓	✓
7	สกว 7	พริกบางสี	✓	✓	✓
8	สกว 8	พริกวัดโบสถ์	✓	✓	✓
9	สกว 9	พริกวัดโบสถ์	✓	✓	✓
10	สกว 10	พริกวัดโบสถ์	✓	✓	✓
11	สกว 11	พริกมันพิชัย	✓	✓	✓
12	สกว 12	พริกชี้หูขึ้นนก			
13	สกว 13	พริกพม่า	✓	✓	✓
14	สกว 14	พริกชี้หูขึ้นนก	✓	✓	✓
15	สกว 15	พริกยอดสนเล็ก	✓	✓	✓
16	สกว 16	พริกยอดสนเล็ก	✓	✓	✓
17	สกว 17	พริกชี้เตี้ยไก่	✓	✓	✓
18	สกว 18	พริกกะเหรี่ยง	✓	✓	✓
19	สกว 19	พริกกะเหรี่ยงหนองหญ้าปล้อง	✓	×	×
20	สกว 20	พริกแก้ว	✓	✓	✓
21	สกว 21	พริกแดง(ชี้หู)	✓	✓	✓
22	สกว 22	พริกเล็บมือนาง	✓	✓	✓
23	สกว 23	พริกหัวเรียว	✓	✓	✓
24	สกว 24	พริกชี้ตาลิง	✓	✓	✓
25	สกว 25	พริกแซว	✓	✓	✓
26	สกว 26	พริกซ่อ	✓	✓	✓
27	สกว 27	พริกมั่ง	✓	✓	✓
28	สกว 28	พริกมั่ง	✓	✓	✓
29	สกว 29	พริกแดง/แดง	✓	✓	✓
30	สกว 30	พริกป้อบพวง	✓	✓	✓

หมายเหตุ ☐ ไม่มีเมล็ดสำหรับเพาะกล้าเพื่อส่งประเมินโรค

✓ ส่งประเมินโรค

× ไม่ได้ส่งประเมินโรค

ตารางที่ 7 (ต่อ) ส่งพริกประเมินโรคแอนแทรคโนส *Colletotrichum* spp. โรคยอดเน่า *Choanephora cucurbitarum* และโรคไวรัส *Tomato necrotic ring spot* (TNRV)

ลำดับ	รหัส	ชื่อพันธุ์	โรคแอนแทรคโนส	โรคยอดเน่า	โรคไวรัส
31	สกว 31	พริกน้อย	✓	✓	✓
32	สกว 32	พริกน้อย	✓	✓	✓
33	สกว 33	พริกกระเหรียง	✓	✓	✓
34	สกว 34	พริกยอดสนเล็ก	✓	✓	✓
35	สกว 35	พริกเหลืองทอง	✓	✓	✓
36	สกว 36	พริกปลีก/พลาสติก			
37	สกว 37	พริกกันชั้น	✓	✓	✓
38	สกว 38	พริกเหลือง	✓	✓	✓
39	สกว 39	พริกขี้หนูนา	✓	✓	✓
40	สกว 40	พริกขี้หนูสวน	×	✓	✓
41	สกว 41	พริกยอดสนด้านขุนทด	✓	✓	✓
42	สกว 42	พริกกระเหรียงหนองหญ้าปล้อง	✓	✓	✓
43	สกว 43	พริกขาว	✓	✓	✓
44	สกว 44	พริก Off-Type หยกสยาม	✓	✓	✓
45	สกว 45	พริกบ้านยอด	✓	✓	✓
46	สกว 46	พริกบ้านยอด	✓	✓	✓
47	สกว 47	พริกกระเหรียงทุ่งช้าง	✓	✓	✓
48	สกว 48	พริกอีปาด	✓	✓	✓
49	สกว 49	พริกขี้อ้วน	✓	✓	✓
50	สกว 50	พริกจินดายอดสน	✓	✓	✓
51	สกว 51	พริกตีปลาไหล	✓	✓	✓
52	สกว 52	พริกดอย	✓	✓	✓
53	สกว 53	พริกกระเทียม	✓	✓	✓
54	สกว 54	พริกดอย	✓	✓	✓
55	สกว 55	พริกขี้หนูนาแล	✓	✓	✓
56	สกว 56	พริกเมือง/กันห้อย	✓	✓	✓
57	สกว 57	พริกใหญ่บ้านก่ง	✓	✓	✓
58	สกว 58	พริกใหญ่ทุ่งน้าว	×	✓	✓
59	สกว 59	พริกขี้หนูสวน	✓	✓	✓
60	สกว 60	พริกสวนลับแล	✓	✓	✓

หมายเหตุ ☐ ไม่มีเมล็ดสำหรับเพาะกล้าเพื่อส่งประเมินโรค

✓ ส่งประเมินโรค

× ไม่ได้ส่งประเมินโรค

ตารางที่ 7 (ต่อ) ส่งพริกประเมินโรคแอนแทรกโนส *Colletotrichum* spp. โรคยอดเน่า *Choanephora cucurbitarum* และโรคไวรัส *Tomato necrotic ring spot* (TNRV)

ลำดับ	รหัส	ชื่อพันธุ์	โรคแอนแทรกโนส	โรคยอดเน่า	โรคไวรัส
61	สกว 61	พริกตุ้ม	✓	✓	✓
62	สกว 62	พริกขี้หนูห้องสูงแปลง 1	✓	✓	✓
63	สกว 63	พริกขี้หนูห้องสูงแปลง 2	✓	✓	✓
64	สกว 64	พริกขี้หนูห้องสูงแปลง 3			
65	สกว 65	พริกหนุ่มล๊อบแล	✓	✓	✓
66	สกว 66	พริกแจว	×	✓	✓
67	สกว 67	พริกใหญ่	✓	✓	✓
68	สกว 68	พริกหอม	✓	✓	✓
69	สกว 69	พริกแจวหอม	✓	✓	✓
70	สกว 70	พริกแม่แม่สออด	✓	✓	✓
71	สกว 71	พริกกระเหรียง	✓	✓	✓
72	สกว 72	พริกจินดา	✓	✓	✓
73	สกว 73	พริกหัวเรือ	✓	✓	✓
74	สกว 74	พริกขาว	✓	✓	✓
75	สกว 75	พริกหัวเรือย่น	✓	✓	✓
76	สกว 76	พริกหัวเรือย่นบ้านอี่ปาด	✓	✓	✓
77	สกว 77	พริกขาว	✓	✓	✓
78	สกว 78	พริกขาว/เครือ	✓	✓	✓
79	สกว 79	พริกบ้าน	✓	✓	✓
80	สกว 80	พริกซี/หนัก	✓	✓	✓
81	สกว 81	พริกกระเหรียง	✓	✓	✓
82	สกว 82	พริกกระเหรียงข้อ	✓	✓	✓
83	สกว 83	พริกใหญ่	✓	✓	✓
84	สกว 84	พริกเดือย	✓	✓	✓
85	สกว 85	พริกแซว	✓	✓	✓
86	สกว 86	พริกม้ง	✓	✓	✓
87	สกว 87	พริกดำป่น1	✓	✓	✓
88	สกว 88	พริกดำป่น2	✓	✓	✓
89	สกว 89	พริกแจว	✓	✓	✓
90	สกว 90	พริกแจว	✓	✓	✓

หมายเหตุ

☐

✓

×

ไม่มีเมล็ดสำหรับเพาะกล้าเพื่อส่งประเมินโรค

ส่งประเมินโรค

ไม่ได้ส่งประเมินโรค

ตารางที่ 7 (ต่อ) ส่งพริกประเมินโรคแอนแทรคโนส *Colletotrichum* spp. โรคยอดเน่า *Choanephora cucurbitarum* และโรคไวรัส *Tomato necrotic ring spot* (TNRV)

ลำดับ	รหัส	ชื่อพันธุ์	โรคแอนแทรคโนส	โรคยอดเน่า	โรคไวรัส
91	สกว 91	พริกแจ่ว	✓	✓	✓
92	สกว 92	พริกแจ่ว	✓	✓	✓
93	สกว 93	พริกยอดสนใหญ่	✓	✓	✓
94	สกว 94	พริกยอดสนเล็ก	✓	✓	✓
95	สกว 95	พริกกระดุม	✓	✓	✓
96	สกว 96	พริกแซวหลังนา	✓	✓	✓
97	สกว 97	พริกชี้หนุบ้านห้องสูง	✓	✓	✓
98	สกว 98	พริกครกแตก	✓	✓	✓
99	สกว 99	พริกจินดา	✓	✓	✓
100	สกว 100	พริกชี้หนุบ้านห้องสูง	✓	✓	✓
101	สกว 101	พริกชี้หนุ	✓	✓	✓
102	สกว 102	พริกใหญ่	✓	✓	✓
103	สกว 103	พริกอีโต้ะ			
104	สกว 104	พริกนา-1	✓	✓	✓
105	สกว 105	พริกนา-2			
106	สกว 106	พริกหอมตราด	✓	✓	✓
107	สกว 107	พริกแหลมกลัด	✓	✓	✓
108	สกว 108	พริกชี้หนุสวน			
109	สกว 109	พริกชี้หนุสวน	✓	✓	✓
110	สกว 110	พริกจินดาเขมร	✓	✓	✓
111	สกว 111	พริกชี้หนุสวน			
112	สกว 112	พริกชี้หนุสวน	✓	✓	✓
113	สกว 113	พริกชี้หนุสวน ต้น1			
114	สกว 114	พริกชี้หนุสวน ต้น2			
115	สกว 115	พริกชี้หนุสวน ต้น3			
116	สกว 116	พริกตุ้ม	✓	✓	✓
117	สกว 117	พริกยอดสนเล็ก	✓	✓	✓
118	สกว 118	พริกชี้หนุเมือง	✓	✓	✓
119	สกว 119	พริกชี้หนุแต่	✓	✓	✓
120	สกว 120	พริกแต้กลาง	✓	✓	✓

หมายเหตุ ☐ ไม่มีเมล็ดสำหรับเพาะกล้าเพื่อส่งประเมินโรค

✓ ส่งประเมินโรค

× ไม่ได้ส่งประเมินโรค

ตารางที่ 7 (ต่อ) ส่งพริกประเมินโรคแอนแทรคโนส *Colletotrichum* spp. โรคยอดเน่า *Choanephora cucurbitarum* และโรคไวรัส *Tomato necrotic ring spot* (TNRV)

ลำดับ	รหัส	ชื่อพันธุ์	โรคแอนแทรคโนส	โรคยอดเน่า	โรคไวรัส
121	สกว 121	พริกแต้กลาง	✓	✓	✓
122	สกว 122	พริกเขียว	✓	✓	✓
123	สกว 123	พริกแต่เขียงดาว	✓	✗	✗
124	สกว 124	พริกแต่ใหญ่ลำพูน	✓	✓	✓
125	สกว 125	พริกคอดยแม่สะเรียง	✓	✓	✓
126	สกว 126	พริกส้ม/ป๊อป/พวง	✓	✓	✓
127	สกว 127	พริกเดี่ยวไก่			
128	สกว 128	พริกซี่	✓	✗	✗
129	สกว 129	พริกยอดสนเล็ก			
130	สกว 130	พริกขี้หนูบ้านปางแก	✓	✓	✓
131	สกว 131	พริกน้อย/พริกตุ้ม	✓	✓	✓
132	สกว 132	พริกห้อยฝ้า/พริกป๊อป			
133	สกว 133	พริกช่อระย้า	✓	✓	✓
134	สกว 134	พริกกระเหรียง			
135	สกว 135	พริกป๊อป	✓	✓	✓
136	สกว 136	พริกกระเหรียงหนองหญ้าปล้อง			
137	สกว 137	พริกม้ง	✓	✓	✓
138	สกว 138	พริกม้ง	✓	✓	✓
139	สกว 139	พริกขี้หนู/ดีปสี่	✓	✓	✓
140	สกว 140	พริกกระเหรียง	✓	✓	✓
141	สกว 141	พริกเลื้อย	✓	✓	✓
142	สกว 142	พริกกระเหรียง			
143	สกว 143	พริกขาว			
144	สกว 144	พริกส้มปากปวน			
145	สกว 145	พริกใหญ่วัดโบสถ์	✓	✓	✓
146	สกว 146	พริกจินดาวัดโบสถ์	✓	✓	✓
147	สกว 147	พริกแซวพื้นเมือง	✓	✓	✓
148	สกว 148	พริกพื้นเมืองบ้านก่ง	✓	✗	✗
149	สกว 149	พริกจินดาพื้นเมือง	✓	✓	✓
150	สกว 150	พริกแซวกระเทียม	✓	✓	✓

หมายเหตุ ☐ ไม่มีเมล็ดสำหรับเพาะกล้าเพื่อส่งประเมินโรค

✓ ส่งประเมินโรค

✗ ไม่ได้ส่งประเมินโรค

ตารางที่ 7 (ต่อ) ส่งพริกประเมินโรคแอนแทรคโนส *Colletotrichum* spp. โรคยอดเน่า *Choanephora cucurbitarum* และโรคไวรัส *Tomato necrotic ring spot* (TNRV)

ลำดับ	รหัส	ชื่อพันธุ์	โรคแอนแทรคโนส	โรคยอดเน่า	โรคไวรัส
151	สกว 151	พริกจินดาดำ	✓	✓	✓
152	สกว 152	พริกสร้อยสน	✓	✓	✓
153	สกว 153	พริกยอดสน	✓	✓	✓
154	สกว 154	CA032 พริกเต๋อยไก่	✓	✓	✓
155	สกว 155	CA034 พริกหอมสีขาว	✓	✓	✓
156	สกว 156	CA050 พริกชี้หนู	✓	✓	✓
157	สกว 157	CA052 พริกชี้หนู	✓	✓	✓
158	สกว 158	CA053 พริกชี้หนู-กรุงเทพ	✓	✓	✓
159	สกว 159	CA054 พริกชี้หนูบ้านยาว	✓	✓	✓
160	สกว 160	CA062 พริกชี้หนู	✓	✓	✓
161	สกว 161	CA071 พริกหอม	✗	✓	✓
162	สกว 162	CA111 พริกจินดา	✓	✓	✓
163	สกว 163	CA130 พริกชี้หนู	✓	✓	✓
164	สกว 164	CA131 พริกชี้หนู	✓	✓	✓
165	สกว 165	CA138 พริกชี้หนู	✓	✓	✓
166	สกว 166	CA139 พริกชี้หนู	✓	✓	✓
167	สกว 167	CA141 พริกชี้หนู	✓	✓	✓
168	สกว 168	CA143 พริกชี้หนู	✓	✓	✓
169	สกว 169	CA150 พริกชี้หนู	✓	✓	✓
170	สกว 170	CA170 พริกชี้หนู	✓	✓	✓
171	สกว 171	CA172 พริกชี้หนู	✓	✓	✓
172	สกว 172	CA175 พริกชี้หนู	✓	✓	✓
173	สกว 173	CA177 พริกชี้หนู	✓	✓	✓
174	สกว 174	CA189 พริกชี้หนู	✓	✓	✓
175	สกว 175	CA198 พริกชี้หนู	✓	✓	✓
176	สกว 176	CA218 พริกชี้หนู	✓	✓	✓
177	สกว 177	CA224 พริกชี้หนู	✓	✓	✓
178	สกว 178	CA225 พริกชี้หนู	✓	✓	✓
179	สกว 179	CA262 พริกขึ้นนกเหลือง	✓	✓	✓
180	สกว 180	CA274 พริกขึ้นนก	✓	✓	✓

หมายเหตุ ✓ ส่งประเมินโรค
 ✗ ไม่ได้ส่งประเมินโรค

ตารางที่ 7 (ต่อ) ส่งพริกประเมินโรคแอนแทรคโนส *Colletotrichum* spp. โรคยอดเน่า *Choanephora cucurbitarum* และโรคไวรัส *Tomato necrotic ring spot* (TNRV)

ลำดับ	รหัส	ชื่อพันธุ์	โรคแอนแทรคโนส	โรคยอดเน่า	โรคไวรัส
181	สกว 181	CA275 พริกขี้หนูกะเทาะ	✓	✓	✓
182	สกว 182	CA276 พริกขี้หนูกะเทาะ	✓	✓	✓
183	สกว 183	CA281 พริกขี้หนูก	✓	✓	✓
184	สกว 184	CA283 พริกขี้หนูก	✓	✓	✓
185	สกว 185	CA285 พริกสวน	✓	✓	✓
186	สกว 186	CA286 พริกขี้หนุสวน	✓	✓	✓
187	สกว 187	CA291 พริกขี้หนุสวน	✓	✓	✓
188	สกว 188	CA312 พริกขี้หนุ	✓	✓	✓
189	สกว 189	CA316 พริกขี้หนุ	✓	✓	✓
190	สกว 190	CA317 พริกขี้หนุสวน	✓	✓	✓
191	สกว 191	CA318 พริกขี้หนุ	✓	✓	✓
192	สกว 192	CA320 พริกจินดา	✓	✓	✓
193	สกว 193	CA322 พริกขี้หนุ	✓	✓	✓
194	สกว 194	CA335 พริกขี้หนุ			
195	สกว 195	CA341 พริกขี้หนุสวน	✓	✓	✓
196	สกว 196	CA346 พริกจินดา	✓	✓	✓
197	สกว 197	CA350 พริกกระเหรียง	✓	✓	✓
198	สกว 198	CA353 พริกขี้หนูก	✓	✓	✓
199	สกว 199	CA355 พริกกระเหรียง	✓	✓	✓
200	สกว 200	CA364 พริกหัวสีท่น	✓	✓	✓
201	สกว 201	CA368 พริกขี้หนูกบางเลน	✓	✓	✓
202	สกว 202	CA369 พริกหัวเรืออุบล	✓	✓	✓
203	สกว 203	CA372 พริกขี้หนุสวน	✓	✓	✓
204	สกว 204	CA387 พริกขี้หนูดอน	✓	✓	✓
205	สกว 205	CA394 พริกขี้หนุเมืองเพชรบูรณ์	✓	✓	✓
206	สกว 206	CA397 พริกนกบ้านโป่ง	✓	✓	✓
207	สกว 207	CA398 พริกขี้หนุไทย	✓	✓	✓
208	สกว 208	CA399 พริกขี้หนุพิษณุโลก	✓	✓	✓
209	สกว 209	CA848 พริกกระเหรียง	✓	✓	✓
210	สกว 210	CA854 พริกขี้หนุ	✓	✓	✓

หมายเหตุ ☐ ไม่มีเมล็ดสำหรับเพาะกล้าเพื่อส่งประเมินโรค
 ✓ ส่งประเมินโรค

ตารางที่ 7 (ต่อ) ส่งพริกประเมินโรคแอนแทรกโนส *Colletotrichum* spp. โรคยอดเน่า *Choanephora cucurbitarum* และโรคไวรัส *Tomato necrotic ring spot* (TNRV)

ลำดับ	รหัส	ชื่อพันธุ์	โรคแอนแทรกโนส	โรคยอดเน่า	โรคไวรัส
211	สกว 211	CA857 พริกขี้หนุ่ย	✓	✓	✓
212	สกว 212	CA858 พริกขี้หนุ่ย	×	✓	✓
213	สกว 213	CA859 พริกขี้หนุ่ย	✓	✓	✓
214	สกว 214	CA860 พริกขี้หนุ่ย	✓	✓	✓
215	สกว 215	CA884 พริกขี้หนุ่ยเม็ดใหญ่			
216	สกว 216	CA933 พริกขี้หนุ่ย			
217	สกว 217	CA935 พริกขี้หนุ่ย	✓	✓	✓
218	สกว 218	CA943 พริกขี้หนุ่ย			
219	สกว 219	CA945 พริกขี้หนุ่ย	✓	✓	✓
220	สกว 220	CA976 พริกขี้หนุ่ย	✓	✓	✓
221	สกว 221	CA984 พริกขี้หนุ่ย			
222	สกว 222	CA985 พริกขี้หนุ่ย			
223	สกว 223	CA986 พริกขี้หนุ่ย	✓	✓	✓
224	สกว 224	CA987 พริกขี้หนุ่ย	✓	✓	✓
225	สกว 225	CA988 พริกขี้หนุ่ยสวน	✓	✓	✓
226	สกว 226	CA1017 พริกขี้หนุ่ยสีทน MG-21	✓	✓	✓
227	สกว 227	CA1018 พริกขี้หนุ่ยสีทน MG-22	✓	✓	✓
228	สกว 228	CA1143 พริกขี้หนุ่ย	✓	✓	✓
229	สกว 229	CA1161 พริกขี้หนุ่ย	✓	✓	✓
230	สกว 230	CA1175 พริกขี้หนุ่ย			
231	สกว 231	CA1176 พริกขี้หนุ่ย	✓	✓	✓
232	สกว 232	CA1259 พริกขี้หนุ่ยเม็ดใหญ่	✓	✓	✓
233	สกว 233	CA1260 พริกขี้หนุ่ย			
234	สกว 234	CA1261 พริกขี้หนุ่ย	✓	✓	✓
235	สกว 235	CA1263 พริกขี้หนุ่ย	✓	✓	✓
236	สกว 236	CA1271 พริกขี้หนุ่ยเม็ดใหญ่	✓	✓	✓
237	สกว 237	CA1280 พริกขี้หนุ่ย	✓	✓	✓
238	สกว 238	CA1282 พริกขี้หนุ่ย	✓	✓	✓
239	สกว 239	CA1288 พริกขี้หนุ่ยเม็ดขาว	✓	✓	✓
240	สกว 240	CA1290 พริกขี้หนุ่ย	✓	✓	✓

หมายเหตุ ☐ ไม่มีเมล็ดสำหรับเพาะกล้าเพื่อส่งประเมินโรค

✓ ส่งประเมินโรค

× ไม่ได้ส่งประเมินโรค



ตารางที่ 7 (ต่อ) ส่งพริกประเมินโรคแอนแทรคโนส *Colletotrichum* spp. โรคยอดเน่า *Choanephora cucurbitarum* และโรคไวรัส *Tomato necrotic ring spot* (TNRV)


ลำดับ	รหัส	ชื่อพันธุ์	โรคแอนแทรคโนส	โรคยอดเน่า	โรคไวรัส
241	สกว 241	CA1329 พริกช่อไสว	✓	✓	✓
242	สกว 242	CA1338 พริกชี้หนู P#348	✓	✓	✓
243	สกว 243	CA1366 พริกหอม	✓	✓	✓
244	สกว 244	CA1372 พริกขี้หนก			
245	สกว 245	CA1381 พริกกระเหรียง			
246	สกว 246	CA1399 พริกชี้หนู			
247	สกว 247	CA1412 พริกยอดสน			
248	สกว 248	CA1413 พริกอีสาน	✓	✓	✓
249	สกว 249	CA1435 พริกชี้หนูหอม	✓	✓	✓
250	สกว 250	CA1453 พริกสามเดือน ผล 1	✓	✓	✓
251	สกว 251	CA1884 พริกยูยี่	✓	✓	✓
252	สกว 252	CA1888 พริกชี้หนูสวนกระเหรียง			
253	สกว 253	CA1891 พริกแตง			


หมายเหตุ ☐ ไม่มีเมล็ดสำหรับเพาะกล้าเพื่อส่งประเมินโรค
☒ ส่งประเมินโรค



4. ลักษณะพันธุ์และความต้านทานโรค


จากโครงการย่อยที่ 1 การรวบรวมและศึกษาลักษณะพันธุ์กรรมพริกพื้นเมืองของไทย โครงการย่อยที่ 2 การประเมินพันธุ์และพัฒนาพันธุ์พริกพื้นเมือง และโครงการย่อยที่ 3 การประเมินลักษณะความต้านทานโรคของพริกพื้นเมืองและการปลูกพริกปลอดภัย ได้รวบรวมข้อมูลพริกพื้นเมืองไว้ทั้งหมด 253 สายพันธุ์ ดังนี้


สกว 1 พริกหัวเรียว			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
 	ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาควิชา แหล่งที่มา : ต.อียิปต์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล 1.0 เซนติเมตร ความยาวผล 7.1 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร	  	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 100 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 63 เซนติเมตร น้ำหนักผล 2.1 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 6.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.33 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 124 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอ (S) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอ (S) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) ปริมาณความเผ็ด 52,563 (± 982) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : รสเผ็ดจัด นิยมรับประทานสดและบริโภคเป็นพริกแห้ง

สกว 2 พริกหัวเรียว		
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย
	ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาควิชา แหล่งที่มา : ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล 1.2 เซนติเมตร ความยาวผล 7.3 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร	   ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 101 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 62 เซนติเมตร น้ำหนักผล 2.8 กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 7.2 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.80 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 124 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอปานกลาง (MS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอ (S) ผลแดง อ่อนแอ (S) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) ปริมาณความเผ็ด 26,089 (± 140) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : รสเผ็ดจัด รับประทานได้ทั้งสดหรือตากเป็นพริกแห้ง และแปรรูปเป็นพริกป่น

สกว 3 พริกชี้หูสวน			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาคอุทัย แหล่งที่มา : ต.ชัยชุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 3.1 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 102 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 72 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.4 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 2.2 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.43 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 135 วัน ความต้านทานโรค
		 	โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capcisi</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) ปริมาณความเผ็ด 67,911 (± 699) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -

สกว 4 พริกมัน		
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย
	ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาควิชา แหล่งที่มา : ต.ชัยชุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล 1.3 เซนติเมตร ความยาวผล 7.7 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร	   ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>anuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก pendant การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 95 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 78 เซนติเมตร น้ำหนักผล 2.6 กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 6.5 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.73 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 135 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) ต้านทานปานกลาง (MR) โรคไวรัส (TNRV) ต้านทาน (R) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง ต้านทาน (R) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทาน (R) ผลแดง ต้านทานมาก (HR) ปริมาณความเผ็ด 8,652 (± 78) SHU เผ็ดปานกลาง ลักษณะเด่น : เหมาะสำหรับทำพริกแห้ง เมื่อแห้งผิวเรียบสวย

สกว 5 พริกสีดา	
ชื่อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม	งานวิจัย
 ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาคอุทัย แหล่งที่มา : ต.คูคำ อ.ข้าสูง จ.ขอนแก่น ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 8.4 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร	   ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 96 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 65 เซนติเมตร น้ำหนักผล 2.7 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 7.2 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.66 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 124 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) ต้านทานปานกลาง (MR) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง ต้านทานมาก (HR) ปริมาณความเผ็ด 39,041 (± 628) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -

สกว 6 พริกชี้หูสวน			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
 		  	
ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาควิทย แหล่งที่มา : ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 3.1 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 118 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 74 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.6 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 3.3 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.47 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 162 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) ต้านทานปานกลาง (MR) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอ (S) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด 80,246 ($\pm 2,991$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : ติดผลดก	

สกว 7 พริกบางลี			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาควิทย แหล่งที่มา : ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล 1.0 เซนติเมตร ความยาวผล 5.1 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 139 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 76 เซนติเมตร น้ำหนักผล 2.4 กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 5.9 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.67 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 135 วัน ความต้านทานโรค
			โรคนูน (C. cucurbitarum) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) ต้านทานปานกลาง (MR) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) ปริมาณความเผ็ด 51,511 (± 775) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -

สกว 8 พริกวัดโบสถ์ (ผลใหญ่ยาว)			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาควิทย แหล่งที่มา : อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล 2.0 เซนติเมตร ความยาวผล 7.9 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก intermediate การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 146 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 91 เซนติเมตร น้ำหนักผล 6.5 กรัม ความกว้างผล 1.5 เซนติเมตร ความยาวผล 8.4 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.34 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 157 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทาน (R) ผลแดง ต้านทานมาก (HR) ปริมาณความเผ็ด 18,682 (± 190) SHU เผ็ดปานกลาง ลักษณะเด่น : กลิ่นหอม เหมาะสำหรับตำพริกแกง
			


สกว 9 พริกวัดโบสถ์ (ผลอ้วนป้อม)

เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม




ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาควิชา
แหล่งที่มา : อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ลักษณะทางพืชสวน
น้ำหนักผล - กรัม
ความกว้างผล 1.9 เซนติเมตร
ความยาวผล 5.8 เซนติเมตร
ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร


งานวิจัย






ลักษณะทางพืชสวน
ชนิด *annuum*
สีดอก สีขาว
ตำแหน่งดอก pendant
การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate
ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 104 เซนติเมตร
ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 68 เซนติเมตร
น้ำหนักผล 6.2 กรัม
ความกว้างผล 1.4 เซนติเมตร
ความยาวผล 7.2 เซนติเมตร
ความหนาเนื้อ 1.35 มิลลิเมตร
สีผล ผลอ่อน สีเขียว
ผลสุก สีแดง
อายุเก็บเกี่ยว 132 วัน
ความต้านทานโรค
โรคยอดเน่า (*C. cucurbitarum*) อ่อนแอ (S)
โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอ (S)
โรคแอนแทรคโนส (*Colletotrichum* spp.)
C. capsici ผลเขียว อ่อนแอ (S)
ผลแดง ต้านทาน (R)
C. acutatum ผลเขียว ต้านทาน (R)
ผลแดง ต้านทานมาก (HR)
ปริมาณความเผ็ด 14,107 (± 557) SHU เผ็ดปานกลาง
ลักษณะเด่น : กลิ่นหอม เหมาะสำหรับตำพริกแกง


สกว 10 พริกวัดโบสถ์ (ผลพอมยาว)			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาควิชาพืชสวน แหล่งที่มา : อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล 1.4 เซนติเมตร ความยาวผล 6.7 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก pendant การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 141 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 87 เซนติเมตร น้ำหนักผล 5.8 กรัม ความกว้างผล 1.3 เซนติเมตร ความยาวผล 9.6 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.02 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 149 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนยอด (C. cucurbitarum) ต้านทานปานกลาง (MR) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอ (S) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทาน (R) ผลแดง ต้านทาน (R) ปริมาณความเผ็ด 16,285 (± 518) SHU เผ็ดปานกลาง ลักษณะเด่น : เหมาะแก่การเก็บเกี่ยว ทำพริกแห้งสีสวยผิวเรียบ กลิ่นหอม เหมาะสำหรับตำพริกแกง
			



สกว 11 พริกมันพิชัย			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาควิชา แหล่งที่มา : ต.ป่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล 1.5 เซนติเมตร ความยาวผล 7.9 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก pendant การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 146 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 89 เซนติเมตร น้ำหนักผล 10.1 กรัม ความกว้างผล 1.6 เซนติเมตร ความยาวผล 11.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.35 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 157 วัน ความต้านทานโรค โรคนูน (C. cucurbitarum) ต้านทานปานกลาง (MR) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอ (S) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทาน (R) ผลแดง ต้านทานมาก (HR) ปริมาณความเผ็ด 16,010 (± 383) SHU เผ็ดปานกลาง ลักษณะเด่น : ต้นสูงทำให้เก็บเกี่ยวง่าย ไม่เป็นโรคแอนแทรคโนสและเชื้อรา เปลือกบาง ผลสีเขียวเข้ม เหมาะสำหรับทำพริกแห้ง ผลเรียบสวย ไม่เผ็ด กลิ่นหอม
			

สกว 12 พริกชี้ฟ้าขึ้นนก			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
 	ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาควิทย แหล่งที่มา : อ.สวี่ จ.ชุมพร ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล 7.2 เซนติเมตร ความยาวผล 2.2 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร	เกิดการระบาดของโรคไวรัส	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - สีดอก - ตำแหน่งดอก - การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม - ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน - ผลสุก - อายุเก็บเกี่ยว - วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) - โรคไวรัส (TNRV) - โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว - ผลแดง - <i>C. acutatum</i> ผลเขียว - ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด - ลักษณะเด่น : -

สกว 13 พริกพม่า		
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย
 ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาควิทย แหล่งที่มา : ตลาดสดระนอง ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล 3.2 เซนติเมตร ความยาวผล 4.1 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก pendant การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 101 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 56 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.9 กรัม ความกว้างผล 1.9 เซนติเมตร ความยาวผล 3.8 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.41 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 124 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) ต้านทานปานกลาง (MR) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทาน (R) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) ปริมาณความเผ็ด 5,510 (± 248) SHU เผ็ดปานกลาง ลักษณะเด่น : -   

สกว 14 พริกชี้ฟ้าขึ้นก		
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย
 		ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาควิทย แหล่งที่มา : อ.กุญจีจ.ประจวบคีรีขันธ์ ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 1.6 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร
		   ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 104 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 84 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.7 กรัม ความกว้างผล 0.4 เซนติเมตร ความยาวผล 1.9 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.25 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 135 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง - <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด 196,039 (± 684) SHU เผ็ดสูงมาก ลักษณะเด่น : -


สกว 15 พริกยอดสนเล็ก			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาควิทย แหล่งที่มา : ตลาดสดเทศบาลชุมพร จ.ชุมพร ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 6.3 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 108 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 74 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.9 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 4.6 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.50 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 124 วัน ความต้านทานโรค โรคน้ำเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) ต้านทาน (R) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอ (S) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) ปริมาณความเผ็ด 30,793 (± 818) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -
			


สกว 16 พริกยอดสนเล็ก			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาควิทย แหล่งที่มา : ตลาดชุมพร จ.ชุมพร ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 4.1 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 83 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 72 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.8 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 7.7 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.68 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียวอ่อน ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 135 วัน ความต้านทานโรค
			โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) ต้านทานปานกลาง (MR) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอ (S) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) ปริมาณความเผ็ด 24,372 (± 785) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -


สกว 17 พริกซีเด้อยู่			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาคอุทัย แหล่งที่มา : ตลาดหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 4.9 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 129 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 79 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.0 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 4.7 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.46 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียวอมขาว ผลสุก สีแดงส้ม อายุเก็บเกี่ยว 150 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) ต้านทานปานกลาง (MR) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) ปริมาณความเผ็ด 49,031 (± 213) เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -
		 	


สกว 18 พริกส้มกะเหรี่ยง			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาควิทย แหล่งที่มา : อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล 1.0 เซนติเมตร ความยาวผล 3.5 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 99 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 58 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.2 กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 3.8 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.50 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีขาว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 157 วัน ความต้านทานโรค
		  	โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capcisi</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง - <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทาน (R) ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด - ลักษณะเด่น : -


สกว 19 พริกกระเหรียงหนองหญ้าปล้อง			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาควิชาพืช แหล่งที่มา : ตลาดกลางทำยาง จ.เพชรบุรี ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 2.9 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 110 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 77 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.7 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 3.6 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.38 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 150 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) - โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง อ่อนแอ (S) ปริมาณความเผ็ด 63,243 (± 99) เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : รสเผ็ดมาก กลิ่นหอม. ใช้ทำน้ำพริกเผา เปลือกบาง น้ำหนักเบา ผลเล็ก ยาวเรียว ปลุกบนเขาในป่าต้องเดินเท้าไปเก็บ โดยหักมาเป็นก้าน ไม่ได้เด็ดเพราะก้านพริกเหนียวมาก ต้องใช้กรรไกร ตัดก้านทำให้พริกที่ซื้อจากเกษตรกรก้านมีลักษณะสั้น ราคาขายปลีก พริกแห้ง กิโลกรัมละ 400-500 บาท


สกว 20 พริกแกว			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาควิทย แหล่งที่มา : ต.พันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล 1.1 เซนติเมตร ความยาวผล 4.6 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร	  	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 140 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 69 เซนติเมตร น้ำหนักผล 2.4 กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 5.4 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.85 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 124 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) ต้านทานปานกลาง (MR) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capcisi</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) ปริมาณความเผ็ด 37,559 (± 406) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -

สกว 21 พริกแดง(ชี้หนู)		
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย
 	ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาคอุทัย แหล่งที่มา : ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล 1.0 เซนติเมตร ความยาวผล 3.3 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 86 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 63 เซนติเมตร น้ำหนักผล 2.5 กรัม ความกว้างผล 1.0 เซนติเมตร ความยาวผล 5.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.77 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 135 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) ปริมาณความเผ็ด 48,552 (± 921) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -
	  	



สกว 22 พริกเล็บมือนาง			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาควิทย แหล่งที่มา : ต.โพธิ์สา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 6.7 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 123 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 85 เซนติเมตร น้ำหนักผล 2.7 กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 7.6 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.82 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียวอ่อน ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 135 วัน ความต้านทานโรค
		 	โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอ (S) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง ต้านทานมาก (HR) ปริมาณความเผ็ด 32,292 ($\pm 1,505$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -

สกว 23 พริกหัวเรียว			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาควิชา แหล่งที่มา : จ.อุบลราชธานี ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล 1.2 เซนติเมตร ความยาวผล 5.8 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 81 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 59 เซนติเมตร น้ำหนักผล 4.4 กรัม ความกว้างผล 1.1 เซนติเมตร ความยาวผล 7.5 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.11 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 124 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) ต้านทานปานกลาง (MR) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทาน (R) ผลแดง ต้านทาน (R) ปริมาณความเผ็ด 56,018 ($\pm 2,201$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : บริโภคทั้งพริกสดและพริกแห้ง ตากแห้งได้ดีที่สุด สีสวย
			


สกว 24 พริกชี้ดาว			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาคอุทัย แหล่งที่มา : จ.ชุมพร ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 1.7 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 102 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 75 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.4 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 2.5 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.58 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 135 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) ปริมาณความเผ็ด 125,004 ($\pm 2,531$) SHU เผ็ดสูงมาก ลักษณะเด่น : -
			
			

สกว 25 พริกแซว			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาควิชา แหล่งที่มา : อ.ท่าวังผา จ.น่าน ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล 1.0 เซนติเมตร ความยาวผล 5.1 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร	  	งานวิจัย ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 100 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 82 เซนติเมตร น้ำหนักผล 2.3 กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 5.9 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.97 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 124 วัน ความต้านทานโรค โรคน้ำเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) ต้านทานปานกลาง (MR) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) ปริมาณความเผ็ด 63,197 ($\pm 1,072$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -


สกว 26 พริกขี้			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาควิชา แหล่งที่มา : ต.เขื่อนใน อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล 1.1 เซนติเมตร ความยาวผล 5.9 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 98 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 42 เซนติเมตร น้ำหนักผล 2.5 กรัม ความกว้างผล 1.0 เซนติเมตร ความยาวผล 8.8 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.19 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 124 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) ต้านทานปานกลาง (MR) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอ (S) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง ต้านทาน (R) ปริมาณความเผ็ด 50,138 ($\pm 1,824$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -
			
			



สกว 27 พริกม้ง			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาควิชา แหล่งที่มา : ต.ศรีราชบุรี อ.พพระ จ.ตาก ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 4.3 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 81 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 67 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.5 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 4.9 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.60 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 135 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอ (S) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทาน (R) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) ปริมาณความเห็ด 43,087 (± 82) เห็ดมาก ลักษณะเด่น : -
			

สกว 28 พริกม้ง			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาควิชา แหล่งที่มา : ตลาดพพระ อ.พพระ จ.ตาก ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล 1.1 เซนติเมตร ความยาวผล 4.9 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 125 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 90 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.6 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 5.1 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.59 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีสแดง อายุเก็บเกี่ยว 149 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทาน (R) ผลแดง ต้านทาน (R) ปริมาณความเผ็ด 96,740 ($\pm 4,631$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -
			
			

สกว 29 พริกแดง/แดง	
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม	งานวิจัย
 ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาควิชา แหล่งที่มา : อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 3.4 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร 	   ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 117 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 74 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.8 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 3.7 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.43 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 135 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอ (S) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง ต้านทาน (R) ปริมาณความเผ็ด 79,079 (± 0) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -


สกว 30 พริกปอบพวง			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาควิชา แหล่งที่มา : ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล 1.1 เซนติเมตร ความยาวผล 3.1 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 94 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 58 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.2 กรัม ความกว้างผล 1.0 เซนติเมตร ความยาวผล 3.4 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.62 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีสแดง อายุเก็บเกี่ยว 169 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง - <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด - ลักษณะเด่น : -
			


สกว 31 พริกน้อย			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาคอุทัย แหล่งที่มา : ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล 1.1 เซนติเมตร ความยาวผล 3.3 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 109 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 68 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.9 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 3.8 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.37 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 135 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) ปริมาณความเผ็ด 118,353 ($\pm 2,390$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -
			

สกว 32 พริกน้อย			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาควิทย แหล่งที่มา : ต.นาเสียว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล 1.7 เซนติเมตร ความยาวผล 3.9 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 122 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 71 เซนติเมตร น้ำหนักผล 2.5 กรัม ความกว้างผล 1.4 เซนติเมตร ความยาวผล 4.3 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.14 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีขาว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 135 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทานมาก (HR) ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด 55,796 ($\pm 2,590$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -
		 	


สกว 33 พริกกะเหรี่ยง			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาควิชา แหล่งที่มา : ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร		งานวิจัย ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 105 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 76 เซนติเมตร น้ำหนักผล 2.0 กรัม ความกว้างผล 1.0 เซนติเมตร ความยาวผล 4.7 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.98 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีสแดง อายุเก็บเกี่ยว 135 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) ปริมาณความเผ็ด 32,944 (± 415) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -
		 	

สกว 34 พริกยอดสนเล็ก			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาคอุทัย แหล่งที่มา : ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร		งานวิจัย ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 134 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 80 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.5 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 7.9 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.54 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 162 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) ปริมาณความเผ็ด 36,463 ($\pm 1,231$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : เหมาะสำหรับทำพริกแห้ง ผิวบาง

สกว 35 พริกเหลืองทอง			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาควัตถุ แหล่งที่มา : ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงต้น erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 108 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 77 เซนติเมตร น้ำหนักผล 2.0 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 7.2 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.71 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียวอ่อน ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 149 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง ต้านทาน (R) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด 97,799 ($\pm 1,931$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : ผลดก เนื้อหนา กลิ่นหอม ตาละเอียดง่าย ไม่เน่าเสียง่าย เหมาะบริโภคสดมากกว่าทำพริกแห้ง พริกสดนิยมใช้ทำต้มยำ แกงเผ็ดตำน้ำพริก ส้มตำ กินเป็นเครื่องเคียงกับลาบอีสาน รสคาขยา ปลีกกิโลกรัมละ 70-80 บาท
			

สกว 36 พริกปลี/พลาสติค			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาควิชา แหล่งที่มา : จ.นครพนม ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร	 เกิดการระบาดของโรคไวรัส	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - สีดอก - ตำแหน่งดอก - การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม - ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน - ผลสุก - อายุเก็บเกี่ยว - วัน ความต้านทานโรค โรคนูนหน้า (<i>C. cucurbitarum</i>) - โรคไวรัส (TNRV) - โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว - ผลแดง - <i>C. acutatum</i> ผลเขียว - ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด - ลักษณะเด่น : -

สกว 37 พริกกันชน			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาควิชา แหล่งที่มา : อ.อุณิณารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงต้น intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 67 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 68 เซนติเมตร น้ำหนักผล 2.5 กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 6.1 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.78 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเหลืองอ่อน ผลสุก สีแดงส้ม อายุเก็บเกี่ยว 124 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) ปริมาณความเผ็ด 57,438 ($\pm 1,622$) เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -
			

สกว 38 พริกเหลือง			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาควิชา แหล่งที่มา : จ.นครปฐม ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร		งานวิจัย ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 107 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 66 เซนติเมตร น้ำหนักผล 10.5 กรัม ความกว้างผล 1.9 เซนติเมตร ความยาวผล 6.8 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 2.35 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีเหลือง อายุเก็บเกี่ยว 162 วัน ความต้านทานโรค โรคน้ำเน่า (C. cucurbitarum) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด 26,276 (± 909) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -
			


สกว 39 พริกชี้หนุนา

เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม




ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาควิชา
แหล่งที่มา : ต.ท่าพริก อ.เมือง จ.ตราด
ลักษณะทางพืชสวน
น้ำหนักผล - กรัม
ความกว้างผล - เซนติเมตร
ความยาวผล - เซนติเมตร
ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร


งานวิจัย



ลักษณะทางพืชสวน
ชนิด *frutescens*
สีดอก สีเขียวขาว
ตำแหน่งดอก erect
การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate
ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 107 เซนติเมตร
ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 89 เซนติเมตร
น้ำหนักผล 0.9 กรัม
ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร
ความยาวผล 3.7 เซนติเมตร
ความหนาเนื้อ 0.57 มิลลิเมตร
สีผล ผลอ่อน สีเขียว
ผลสุก สีแดง
อายุเก็บเกี่ยว 124 วัน
ความต้านทานโรค
โรคยอดเน่า (*C. cucurbitarum*) อ่อนแอ (S)
โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS)
โรคแอนแทรคโนส (*Colletotrichum* spp.)
C. capsici ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS)
ผลแดง อ่อนแอมาก (HS)
C. acutatum ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS)
ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR)
ปริมาณความเผ็ด 51,951 ($\pm 1,082$) SHU เผ็ดมาก
ลักษณะเด่น : -

สกว 40 พริกขี้หนูสวน			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
เมล็ด	ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาคอุทัย แหล่งที่มา : จ.ตราด ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร	ปลูกครั้งแรกได้เมล็ดแต่เมื่อเอาเมล็ดไปปลูกต่อได้เมล็ดน้อยและเมล็ดไม่งอก และภาพที่ถ่ายเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์มีปัญหาทำให้ภาพถ่ายมีปัญหา	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเขียวขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 123 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 71 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.8 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 2.7 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.66 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 162 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) - โรคไวรัส (TNRV) - โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว - ผลแดง - <i>C. acutatum</i> ผลเขียว - ผลแดง - ปริมาณความเหี่ยว - ลักษณะเด่น : -


สกว 41 พริกยอดสนด้านขุนทด			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : บุญธรรม หล้าทุ่ง ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 2.4 กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 7.7 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.06 มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 85 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 52 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.0 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 5.9 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.67 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก สีสแดง อายุเก็บเกี่ยว 120 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) ต้านทานปานกลาง (MR) โรคไวรัส (TNRV) ต้านทาน (R) โรคแอนแทรกคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทาน (R) ผลแดง ต้านทาน (R) ปริมาณความเผ็ด 29,796 (± 486) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -
			
			


สกว 42 พริกกะเหรี่ยงหนองหญ้าปล้อง			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : ตลาดท่ายาง จ.เพชรบุรี ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 0.8 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 3.7 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.61 มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 79 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 52 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.3 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 3.5 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.58 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก สีสแดง อายุเก็บเกี่ยว 177 วัน ความต้านทานโรค
		 	โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) ปริมาณความเผ็ด - ลักษณะเด่น : รสเผ็ดจัด กลิ่นหอม ชั่วเหนียวต้องใช้กรรไกรตัด ราคา กิโลกรัมละ 150 บาท


สกว 43 พริกขาว			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : ยืน ตาค้า อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 1.9 กรัม ความกว้างผล 1.1 เซนติเมตร ความยาวผล 3.7 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.38 มิลลิเมตร	  	งานวิจัย ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 98 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 56 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.1 กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 3.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.91 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีขาว ผลสุก สีแดงส้ม อายุเก็บเกี่ยว 127 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capcisi</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) ปริมาณความเผ็ด 89,105 ($\pm 3,904$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : รสเผ็ดมาก


สกว 44 off-type พริกสยาม			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : จ.แพร่ ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 6.5 กรัม ความกว้างผล 1.2 เซนติเมตร ความยาวผล 8.5 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.39 มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก pendant การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 67 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 57 เซนติเมตร น้ำหนักผล 4.8 กรัม ความกว้างผล 1.2 เซนติเมตร ความยาวผล 9.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.42 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียวเข้ม ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 112 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) ต้านทานปานกลาง (MR) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง ต้านทาน (R) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทาน (R) ผลแดง ต้านทานมาก (HR) ปริมาณความเผ็ด 13,536 (± 189) SHU เผ็ดปานกลาง ลักษณะเด่น :
			
			


สกว 45 พริกบ้านยอด			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาควิชา แหล่งที่มา : อ.สองแคว จ.น่าน ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 0.5 กรัม ความกว้างผล 1.2 เซนติเมตร ความยาวผล 3.9 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.19 มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 114 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 45 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.2 กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 5.5 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.86 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 127 วัน ความต้านทานโรค
			โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง ต้านทาน (R) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทาน (R) ผลแดง ต้านทานมาก (HR) ปริมาณความเผ็ด 100,890 ($\pm 4,615$) SHU เผ็ดสูงมาก ลักษณะเด่น : -
			


สกว 46 พริกบ้านยอด		
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย
	ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาควิชา แหล่งที่มา : อ.สองแคว จ.น่าน ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 0.8 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 6.4 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.16 มิลลิเมตร	งานวิจัย ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 130 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 67 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.4 กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 4.1 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.15 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 127 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) ปริมาณความเผ็ด 93,928 ($\pm 2,238$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -
	  	


สกว 47 พริกกะเหรี่ยงทุ่งช้าง			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาควิทย แหล่งที่มา : อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 2.8 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 2.8 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.19 มิลลิเมตร	  	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงต้น erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 111 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 60 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.4 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 3.7 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.75 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค โรคน้ำเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) ต้านทานปานกลาง (MR) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) ปริมาณความเผ็ด - ลักษณะเด่น : -


สกว 48 พริกอีปาด			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
เมล็ด	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : งาน สกว. ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร	  	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 78 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 52 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.9 กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 5.6 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.18 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 120 วัน ความต้านทานโรค โรคนูน (C. cucurbitarum) ต้านทาน (R) โรคไวรัส (TNRV) ต้านทานปานกลาง (MR) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทาน (R) ผลแดง ต้านทาน (R) ปริมาณความเผ็ด 45,619 (± 314) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : เหมาะแก่การทำพริกแห้ง สีสวย แดงสด บริโภคทั้งพริกสดและพริกแห้ง


สกว 49 พริกขี้หนู		
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย
เมล็ด	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : งาน สกว. ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร	   ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 76 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 41 เซนติเมตร น้ำหนักผล 2.2 กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 5.9 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.17 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 112 วัน ความต้านทานโรค โรคน้ำเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) - โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอปานกลาง (MS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอ (S) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) ปริมาณความเผ็ด 47,693 ($\pm 1,516$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -


สกว 50 พริกจินดายอดสน		
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย
เมล็ด	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : งาน สกว. ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร	   ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 81 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 63 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.5 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 4.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.79 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 120 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) ต้านทานปานกลาง (MR) โรคไวรัส (TNRV) ต้านทาน (R) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) ปริมาณความเผ็ด 48,873 (± 97) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -

สกว 51 พริกติปลาลือ			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : ตลาดปัว จ.น่าน ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 0.6 กรัม ความกว้างผล 1.1 เซนติเมตร ความยาวผล 5.8 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.24 มิลลิเมตร	  	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 70 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 52 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.5 กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 4.8 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.99 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 112 วัน ความต้านทานโรค โรคน้ำเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) ต้านทานปานกลาง (MR) โรคไวรัส (TNRV) ต้านทานปานกลาง (MR) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทาน (R) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) ปริมาณความเผ็ด 51,671 ($\pm 2,239$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -

สกว 52 พริกคอย			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : ตลาดปัว จ.น่าน ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 0.2 กรัม ความกว้างผล 0.4 เซนติเมตร ความยาวผล 1.7 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.32 มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 112 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 73 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.4 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 2.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.34 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 127 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอปานกลาง (MS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) ปริมาณความเผ็ด - ลักษณะเด่น : -
			

สกว 53 พริกกระเทียม			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : ตลาดปัว จ.น่าน ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 5.7 กรัม ความกว้างผล 1.3 เซนติเมตร ความยาวผล 7.3 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.37 มิลลิเมตร	  	งานวิจัย ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก intermediate การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 89 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 59 เซนติเมตร น้ำหนักผล 2.0 กรัม ความกว้างผล 1.0 เซนติเมตร ความยาวผล 6.2 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.17 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียวเข้ม ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค โรคนอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) - โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) ปริมาณความเผ็ด 27,988 (± 327) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : เหมาะสำหรับทำพริกแกง ราคาใกล้เคียง 50 บาท


สกว 54 พริกคอย		
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : ประถม พรหมวังชา ด.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 0.9 กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 2.6 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.94 มิลลิเมตร	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 80 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 52 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.8 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 3.1 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.84 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีขาว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 191 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) ปริมาณความเผ็ด - ลักษณะเด่น : -
		  


สกว 55 พริกชี้หนูนานแล			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : ทวีกา แจ้งดี ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 0.2 กรัม ความกว้างผล 0.4 เซนติเมตร ความยาวผล 1.5 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.35 มิลลิเมตร	  	งานวิจัย ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 108 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 62 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.2 กรัม ความกว้างผล 0.4 เซนติเมตร ความยาวผล 1.2 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.34 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 191 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนาน (C. cucurbitarum) - โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) ปริมาณความเผ็ด - ลักษณะเด่น : -


สกว 56 พริกเมือง/พริกกันทอย			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : คำหล้า ระลึก ต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 1.7 กรัม ความกว้างผล 1.0 เซนติเมตร ความยาวผล 7.2 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.10 มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก intermediate การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 113 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 62 เซนติเมตร น้ำหนักผล 2.1 กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 6.6 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.90 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 127 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) ต้านทานปานกลาง (MR) โรคไวรัส (TNRV) ต้านทานปานกลาง (MR) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) ปริมาณความเผ็ด 22,893 (± 14) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น :
			
			


สกว 57 พริกใหญ่บ้านก่ง			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
 	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : ชม คำแสน ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 23.6 กรัม ความกว้างผล 2.3 เซนติเมตร ความยาวผล 13.6 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 2.93 มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก pendant การเจริญเติบโตของทรงต้น intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 69 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 64 เซนติเมตร น้ำหนักผล 13.2 กรัม ความกว้างผล 1.9 เซนติเมตร ความยาวผล 11.2 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 2.05 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียวเข้ม ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 114 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) - โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอ (S) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว ต้านทาน (R) ผลแดง ต้านทาน (R) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทาน (R) ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด 16,140 (± 111) เผ็ดปานกลาง ลักษณะเด่น : เก็บเกี่ยวเร็ว ติดผลดก ผลใหญ่ ผลสีแดงสดเนื้อหนา ทนโรคยอดเน่ากว่าพันธุ์หยุกสยาม พริกก้ามปูราศากิโลกรัมย์ละ 20 บาท
		 	



สกว 58 พริกใหญ่ทุ่งน้าว			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
 	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผัก แหล่งที่มา : สุนทร มูลมามี ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่ ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 15.0 กรัม ความกว้างผล 1.9 เซนติเมตร ความยาวผล 8.2 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 2.54 มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก pendant การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 69 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 66 เซนติเมตร น้ำหนักผล 17.9 กรัม ความกว้างผล 2.4 เซนติเมตร ความยาวผล 15.3 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 3.01 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 112 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) ไม่เป็นโรค (I) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว - ผลแดง - <i>C. acutatum</i> ผลเขียว - ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด 12,833 (± 140) SHU เผ็ดปานกลาง ลักษณะเด่น : เป็นพริกชี้ฟ้าผลใหญ่ ลักษณะต้นสูงใหญ่ผลผลิตเทียบเท่าพันธุ์บริษัท ผลตรงสวย
		 	

สกว 59 พริกชี้หูสวน			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : วิลลาพร ประนาถกุล ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 0.2 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 1.1 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.50 มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 70 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 61 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.2 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 1.8 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.24 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 120 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capcisi</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว - ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) ปริมาณความเผ็ด 105,493 (±926) SHU เผ็ดสูงมาก ลักษณะเด่น : -
			

สกว 60 พริกสวนลับแล			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : ตลาดสดอุดรดิตรัด จ.อุดรดิตรัด ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 0.6 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 2.1 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.61 มิลลิเมตร	  	งานวิจัย ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 106 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 61 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.4 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 2.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.48 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนน้ำ (<i>C. cucurbitarum</i>) - โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรกคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว - ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) ปริมาณความเผ็ด - ลักษณะเด่น : สามารถเก็บไว้ได้นาน ขั้วผลเขียวแต่ผลไม่เน่า พริกสด ราคากิโลกรัมละ 200 บาท


สกว 61 พริกตุ้ม			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : ตลาดสดอุดรดิตถ์ จ.อุดรดิตถ์ ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 0.8 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 2.5 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.69 มิลลิเมตร	  	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 80 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 55 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.5 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 1.9 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.45 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียวเข้ม ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 156 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) ทนทาน (T) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอ (S) ปริมาณความเผ็ด - ลักษณะเด่น : รสเผ็ดมาก พริกสดราคา กิโลกรัมละ 100 บาท

สกว 62 พริกชี้หนุท้องสูงแปลง 1			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : จันทน์ ที่จันทน์ ต.ชัยชุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 0.4 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 2.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.62 มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงต้น erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 83 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 54 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.3 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 1.7 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.56 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียวอ่อน ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 120 วัน ความต้านทานโรค
		 	โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) - โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอ (S) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capcisi</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง อ่อนแอ (S) ปริมาณความเผ็ด 102,053 ($\pm 3,928$) เผ็ดสูงมาก ลักษณะเด่น : รสเผ็ด กลิ่นหอม ชั่วเหนียว พริกสดราคาโลกกรัมละ 120 บาท 

สกว 63 พริกชี้ฟ้าห้องสูงแปลง 2			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : รวม ปิ่นทอง ต.ชัยชุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 0.4 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 1.9 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.53 มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 78 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 52 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.3 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 1.7 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.53 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 170 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) - โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอปานกลาง (MS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด 112,087 (±4,851) SHU เผ็ดสูงมาก ลักษณะเด่น : รสเผ็ด กลิ่นหอม ชั่วเหนียว ราคาภิโกลร้มละ 110 บาท
			
			

สกว 64 พริกขี้หนูท้องสูงแปลง 3			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : สำเนียง อินทร์กัน ต.ชัยชุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 0.2 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 2.1 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.25 มิลลิเมตร	 เกิดการระบาดของโรคไวรัส	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - สีดอก - ตำแหน่งดอก - การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม - ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน - ผลสุก - อายุเก็บเกี่ยว - วัน ความต้านทานโรค โรคน้ำเน่า (C. cucurbitarum) - โรคไวรัส (TNRV) - โรคแอนแทรคโนส (Colletotrichum spp.) C. capsici ผลเขียว - ผลแดง - C. acutatum ผลเขียว - ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด - ลักษณะเด่น : -


สกว 65 พริกหนุ่มลับแล			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : ประมวล พงษ์พิชิต ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 13.8 กรัม ความกว้างผล 2.0 เซนติเมตร ความยาวผล 10.6 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.99 มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก pendant การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 75 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 51 เซนติเมตร น้ำหนักผล 11.4 กรัม ความกว้างผล 2.0 เซนติเมตร ความยาวผล 10.2 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 2.03 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 120 วัน ความต้านทานโรค โรคน้ำเน่า (C. cucurbitarum) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) ต้านทานปานกลาง (MR) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) C. capsici ผลเขียว ต้านทานมาก (HR) ผลแดง ต้านทาน (R) C. acutatum ผลเขียว ต้านทาน (R) ผลแดง ต้านทานมาก (HR) ปริมาณความเผ็ด 5,327 (± 180) SHU เผ็ดปานกลาง ลักษณะเด่น : มีกลิ่นหอม เผ็ดกลมกล่อม ตาแล้วแห้งไม่มีน้ำเหนียว สำหรับตำน้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกกะปิ และพริกแกง ปลุกเฉพาะฤดูหนาว เนื่องจากฤดูร้อนทำให้ดอกร่วง และไม่ต้านทานโรค ราคาใกล้เคียงมะละ 20 บาท


สกว 66 พริกแจว			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
 	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : บุญธรรม อุ่นวงศ์ ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 1.0 กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 2.6 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.76 มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 85 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 43 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.8 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 2.6 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.58 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) - โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอปานกลาง (MS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว - ผลแดง - <i>C. acutatum</i> ผลเขียว - ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด - ลักษณะเด่น : มีกลิ่นหอม ผิวมัน ใช้สำหรับตำน้ำพริก
		 	

สกว 67 พริกใหญ่			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : บุญธรรม อุ๋นวงศ์ ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 1.7 กรัม ความกว้างผล 1.8 เซนติเมตร ความยาวผล 7.7 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.23 มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก intermediate การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 93 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 47 เซนติเมตร น้ำหนักผล 6.0 กรัม ความกว้างผล 1.1 เซนติเมตร ความยาวผล 5.5 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.19 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 127 วัน ความต้านทานโรค โรคน้ำเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) - โรคไวรัส (TNRV) ต้านทาน (R) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว ต้านทานมาก (HR) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว - ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด 4,795 (± 98) SHU เผ็ดปานกลาง ลักษณะเด่น : รสเผ็ดปานกลาง สีสวย ผิวมันเงา เปลือกบาง ตากแห้งง่าย กลิ่นหอม เมื่อนำไปทำพริกป่นหรือพริกแกงจะตำหรือปั่นละเอียดได้ง่าย ทนแล้ง ใช้สำหรับทำพริกแห้งและน้ำพริกทุกชนิด พริกแห้งราคาก็โลกรัมละ 150 บาท
			

สกว 68 พริกหอม			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : ตลาดสดพิษณุโลก อ.เมือง จ. พิษณุโลก ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 0.5 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 2.1 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.83 มิลลิเมตร	  	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 94 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 49 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.5 กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 3.5 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.99 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 191 วัน ความต้านทานโรค โรคน้ำเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capcisi</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอ (S) ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด - ลักษณะเด่น : กลิ่นหอม รสชาติโลกักรั่มละ 80 บาท

สกว 69 พริกแจวหอม			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : ตลาดสดพิษณุโลก อ.เมือง จ. พิษณุโลก ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 1.0 กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 2.7 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.97 มิลลิเมตร	  	งานวิจัย ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 102 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 50 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.6 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 2.9 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.88 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 127 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) ปริมาณความเผ็ด 82,133 ($\pm 1,726$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น: กลิ่นหอม ราคาปลีกกรัมละ 80 บาท


สกว 70 พริกแม่แม่สอด		
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : ตลาดสดฉัตรแก้ว อ.เมือง จ.พิษณุโลก ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 1.4 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 4.7 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.77 มิลลิเมตร	   ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 81 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 50 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.7 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 4.1 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.77 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 120 วัน ความต้านทานโรค โรคน้ำเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอ (S) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) ปริมาณความเผ็ด 66,372 ($\pm 2,367$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -


สกว 71 พริกกะเหรี่ยง			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : ขจร ทองผาภูมิขจี ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 0.5 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 2.9 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.41 มิลลิเมตร	  	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 94 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 60 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.3 กรัม ความกว้างผล 0.4 เซนติเมตร ความยาวผล 2.8 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.69 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 127 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอ (S) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) ปริมาณความเผ็ด - ลักษณะเด่น : รสเผ็ดจัด

สกว 72 พริกจินดา			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : วินิต คุณาคณ ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 2.6 กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 7.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.70 มิลลิเมตร	  	งานวิจัย ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 88 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 57 เซนติเมตร น้ำหนักผล 3.1 กรัม ความกว้างผล 1.1 เซนติเมตร ความยาวผล 7.5 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.18 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 112 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) ไม่เป็นโรค (I) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว - ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว - ผลแดง ต้านทาน (R) ปริมาณความเผ็ด 34,624 (± 328) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : เหมาะสำหรับทำซอสพริก พริกสดราคาใกล้เคียง 25 บาท


สกว 73 พริกหัวเรือ			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
			
ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : แต่ง สีม่วงเมือง ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 4.8 กรัม ความกว้างผล 1.3 เซนติเมตร ความยาวผล 8.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.93 มิลลิเมตร			
		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 68 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 51 เซนติเมตร น้ำหนักผล 2.2 กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 6.1 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.93 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 112 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) ต้านทานปานกลาง (MR) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอปานกลาง (MS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว ต้านทานมาก (HR) ผลแดง ต้านทานมาก (HR) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) ปริมาณความเผ็ด 63,211 ($\pm 1,084$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -	

สกว 74 พริกขาว			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : หน้อย จิตสิงห์ ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 2.6 กรัม ความกว้างผล 1.0 เซนติเมตร ความยาวผล 5.6 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.66 มิลลิเมตร	  	งานวิจัย ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงต้น erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 126 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 64 เซนติเมตร น้ำหนักผล 2.2 กรัม ความกว้างผล 1.1 เซนติเมตร ความยาวผล 5.3 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.04 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีขาว ผลสุก สีส้ม อายุเก็บเกี่ยว 127 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอ (S) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทาน (R) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) ปริมาณความเผ็ด 95,484 ($\pm 2,289$) เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : บริโภคพริกสด ผลอ่อนกินเป็นเครื่องเคียงกับก๋วยเตี๋ยว



สกว 75 พริกหัวเรือยัน		
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : ชม ศาลาศรี ต.อิป่าด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 1.9 กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 6.1 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.68 มิลลิเมตร	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 74 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 53 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.8 กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 4.6 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.14 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 112 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) ต้านทานปานกลาง (MR) โรคไวรัส (TNRV) ทนทาน (T) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทาน (R) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) ปริมาณความเผ็ด 29,011 ($\pm 1,022$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : รสเผ็ด บริโภคทั้งพริกสดและเหมาะสำหรับพริกแห้ง ราคากิโลกรัมละ 85 บาท
	  	



สกว 76 พริกหัวเรือย่านบ้านอู่ป่าด			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : คำผ่าน ทุมแถว ต.อู่ป่าด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 1.7 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 5.9 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.65 มิลลิเมตร	  	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงต้น intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 76 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 51 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.5 กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 5.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.99 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียวอ่อน ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 112 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) ต้านทาน (R) โรคไวรัส (TNRV) ต้านทาน (R) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอ (S) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทาน (R) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) ปริมาณความเผ็ด 34,217 (± 42) เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : รสชาติเผ็ด กลิ่นหอม บริโภคเป็นพริกสด และพริกแห้ง พริกแห้งราคา กิโลกรัมละ 85 บาท

สกว 77 พริกขาว			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : ตลาดสดเมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 0.6 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 2.8 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.56 มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 116 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 51 เซนติเมตร น้ำหนักผล 3.4 กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 3.9 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.18 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีขาวเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 170 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอ (S) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capcisi</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด - ลักษณะเด่น : -
			
			

สกว 78 พริกขาว/เครือ			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : ตลาดสดเมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 0.7 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 3.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.57 มิลลิเมตร	  	งานวิจัย ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีขาวเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 129 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 49 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.3 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 2.9 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.73 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีขาว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 142 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) ต้านทานปานกลาง (MR) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) ปริมาณความเผ็ด 84,726 ($\pm 3,317$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -


สกว 79 พริกบ้าน			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : ตลาดสดเมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 1.5 กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 4.2 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.91 มิลลิเมตร	  	งานวิจัย ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 143 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 71 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.9 กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 3.7 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.19 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีขาว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 142 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) ต้านทานปานกลาง (MR) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capcisi</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทาน (R) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) ปริมาณความเผ็ด - ลักษณะเด่น : -

สกว 80 พริกซี/หนัก			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : ภาพ ชูทอง ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 1.5 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 5.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.96 มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 130 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 47 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.0 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.69 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีขาว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 142 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอ (S) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทานมาก (HR) ผลแดง ต้านทานมาก (HR) ปริมาณความเผ็ด 81,726 ($\pm 1,917$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : รสเผ็ด เก็บได้นาน ไม่เน่าง่าย พริกสดราคากิโลกรัมละ 150 บาท พริกแห้งราคากิโลกรัมละ 350 บาท
			


สกว 81 พริกกะเหรี่ยง			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : พืช สวัสดิ์กระจาย ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 0.4 กรัม ความกว้างผล 1.1 เซนติเมตร ความยาวผล 3.4 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.31 มิลลิเมตร	  	งานวิจัย ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 118 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 53 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.7 กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 3.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.05 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียวอ่อน ผลสุก สีแดงส้ม อายุเก็บเกี่ยว 156 วัน ความต้านทานโรค โรคน้ำเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอ (S) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง ต้านทาน (R) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว - ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด - ลักษณะเด่น : รสเผ็ด ทนแล้ง ไม่นิยมบริโภคพริกสดเนื่องจากเหม็นเขียว นิยมบริโภคพริกแห้ง พริกแห้งราคากิโลกรัมละ 100-120 บาท

สกว 82 พริกกระเหรียงช่อ			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : พืช สวัสดิ์กระจาย ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 0.1 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 2.7 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.16 มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 91 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 48 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.4 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 2.6 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.64 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว - ผลแดง ต้านทาน (R) ปริมาณความเผ็ด 109,521 ($\pm 1,503$) SHU เผ็ดสูงมาก ลักษณะเด่น : รสเผ็ดจัด มีกลิ่นหอม เก็บผลผลิตง่าย ทนแล้ง พริกแห้งราคาก็โลกรั่มละ 120 บาท


สกว 83 พริกใหญ่			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : ตลาดนัดป่าจ้ว ต.ป่าจ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 1.4 กรัม ความกว้างผล 1.7 เซนติเมตร ความยาวผล 8.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.20 มิลลิเมตร	  	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก pendant การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 70 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 58 เซนติเมตร น้ำหนักผล 4.1 กรัม ความกว้างผล 1.4 เซนติเมตร ความยาวผล 7.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.39 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 112 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) ต้านทาน (R) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอ (S) ผลแดง อ่อนแอ (S) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) ปริมาณความเผ็ด 17,601 (± 465) SHU เผ็ดปานกลาง ลักษณะเด่น : เหมาะสำหรับทำพริกแห้ง ราคาใกล้เคียง 50 บาท

สกว 84 พริกเดียว			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : ตลาดสดแม่ชะจาน ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 2.4 กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 6.1 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.82 มิลลิเมตร	  	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงต้น intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 77 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 65 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.5 กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 5.4 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.16 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 112 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) ต้านทานปานกลาง (MR) โรคไวรัส (TNRV) ต้านทานปานกลาง (MR) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) ปริมาณความเผ็ด 20,091 (± 315) เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : พริกสดราคาโลกกรัมละ 50 บาท

สกว 85 พริกแซว			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาควิทย แหล่งที่มา : ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 11.1 กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 6.3 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.68 มิลลิเมตร	  	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก intermediate การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 90 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 63 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.6 กรัม ความกว้างผล 1.0 เซนติเมตร ความยาวผล 6.7 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.23 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 112 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอ (S) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) ปริมาณความเผ็ด 21,244 (± 434) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -

สกว 86 พริกมั่ง			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาควิทย แหล่งที่มา : ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 1.4 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 2.7 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.47 มิลลิเมตร	  	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเขียว ตำแหน่งดอก intermediate การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 94 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 65 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.3 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 3.2 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.60 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 170 วัน ความต้านทานโรค โรคน้ำเน่า (C. cucurbitarum) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว - ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) ปริมาณความเผ็ด - ลักษณะเด่น : -

สกว 87 พริกดำป่น 1			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : ตลาดหนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 3.0 กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 5.1 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.00 มิลลิเมตร	  	งานวิจัย ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก pendant การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 124 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 75 เซนติเมตร น้ำหนักผล 4.5 กรัม ความกว้างผล 1.1 เซนติเมตร ความยาวผล 7.6 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.32 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียวอ่อน ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 127 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) ต้านทาน (R) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทานมาก (HR) ผลแดง ต้านทานมาก (HR) ปริมาณความเผ็ด 16,613 (± 273) SHU เผ็ดปานกลาง ลักษณะเด่น : คล้ายพริกพริกหยวก รสไม่เผ็ด กลิ่นหอม นิยมบริโภคพริกเขียวอย่างเดียว ราคา กิโลกรัมละ 45-50 บาท

สกว 88 พริกดำป่น 2			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : ตลาดหนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 2.0 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 7.9 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.60 มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก intermediate การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 116 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 55 เซนติเมตร น้ำหนักผล 3.6 กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 7.4 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.11 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 127 วัน ความต้านทานโรค โรคนอตเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอปานกลาง (MS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว - ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด 20,882 (± 550) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : คล้ายพริกพริกหยวก รสไม่เผ็ด กลิ่นหอม นิยมบริโภคพริกเขียวอย่างเดียว ราคา กิโลกรัมละ 45-50 บาท
			

สกว 89 พริกแจ้ว			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : ครอบ มีสันเทียะ ต.ลุ่มน้ำชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 5.0 กรัม ความกว้างผล 1.3 เซนติเมตร ความยาวผล 7.6 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.10 มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก intermediate การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 76 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 51 เซนติเมตร น้ำหนักผล 3.5 กรัม ความกว้างผล 1.1 เซนติเมตร ความยาวผล 6.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.20 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียวอ่อน ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 120 วัน ความต้านทานโรค โรคนอตเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอ (S) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว - ผลแดง ต้านทาน (R) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว - ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด 9,749 (± 176) SHU เผ็ดปานกลาง ลักษณะเด่น : พริกแจ้ว เรียกอีกชื่อ ว่าพริกเขียว พริกดำปน ราคา กิโลกรัมละ 20 บาท


สกว 90 พริกแจ้ว			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
			
			
		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก intermediate การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 120 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 57 เซนติเมตร น้ำหนักผล 3.4 กรัม ความกว้างผล 1.1 เซนติเมตร ความยาวผล 6.5 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.95 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียวอ่อน ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 112 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนหัว (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอ (S) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว - ผลแดง ต้านทานมาก (HR) ปริมาณความเผ็ด 22,361 (± 825) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : พริกแจ้ว หรือพริกเขียวหรือพริกดำปน ผลเขียวราคา กิโลกรัมละ 20 บาท	



สกว 91 พริกแจ้ว			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : ครอบ มีสันเทียะ ต.ลุ่มน้ำชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 4.4 กรัม ความกว้างผล 1.0 เซนติเมตร ความยาวผล 7.6 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.11 มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 154 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 63 เซนติเมตร น้ำหนักผล 3.9 กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 9.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.28 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 120 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) ต้านทานปานกลาง (MR) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว - ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด 18,827 (± 216) SHU เผ็ดปานกลาง ลักษณะเด่น : พริกแจ้ว หรือพริกเขียวหรือพริกดำปน ผลเขียวราคา กิโลกรัมละ 20 บาท
			



สกว 92 พริกแจ้ว			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : ครอบ มีสันเทียะ ต.ลุ่มน้ำชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 5.0 กรัม ความกว้างผล 1.0 เซนติเมตร ความยาวผล 8.3 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.00 มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 110 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 57 เซนติเมตร น้ำหนักผล 3.0 กรัม ความกว้างผล 1.1 เซนติเมตร ความยาวผล 8.9 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.17 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียวอ่อน ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 120 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง ต้านทาน (R) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว - ผลแดง -
			
			
ปริมาณความเผ็ด 5,449 (±268) SHU เผ็ดปานกลาง ลักษณะเด่น : พริกแจ้ว หรือพริกเขียวหรือพริกดำปน ผลเขียวราคา กิโลกรัมละ 20 บาท			

สกว 93 พริกยอดสนใหญ่			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : ปัน อากกล้า ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 0.4 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 6.5 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.16 มิลลิเมตร	  	งานวิจัย ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 157 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 69 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.5 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 6.5 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.82 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 120 วัน ความต้านทานโรค โรคน้ำเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอปานกลาง (MS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทานมาก (HR) ผลแดง ต้านทาน (R) ปริมาณความเผ็ด 26,493 (± 945) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : รสเผ็ดปานกลาง กลิ่นหอม ต้านทานโรค ทนแล้ง เปลือกบางแห้งง่ายเหมาะสำหรับทำพริกแห้ง พริกแห้งราคาโลกรั้ม ละ 200 บาท


สกว 94 พริกยอดสนเล็ก			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : ปัน อากกล้า ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 0.5 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 5.7 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.18 มิลลิเมตร	  	งานวิจัย ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 128 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 54 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.7 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 4.7 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.57 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 127 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) ต้านทานปานกลาง (MR) โรคไวรัส (TNRV) ไม่เป็นโรค (I) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอ (S) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ผลแดง ปริมาณความเผ็ด 44,259 ($\pm 1,629$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : รสเผ็ดปานกลาง กลิ่นหอม ต้านทานโรค ทนแล้ง เปลือกบางแห้งง่ายเหมาะสำหรับทำพริกแห้ง พริกแห้งราคาโลกกรัมละ 200 บาท


สกว 95 พริกกระดุม		
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย
เมล็ด	ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาคอุทัย แหล่งที่มา : ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ. เชียงใหม่ ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร	   ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 103 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 47 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.4 กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 4.4 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.88 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 120 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) ต้านทานปานกลาง (MR) โรคไวรัส (TNRV) ต้านทาน (R) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (MS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) ปริมาณความเผ็ด 33,530 ($\pm 1,016$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : พริกกระดุมมีลักษณะคล้ายพริก superhot

สกว 96 พริกแซวหลังนา			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
เมล็ด	ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาควิทย แหล่งที่มา : ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร	  	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก intermediate, erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 79 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 48 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.6 กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 6.3 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.00 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 120 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) ต้านทาน (R) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอ (S) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทาน (R) ผลแดง ต้านทาน (R) ปริมาณความเผ็ด 41,634 ($\pm 1,529$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : พริกแซวหลังนามีลักษณะคล้ายพริกยอดสน


สกว 97 พริกชี้หูเมืองทองสูง		
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย
เมล็ด	ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาควิทย แหล่งที่มา : ต.ชัยมงคล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร	   ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 107 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 59 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.3 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 2.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.62 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 170 วัน ความต้านทานโรค โรคน้ำเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) ปริมาณความเผ็ด 102,850 (± 134) SHU เผ็ดสูงมาก ลักษณะเด่น : -

สกว 98 พริกครกเหล็ก			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาควิทย แหล่งที่มา : - ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 2.0 กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 5.1 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.85 มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก intermediate การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 128 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 49 เซนติเมตร น้ำหนักผล 3.1 กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 6.7 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.78 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 120 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอปานกลาง (MS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอ (S) ผลแดง อ่อนแอ (S) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทาน (R) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) ปริมาณความเผ็ด 21,427 (± 672) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : ลักษณะคล้ายพริกยอดสน ผลเรียวยาว เป็นคลื่น เมล็ดเยอะ
			
			

สกว 99 พริกจินดา			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : ตลาดหนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 0.6 กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 6.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.19 มิลลิเมตร	  	งานวิจัย ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก intermediate การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 99 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 54 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.7 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 6.4 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.96 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 112 วัน ความต้านทานโรค โรคน้ำเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) ต้านทานปานกลาง (MR) โรคไวรัส (TNRV) ต้านทาน (R) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทาน (R) ผลแดง ต้านทาน (R) ปริมาณความเผ็ด 26,489 ($\pm 1,066$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : เหมาะสำหรับทำพริกแห้ง พริกแห้งไม่เค็ดชั่วราคา กิโลกรัมละ 100 บาท พริกแห้งเค็ดชั่วราคากิโลกรัมละ 150 บาท



สกว 100 พริกชี้หนุบ้านห้องสูง			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
เมล็ด	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : จันทร ที่จันทร ต.ชัยชุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร	  	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 112 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 58 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.3 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 1.9 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.60 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอ (S) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) ปริมาณความเผ็ด 97,809 ($\pm 2,338$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -

สกว 101 พริกชี้หนู		
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย
เมล็ด	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : รวม ปิ่นทอง ต.ชัยชุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเหลืองเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 95 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 116 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.3 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 2.2 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.58 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) - โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอ (S) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) ปริมาณความเผ็ด 117,987 ($\pm 2,712$) SHU เผ็ดสูงมาก ลักษณะเด่น : -





สกว 102 พริกใหญ่		
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย
เมล็ด	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผัก แหล่งที่มา : รวม ปิ่นทอง ต.ชัยชุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร	   ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก intermediate การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 78 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 104 เซนติเมตร น้ำหนักผล 7.0 กรัม ความกว้างผล 1.6 เซนติเมตร ความยาวผล 10.3 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.68 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) ต้านทานปานกลาง (MR) โรคไวรัส (TNRV) - โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว ต้านทานมาก (HR) ผลแดง ต้านทาน (R) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทาน (R) ผลแดง ต้านทานมาก (HR) ปริมาณความเผ็ด 8,157 (± 85) SHU เผ็ดปานกลาง ลักษณะเด่น : -

สกว 103 พริกฮิโตะ			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อุบลรัตน์ ฉายาเรือง ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 0.5 กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 3.5 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.19 มิลลิเมตร	เกิดการระบาดของเพลี้ยไฟทำให้ดอกหลุดร่วงและพริกไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - สีดอก - ตำแหน่งดอก - การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม - ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน - ผลสุก - อายุเก็บเกี่ยว - วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) - โรคไวรัส (TNRV) - โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว - ผลแดง - <i>C. acutatum</i> ผลเขียว - ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด - ลักษณะเด่น : รสเผ็ดมาก มีกลิ่นหอม ใช้สำหรับทำน้ำจิ้มซีฟู้ด ตำน้ำพริกกะปิ พริกแกง ผัดกระเพรา พริกฮิโตะราคาค่อนข้างแพงจึงต้องใช้ให้ตรงวัตถุประสงค์ พริกสดราคากิโลกรัมละ 150 บาท



สกว 104 พริกนา-1			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อุบลรัตน์ ฉายาเรือง ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 0.7 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 3.4 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.60 มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม prostrate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 69 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 77 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.1 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 1.9 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.40 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค
			โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) - โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอ (S) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอ (S) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) ปริมาณความเผ็ด 34,057 (±1,674) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : ลักษณะคล้ายพริกหอมตราด มีกลิ่นหอม เผ็ดปานกลาง ผลเน่าง่าย บริโภคเป็นพริกสด ราคาใกล้เคียง 50 บาท
			


สกว 105 พริกนา-2			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อุบลรัตน์ ฉายาเรือง ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 0.3 กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 4.3 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.16 มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน - ผลสุก - อายุเก็บเกี่ยว - วัน ความต้านทานโรค โรคน้ำเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) - โรคไวรัส (TNRV) - โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว - ผลแดง - <i>C. acutatum</i> ผลเขียว - ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด - ลักษณะเด่น : ลักษณะคล้ายพริกหอมตราด มีกลิ่นหอม เผ็ดปานกลาง ผลเน่าง่าย บริโภคเป็นพริกสด ราคาปลีกกรัมละ 50 บาท
	เกิดการระบาดของเพลี้ยไฟทำให้ดอกหลุดร่วงและพริกไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม		

สกว 106 พริกหอมตราด			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อุบลรัตน์ ฉายาเรือง ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 0.4 กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 4.9 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.25 มิลลิเมตร	  	งานวิจัย ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 75 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 63 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.6 กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 4.9 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.23 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียวอ่อน ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) - โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว ต้านทานมาก (HR) ผลแดง อ่อนแอ (S) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) ปริมาณความเผ็ด 34,216 ($\pm 1,344$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : พริกหอมตราดราคาโลกกรัมละ 40 บาท

สกว 107 พริกแหลมกลัด			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อุบลรัตน์ ฉายาเรือง ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 0.4 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 4.5 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.18 มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 68 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 70 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.4 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 3.2 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.70 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียวอ่อน ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) - โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) ปริมาณความเผ็ด 20,343 (± 984) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -
			

สกว 108 พริกชี้หูสวน			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ		ลักษณะทางพืชสวน
	แหล่งที่มา : สายัน ศรีสำราญ ต.สะตอ		ชนิด <i>frutescens</i>
	อ.เขาสมิง จ.ตราด		สีดอก สีเหลืองเขียว
	ลักษณะทางพืชสวน		ตำแหน่งดอก erect
	น้ำหนักผล 1.1 กรัม		การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect
	ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร		ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร
	ความยาวผล 3.3 เซนติเมตร		ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร
	ความหนาเนื้อ 0.86 มิลลิเมตร		น้ำหนักผล - กรัม
			ความกว้างผล - เซนติเมตร
			ความยาวผล - เซนติเมตร
			ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร
			สีผล ผลอ่อน -
			ผลสุก -
			อายุเก็บเกี่ยว - วัน
			ความต้านทานโรค
			โรคนยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) -
			โรคไวรัส (TNRV) -
			โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.)
			<i>C. capsici</i> ผลเขียว -
			ผลแดง -
			<i>C. acutatum</i> ผลเขียว -
			ผลแดง -
			ปริมาณความเผ็ด -
			ลักษณะเด่น : รสเผ็ดมาก มีกลิ่นหอม ติดผลดก มีลักษณะเดียวกับพริกอีโต้

สกว 109 พริกชี้หนูสวน			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : ตลาดสดเทศบาลจันทบุรี จ.จันทบุรี ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 0.4 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 1.8 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.31 มิลลิเมตร	  	งานวิจัย ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเหลืองเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 70 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 94 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.2 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 1.9 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.55 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) - โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอ (S) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทาน (R) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) ปริมาณความเผ็ด 113,232 ($\pm 3,613$) SHU เผ็ดสูงมาก ลักษณะเด่น : มีกลิ่นหอม ใช้สำหรับตำพริกแกง ตำน้ำพริก รสชาติ กิโลกรัมละ 150 บาท


สกว 110 พริกจินดาเขมร			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : จันทิมา แยกพงศ์ ตลาดวัดลุ่ม ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 1.2 กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 3.3 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.82 มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 90 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 95 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.7 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 3.3 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.66 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) - โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอ (S) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) ปริมาณความเผ็ด 79,250 ($\pm 1,429$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : เหมาะสำหรับทำอาหารตามสั่ง ราคา กิโลกรัมละ 70 บาท
			




สกว 111 พริกชี้หูสวน			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : โกสุม นิคมคาย ตลาดวัดลุ่ม ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 0.8 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 2.4 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.65 มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเหลืองเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน - ผลสุก - อายุเก็บเกี่ยว - วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) - โรคไวรัส (TNRV) - โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว - ผลแดง - <i>C. acutatum</i> ผลเขียว - ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด - ลักษณะเด่น : ราคา กิโลกรัมละ 150 บาท
	 เกิดการระบาดของเพลี้ยไฟทำให้ดอกหลุดร่วงและพริกไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม		



สกว 112 พริกชี้หูสวน			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : วินัย เจริญพงศ์ ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 0.6 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 2.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.82 มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเหลืองเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 98 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 122 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.5 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 2.6 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.75 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง
		 	อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) - โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง ต้านทาน (R) ปริมาณความเผ็ด 63,882 (± 1117) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -

สกว 113 พริกขี้หนูสวน ต้น 1			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
 	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : มานพ คงคาราวี ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 0.8 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 1.9 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.40 มิลลิเมตร	 	งานวิจัย ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเหลืองเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน - ผลสุก - อายุเก็บเกี่ยว - วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) - โรคไวรัส (TNRV) - โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว - ผลแดง - <i>C. acutatum</i> ผลเขียว - ผลแดง - ปริมาณความเฝ้า - ลักษณะเด่น : -
		เกิดการระบาดของเพลี้ยไฟทำให้ดอกหลุดร่วงและพริกไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม	


สกว 114 พริกขี้หนูสวน ต้น 2			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
 	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : มานพ คงคารารี ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 0.8 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 2.5 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.93 มิลลิเมตร		งานวิจัย ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเหลืองเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน - ผลสุก - อายุเก็บเกี่ยว - วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) - โรคไวรัส (TNRV) - โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว - ผลแดง - <i>C. acutatum</i> ผลเขียว - ผลแดง - ปริมาณความเหี่ยว - ลักษณะเด่น : -
		 เกิดการระบาดของเพลี้ยไฟทำให้ดอกหลุดร่วงและพริกไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม	

สกว 115 พริกขี้หนูสวน ต้น 3			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : มานพ คงควาวิ ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 0.3 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 1.6 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.37 มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเหลืองเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน - ผลสุก - อายุเก็บเกี่ยว - วัน ความต้านทานโรค โรคนูน (C. cucurbitarum) - โรคไวรัส (TNRV) - โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว - ผลแดง - <i>C. acutatum</i> ผลเขียว - ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด - ลักษณะเด่น : -
	พริกขี้หนูสวน ต้น3 12-มิ.ย.-56		
		เกิดการระบาดของเพลี้ยไฟทำให้ดอกหลุดร่วงและพริกไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม	


สกว 116 พริกตุ้ม		
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : ราชินี แก้วบัวขาว ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 1.2 กรัม ความกว้างผล 1.3 เซนติเมตร ความยาวผล 1.1 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.47 มิลลิเมตร	  
	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 72 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 110 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.8 กรัม ความกว้างผล 1.3 เซนติเมตร ความยาวผล 1.4 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.26 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) - โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) ปริมาณความเผ็ด 12,766 (±460) SHU เผ็ดปานกลาง ลักษณะเด่น : -	


สกว 117 พริกยอดสนเล็ก			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาควิชา แหล่งที่มา : ตลาดริมโขง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 0.5 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 4.4 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.45 มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 83 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 86 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.5 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 4.6 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.46 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) - โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว ต้านทาน (R) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทาน (R) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) ปริมาณความเผ็ด 8,911 (± 347) SHU เผ็ดปานกลาง ลักษณะเด่น : - ข้อเสีย : ขั้วผลยาวมาก ทำให้น้ำหนักเมื่อเด็ดขั้ว
			
			


สกว 118 พริกชี้หนูเมือง			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อุทัย จันทร์หอม ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 3.6 กรัม ความกว้างผล 1.0 เซนติเมตร ความยาวผล 7.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.83 มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 95 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 128 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.6 กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 7.2 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.90 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง
		 	อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว ด้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง ด้านทานปานกลาง (MR) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ด้านทาน (R) ผลแดง ด้านทานปานกลาง (MR) ปริมาณความเผ็ด 29,250 (± 461) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -


สกว 119 พริกขี้หนูแต้			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : สุรพงษ์ ตีบบมา ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 0.6 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 2.3 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.51 มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเหลืองเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 88 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 121 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.5 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 2.4 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.74 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 151 วัน ความต้านทานโรค
			โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว ต้านทาน (R) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทาน (R) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) ปริมาณความเผ็ด 68,615 ($\pm 1,271$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : - 


สกว 120 พริกแต่กลาง		
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : เพ็ญศรี กันที ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 1.7 กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 3.8 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.59 มิลลิเมตร	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเหลืองเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 97 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 133 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.0 กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 3.8 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.63 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 151 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอ (S) ผลแดง ต้านทานมาก (HR) ปริมาณความเผ็ด 70,492 ($\pm 2,295$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -
		  รูปที่บันทึกมีปัญหาไม่สามารถเปิดไฟล์รูปได้


สกว 121 พริกแต้กลาง	
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : ขวัญ เครือเงิน ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 1.2 กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 3.2 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.83 มิลลิเมตร
	
งานวิจัย	
	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเหลืองเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 82 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 120 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.8 กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 3.5 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.79 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 151 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอ (S) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอ (S) ผลแดง อ่อนแอ (S) ปริมาณความเผ็ด 67,927 (± 485) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -
	

สกว 122 พริกเขียว			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
 	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : บونس่ง ขุนทวรร ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 9.2 กรัม ความกว้างผล 1.5 เซนติเมตร ความยาวผล 0.9 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.45 มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก intermediate การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม prostrate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 93 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 133 เซนติเมตร น้ำหนักผล 10.3 กรัม ความกว้างผล 1.8 เซนติเมตร ความยาวผล 11.5 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 2.02 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว ต้านทาน (R) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง ต้านทาน (R)
		 	ปริมาณความเผ็ด 20,269 (± 594) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : รสเผ็ด เปลือกหนา น้ำหนักต่อผลดี พริกเขียวใช้สำหรับ ใส่แกง ผัดพริกสด น้ำพริกหนุ่ม พริกแดงใช้ทำพริกแห้งอย่างเดียว พริกเขียวราคากิโลกรัมละ 30 บาท พริกแห้งราคากิโลกรัมละ 150 บาท ปัญหา : มีการระบาดของโรคโคนเน่า


สกว 123 พริกแต่เชียงดาว			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
		  	
ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : ตลาดเมืองใหม่ ต.ช้างม่วย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 0.8 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 3.6 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.70 มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเหลืองเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 77 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 117 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.5 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 3.1 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.85 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 151 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) - โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) ปริมาณความเผ็ด 104,282 ($\pm 2,232$) SHU เผ็ดสูงมาก ลักษณะเด่น : -	

สกว 124 พริกแต่ใหญ่ลำพูน			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : ตลาดเมืองใหม่ ต.ช้างม่วย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 1.3 กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 4.2 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.75 มิลลิเมตร	  	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเหลืองเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 83 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 101 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.0 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 3.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.32 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 151 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง - <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอ (S) ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด 71,001 ($\pm 2,130$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -


สกว 125 พริกดอยแม่สะเรียง			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : ตลาดเมืองใหม่ ต.ช้างม่วย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 0.3 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 2.3 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.13 มิลลิเมตร	  	งานวิจัย ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเหลืองเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 95 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 99 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.2 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 2.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.62 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอ (S) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอ (S) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) ปริมาณความเผ็ด 108,605 ($\pm 4,963$) SHU เผ็ดสูงมาก ลักษณะเด่น : -


สกว 126 พริกส้ม/เป็บ/พวง			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาควิทย แหล่งที่มา : ตลาดชุมแพ จ.ขอนแก่น ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 1.1 กรัม ความกว้างผล 1.0 เซนติเมตร ความยาวผล 3.2 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.65 มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเหลืองเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม prostrate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 78 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 118 เซนติเมตร น้ำหนักผล 3.6 กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 3.8 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.99 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียวขาว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอ (S) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอ (S) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) ปริมาณความเผ็ด 111,009 ($\pm 1,176$) SHU เผ็ดสูงมาก ลักษณะเด่น : -
			
			

สกว 127 พริกเดียวไก่			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : จาตุรงค์ ด่วนบุญ ต.เขาวีเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 1.5 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 5.9 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.59 มิลลิเมตร	 	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีขาวเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน - ผลสุก - อายุเก็บเกี่ยว - วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) - โรคไวรัส (TNRV) - โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capcisi</i> ผลเขียว - ผลแดง - <i>C. acutatum</i> ผลเขียว - ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด - ลักษณะเด่น : -
	เกิดการระบาดของเพลี้ยไฟทำให้ดอกหลุดร่วงและพริกไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม		


สกว 128 พริกชี้			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : จำเนียร สุขทอง จ.นครศรีธรรมราช ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 1.2 กรัม ความกว้างผล 1.0 เซนติเมตร ความยาวผล 3.6 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.74 มิลลิเมตร	  	งานวิจัย ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเหลืองเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 85 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 123 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.8 กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 3.6 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีขาว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง ต้านทาน (R) ปริมาณความเผ็ด 97,211 ($\pm 1,087$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -

สกว 129 พริกยอดสนเล็ก			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาคอุทัย แหล่งที่มา : จ.หนองคาย ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 0.3 กรัม ความกว้างผล 0.4 เซนติเมตร ความยาวผล 4.5 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.18 มิลลิเมตร	เมล็ดไม่งอก	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - สีดอก - ตำแหน่งดอก - การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม - ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน - ผลสุก - อายุเก็บเกี่ยว - วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) - โรคไวรัส (TNRV) - โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว - ผลแดง - <i>C. acutatum</i> ผลเขียว - ผลแดง - ปริมาณความเหี่ยว - ลักษณะเด่น : -


สกว 130 พริกขี้หนูบ้านปางแก			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ชุต อ.วีระ ภาควิทย แหล่งที่มา : บ.ปางแก ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 0.1 กรัม ความกว้างผล 0.4 เซนติเมตร ความยาวผล 1.5 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.10 มิลลิเมตร	  	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเหลืองเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงต้น erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 72 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 109 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.5 กรัม ความกว้างผล 0.4 เซนติเมตร ความยาวผล 1.5 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.35 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค โรคน้ำเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) - โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอ (S) ปริมาณความเผ็ด 131,332 ($\pm 2,092$) SHU เผ็ดสูงมาก ลักษณะเด่น : -


สกว 131 พริกน้อย/พริกตุ้ม			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ชุต อ.วีระ ภาควิชา แหล่งที่มา : อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 0.3 กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 2.7 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.11 มิลลิเมตร	  	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 74 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 120 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.6 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 3.4 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.73 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียวขาว ผลสุก สีแดงส้ม อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอ (S) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) ปริมาณความเผ็ด 97,893 (± 969) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -


สกว 132 พริกห้อยฝัก/พริกปีบ		
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย
	ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาควิทย แหล่งที่มา : อ.คอนลาน จ.ชัยภูมิ ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 0.5 กรัม ความกว้างผล 1.1 เซนติเมตร ความยาวผล 4.1 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.15 มิลลิเมตร	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - สีดอก - ตำแหน่งดอก - การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม - ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน - ผลสุก - อายุเก็บเกี่ยว - วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) - โรคไวรัส (TNRV) - โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว - ผลแดง - <i>C. acutatum</i> ผลเขียว - ผลแดง - ปริมาณความเหี่ยว - ลักษณะเด่น : รากสูงกว่าพริกขี้หนูฮอกไกโด ข้อเสีย : ปัญหาไวรัส ใบด่างขาว
	เมล็ดไม่งอก	


สกว 133 พริกขี้หนู			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : จำลอง เกาพล ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 0.8 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 2.7 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.46 มิลลิเมตร	  	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 76 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 97 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.6 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 3.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.60 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค โรคน้ำเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอ (S) ปริมาณความเผ็ด 31,381 (± 958) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -


สกว 134 พริกกระเทียม		
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : จำลอง เกาพล ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 0.2 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 2.6 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.10 มิลลิเมตร	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - สีดอก - ตำแหน่งดอก - การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม - ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน - ผลสุก - อายุเก็บเกี่ยว - วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) - โรคไวรัส (TNRV) - โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว - ผลแดง - <i>C. acutatum</i> ผลเขียว - ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด - ลักษณะเด่น : -
	เกิดการระบาดของเพลี้ยไฟทำให้ดอกหลุดร่วงและพริกไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม	


สกว 135 พริกป๊อป			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : แย้ม สืบแจ้ง ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 1.9 กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 4.2 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.85 มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเหลืองเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงต้น erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 88 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 128 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.1 กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 5.1 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.83 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียวขาว ผลสุก แดงส้ม อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทาน (R) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) ปริมาณความเผ็ด 120,353 ($\pm 2,944$) SHU เผ็ดสูงมาก ลักษณะเด่น : -
			
			

สกว 136 พริกกะเหรี่ยงหนองหญ้าปล้อง			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 4.4 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.61 มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเหลืองเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 83 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 99 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.0 กรัม ความกว้างผล 0.3 เซนติเมตร ความยาวผล 2.3 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.46 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) - โรคไวรัส (TNRV) - โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว - ผลแดง - <i>C. acutatum</i> ผลเขียว - ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด - ลักษณะเด่น : -
			
			

สกว 137 พริกม้ง		
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย
เมล็ด	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : พงษ์ศักดิ์ อีรวงรัตน์ อ.พพระ จ.ตาก ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร	   ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเหลืองเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 81 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 96 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.5 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 4.3 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.64 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 144 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอ (S) ปริมาณความเผ็ด 98,709 ($\pm 2,583$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -

สกว 138 พริกม้ง			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
เมล็ด	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : พงษ์ศักดิ์ อีร์ดวงรัตน์ อ.พพระ จ.ตาก ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร	  	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเหลืองเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 79 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 111 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.4 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 3.4 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.60 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capcisi</i> ผลเขียว อ่อนแอ (S) ผลแดง อ่อนแอ (S) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอ (S) ผลแดง อ่อนแอ (S) ปริมาณความเผ็ด 135,005 ($\pm 2,350$) SHU เผ็ดสูงมาก ลักษณะเด่น : -

สกว 139 พริกชี้ฟ้า/ตีปัลลี		
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย
ผลสดนำมาได้วัดข้อมูล	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : ต.สังฆาม อ.สมุย จ.สุราษฎร์ธานี ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร	   ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเหลืองเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 107 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 137 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.7 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 2.4 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.80 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 144 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) ต้านทานปานกลาง (MR) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capcisi</i> ผลเขียว ต้านทานมาก (HR) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอ (S) ผลแดง อ่อนแอ (S) ปริมาณความเผ็ด 60,101 (± 949) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -


สกว 140 พริกกะเหรียง			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 1.0 กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 3.7 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.49 มิลลิเมตร	  	งานวิจัย ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเหลืองเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 92 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 108 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.0 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 3.3 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.70 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 151 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) - โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอ (S) ผลแดง ต้านทาน (R) ปริมาณความเผ็ด 105,169 (± 620) SHU เผ็ดสูงมาก ลักษณะเด่น : -

สกว 141 พริกเลื่อย			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 0.7 กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 2.4 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.61 มิลลิเมตร	  	งานวิจัย ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเหลืองเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 97 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 115 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.3 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 2.1 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.69 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 151 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) - โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capcisi</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) ปริมาณความเผ็ด 98,950 ($\pm 1,195$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -

สกว 142 พริกกะเหรี่ยง			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : จ.กาญจนบุรี ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 1.0 กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 2.9 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.82 มิลลิเมตร	 	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเหลืองเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน - ผลสุก - อายุเก็บเกี่ยว - วัน ความต้านทานโรค โรคนูน (C. cucurbitarum) - โรคไวรัส (TNRV) - โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว - ผลแดง - <i>C. acutatum</i> ผลเขียว - ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด - ลักษณะเด่น : -
	เกิดการระบาดของเพลี้ยไฟทำให้ดอกหลุดร่วงและพริกไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม		


สกว 143 พริกขาว			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : ต.ด่านแม่ฉลบบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 2.0 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 5.3 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.86 มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเหลืองเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน - ผลสุก - อายุเก็บเกี่ยว - วัน ความต้านทานโรค โรคนูน (C. cucurbitarum) - โรคไวรัส (TNRV) - โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว - ผลแดง - <i>C. acutatum</i> ผลเขียว - ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด - ลักษณะเด่น : -
		เกิดการระบาดของเพลี้ยไฟทำให้ดอกหลุดร่วงและพริกไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม	



สกว 144 พริกส้มปากปวน			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : ต.ผาบึง อ.วังสะพุง จ.เลย ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 2.6 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 7.1 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.75 มิลลิเมตร	 	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเหลืองเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน - ผลสุก - อายุเก็บเกี่ยว - วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) - โรคไวรัส (TNRV) - โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว - ผลแดง - <i>C. acutatum</i> ผลเขียว - ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด - ลักษณะเด่น : -
	เกิดการระบาดของเพลี้ยไฟทำให้ดอกหลุดร่วงและพริกไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม		

สกว 145 พริกใหญ่วัดโบสถ์			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาควิทย แหล่งที่มา : อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล 1.4 เซนติเมตร ความยาวผล 7.5 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.18 มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก pendant การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 89 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 100 เซนติเมตร น้ำหนักผล 2.0 กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 6.3 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.70 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียวอ่อน ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) ต้านทาน (R) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว - ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว - ผลแดง ต้านทาน (R) ปริมาณความเผ็ด 15,277 (± 297) SHU เผ็ดปานกลาง ลักษณะเด่น : กลิ่นหอม เหมาะสำหรับตำพริกแกง
			

สกว 146 พริกจินดาวัดโบสถ์			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาควิทย แหล่งที่มา : อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 6.6 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.19 มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก pendant การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 89 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 100 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.0 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 6.5 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.70 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค โรคน้ำเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) ต้านทานปานกลาง (MR) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว ต้านทาน (R) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) ปริมาณความเผ็ด 46,024 (± 617) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -
			


สกว 147 พริกแขวพื้นเมือง		
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย
	ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาควิทย แหล่งที่มา : ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 1.4 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 6.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.51 มิลลิเมตร	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 98 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 112 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.9 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 4.4 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.70 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) ปริมาณความเผ็ด 55,498 (± 141) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -
	  	



สกว 148 พริกพื้นเมืองบ้านก่ง			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาควิทย แหล่งที่มา : ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 46.0 กรัม ความกว้างผล 3.2 เซนติเมตร ความยาวผล 17.5 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 2.24 มิลลิเมตร	  	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 102 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 126 เซนติเมตร น้ำหนักผล 13.2 กรัม ความกว้างผล 1.8 เซนติเมตร ความยาวผล 15.2 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 2.10 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค โรคน้ำเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) - โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว ต้านทาน (R) ผลแดง ต้านทาน (R) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทาน (R) ผลแดง ต้านทาน (R) ปริมาณความเผ็ด 11,427 (± 178) SHU เผ็ดปานกลาง ลักษณะเด่น : เก็บเกี่ยวเร็ว ติดผลดก ผลใหญ่ ผลสีแดงสด เนื้อหนาทน โรคน้ำเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) กว่าพันธุ์หยกสยาม พริกกำมปู ราคา กิโลกรัมละ 20 บาท

สกว149 พริกจินดาพื้นเมือง			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาควิทย แหล่งที่มา : ต.ดอนแดงใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 1.7 กรัม ความกว้างผล 1.2 เซนติเมตร ความยาวผล 6.9 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.17 มิลลิเมตร	  	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 83 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 101 เซนติเมตร น้ำหนักผล 2.0 กรัม ความกว้างผล 1.9 เซนติเมตร ความยาวผล 6.9 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.25 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอ (S) ผลแดง ต้านทาน (R) ปริมาณความเผ็ด 70,147 ($\pm 2,675$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -


สกว 150 พริกแขวงกระเทียม			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาควิชา แหล่งที่มา : ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 6.0 กรัม ความกว้างผล 1.1 เซนติเมตร ความยาวผล 12.2 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.99 มิลลิเมตร		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 109 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 102 เซนติเมตร น้ำหนักผล 3.5 กรัม ความกว้างผล 1.2 เซนติเมตร ความยาวผล 7.1 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.41 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค โรคน้ำเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว ต้านทาน (R) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง ต้านทาน (R) ปริมาณความเผ็ด 34,218 (± 181) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -
			
			

สกว 151 พริกจินดาดำ			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาควิทย แหล่งที่มา : ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 1.3 กรัม ความกว้างผล 1.4 เซนติเมตร ความยาวผล 7.4 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.35 มิลลิเมตร	  	งานวิจัย ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 80 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 132 เซนติเมตร น้ำหนักผล 2.0 กรัม ความกว้างผล 1.8 เซนติเมตร ความยาวผล 7.5 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.49 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค โรคน้ำเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) ต้านทานปานกลาง (MR) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอ (S) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทาน (R) ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด 9,016 (± 313) SHU เผ็ดปานกลาง ลักษณะเด่น : ผลตรงสวย สีผลเข้ม เหมาะแก่การทำพริกแห้ง ผิวยเรียบสวย


สกว 152 พริกสร้อยสน			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาควิทย แหล่งที่มา : ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 1.2 กรัม ความกว้างผล 1.1 เซนติเมตร ความยาวผล 8.7 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.11 มิลลิเมตร	  	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 106 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 152 เซนติเมตร น้ำหนักผล 2.7 กรัม ความกว้างผล 1.1 เซนติเมตร ความยาวผล 6.9 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.95 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) ต้านทานปานกลาง (MR) โรคไวรัส (TNRV) - โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง - <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด 17,533 (± 395) SHU เผ็ดปานกลาง ลักษณะเด่น : -


สกว 153 พริกยอดสน			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : อ.วีระ ภาควิทย แหล่งที่มา : อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ ลักษณะทางพืชสวน น้ำหนักผล 0.6 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 6.4 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.18 มิลลิเมตร	  	งานวิจัย ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 113 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 151 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.0 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 4.7 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.67 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค โรคน้ำเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอ (S) ผลแดง อ่อนแอ (S) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทาน (R) ผลแดง อ่อนแอ (S) ปริมาณความเผ็ด 54,925 ($\pm 1,632$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : รสเผ็ด แซ่บ หอมฉ่ำ


สกว 154 CA032 พริกเคียวโก่		
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> น้ำหนักผล 1.3 กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 4.9 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.95 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดงส้ม ความสูงต้น 123 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 89 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 118 วัน	   ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเหลืองเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 103 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 71 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.9 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 4.7 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.69 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 145 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) ปริมาณความเผ็ด 81,694 ($\pm 1,238$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -


สกว 155 CA034 พริกหอมสีขาว		
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.สระแก้ว จ.ปราจีนบุรี ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - น้ำหนักผล 0.6 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 2.7 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.98 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 167 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 86 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 118 วัน	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเหลืองเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงต้น erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 95 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 47 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.4 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 2.5 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.51 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีขาว ผลสุก สีแดงส้ม อายุเก็บเกี่ยว 129 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) ปริมาณความเผ็ด 109,284 ($\pm 5,082$) SHU เผ็ดสูงมาก ลักษณะเด่น : -
	   2.CA034 พริกหอมสีขาว	


สกว 156 CA050 พริกชี้หนู			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.เมือง จ.ตราด ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> น้ำหนักผล 0.4 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 2.1 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.54 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 144 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 54 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 146 วัน	 	งานวิจัย ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 106 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 57 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.2 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 1.8 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.36 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 150 วัน ความต้านทานโรค โรคนูน (C. cucurbitarum) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว - ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด 171,244 ($\pm 2,091$) SHU เผ็ดสูงมาก ลักษณะเด่น : -
	รูปที่บันทึกมีปัญหาไม่สามารถเปิดไฟล์ได้		


สกว 157 CA052 พริกชี้หนู			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.เมือง จ.ตราด ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> น้ำหนักผล 0.5 กรัม ความกว้างผล 0.4 เซนติเมตร ความยาวผล 2.1 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.82 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 140 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 78 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 118 วัน		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 104 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 62 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.3 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 2.1 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.38 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 158 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capcisi</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว - ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด 129,319 ($\pm 3,771$) SHU เผ็ดสูงมาก ลักษณะเด่น : -
			


สกว 158 CA053 พริกชี้หนู-กรุงเทพ			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.เมือง จ.ตราด ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> น้ำหนักผล 1.0 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 4.1 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.77 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 112 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 81 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 118 วัน		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 69 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 40 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.6 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 4.4 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.60 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีสแดง อายุเก็บเกี่ยว 129 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) - โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) ปริมาณความเผ็ด 19,779 (± 210) SHU เผ็ดปานกลาง ลักษณะเด่น : -
			


สกว 159 CA054 พริกชี้หนูปั้นยาว			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.เมือง จ.ตราด ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> น้ำหนักผล 1.8 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 6.5 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.96 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 133 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 85 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 118 วัน		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 78 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 47 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.0 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 6.3 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.98 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 129 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) ปริมาณความเผ็ด 75,289 ($\pm 1,651$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -
			


สกว 160 CA062 พริกชี้หนู		
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : จ.ระยอง ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> น้ำหนักผล 0.3 กรัม ความกว้างผล 0.4 เซนติเมตร ความยาวผล 2.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.83 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 105 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 42 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 128 วัน	  
		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 120 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 65 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.7 กรัม ความกว้างผล 1.0 เซนติเมตร ความยาวผล 2.4 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.32 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีสแดง อายุเก็บเกี่ยว 136 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด 54,184 ($\pm 1,897$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -

สกว 161 CA071 พริกหอม	
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม	งานวิจัย
 ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.บ้านนา จ.นครนายก ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> น้ำหนักผล 0.4 กรัม ความกว้างผล 0.4 เซนติเมตร ความยาวผล 2.3 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.61 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 150 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 67 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 128 วัน	   ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเหลืองเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 93 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 58 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.2 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 2.3 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.50 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียวอ่อน ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 129 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capcisi</i> ผลเขียว - ผลแดง - <i>C. acutatum</i> ผลเขียว - ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด 122,208 ($\pm 4,311$) SHU เผ็ดสูงมาก ลักษณะเด่น : -

สกว 162 CA111 พริกจินดา		
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย
ไม่มีรูป	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.เมือง จ.เลย ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> น้ำหนักผล 0.8 กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 4.4 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.78 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดงส้ม ความสูงต้น 137 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 59 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 163 วัน	   ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเหลืองเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 138 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 61 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.3 กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 5.1 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.21 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียวอมขาว ผลสุก สีแดงส้ม อายุเก็บเกี่ยว 145 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอ (S) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด 93,123 (± 986) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -


สกว 163 CA0130 พริกชี้หนู		
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.เมือง จ.สกลนคร ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> น้ำหนักผล 1.2 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 3.3 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.74 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดงส้ม ความสูงต้น 137 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 59 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 146 วัน	  
		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเหลืองเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 94 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 57 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.9 กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 3.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.82 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียวอ่อน ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 145 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทานมาก (HR) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) ปริมาณความเผ็ด 99,717 ($\pm 1,889$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -

สกว 164 CA131 พริกชี้หนู		
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.เมือง จ.สกลนคร ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> น้ำหนักผล 1.3 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 5.2 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.81 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 93 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 47 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 146 วัน	  
	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเหลืองเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 90 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 54 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.0 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 4.4 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.89 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียวอ่อน ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 145 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอ (S) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) ปริมาณความเผ็ด 87,497 (±887) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -	

สกว 165 CA138 พริกชี้หนู		
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย
ไม่มีรูป	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.เมือง จ.นครพนม ลักษณะทางพืชสวน ชนิด น้ำหนักผล 0.6 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 2.7 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.85 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เหลือง ผลสุก แดง ความสูงต้น 125 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 67 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 163 วัน	   ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาวม่วง ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 71 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 45 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.7 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 6.1 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.58 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 129 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) ปริมาณความเผ็ด 36,097 ($\pm 1,727$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -

สกว 166 CA139 พริกชี้หนู			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.เมือง จ.นครพนม ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> น้ำหนักผล 0.7 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 2.8 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.11 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 107 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 67 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 163 วัน		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 64 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 50 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.2 กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 5.3 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.76 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีสแดง อายุเก็บเกี่ยว 129 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง อ่อนแอ (S) ปริมาณความเผ็ด 34,249 (± 92) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -
	 		


สกว 167 CA141 พริกชี้หนู			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.เมือง จ.นครพนม ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> น้ำหนักผล 2.7 กรัม ความกว้างผล 1.2 เซนติเมตร ความยาวผล 7.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.96 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 135 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 48 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 146 วัน	  	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 140 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 66 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.2 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 5.1 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.62 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียวอมขาว ผลสุก สีแดงส้ม อายุเก็บเกี่ยว 145 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทาน (R) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) ปริมาณความเผ็ด 67,598 ($\pm 1,805$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -


สกว 168 CA143 พริกชี้หนู			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - น้ำหนักผล 1.1 กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 4.2 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.67 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 115 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 46 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 146 วัน	  	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 80 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 48 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.3 กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 6.6 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.03 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีสแดง อายุเก็บเกี่ยว 129 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว - ผลแดง ต้านทาน (R) ปริมาณความเผ็ด 45,601 ($\pm 1,343$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -


สกว 169 CA150 พริกชี้หนู			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.เมือง จ.นครพนม ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> น้ำหนักผล 1.2 กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 4.6 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.67 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เหลือง ผลสุก แดง ความสูงต้น 106 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 31 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 146 วัน		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 140 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 68 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.3 กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 4.7 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.93 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียวอ่อน ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 145 วัน ความต้านทานโรค
		 	โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอ (S) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capcisi</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง อ่อนแอ (S) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) ปริมาณความเผ็ด 82,096 (± 584) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -


สกว 170 CA170 พริกชี้หู			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
			
ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> น้ำหนักผล 1.2 กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 4.6 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.87 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 111 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 75 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 146 วัน			
			
		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 81 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 53 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.9 กรัม ความกว้างผล 1.0 เซนติเมตร ความยาวผล 6.4 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.13 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียวอ่อน ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 129 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capcisi</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอ (S) ผลแดง อ่อนแอ (S) ปริมาณความเผ็ด 40,078 ($\pm 1,515$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -	


สกว 171 CA172 พริกชี้หู		
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> น้ำหนักผล 2.6 กรัม ความกว้างผล 1.0 เซนติเมตร ความยาวผล 5.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.39 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 109 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 69 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 118 วัน	  
		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 70 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 44 เซนติเมตร น้ำหนักผล 2.0 กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 6.8 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.25 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 129 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอ (S) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) ปริมาณความเผ็ด 31,904 (± 747) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -


สกว 172 CA175 พริกชี้หนู		
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.ราศรีไศล จ.ศรีสะเกษ ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> น้ำหนักผล 1.9 กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 6.7 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.84 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 99 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 71 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 105 วัน	  
		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 67 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 47 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.3 กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 9.2 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.02 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 129 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capcisi</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด 31,613 (± 518) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -


สกว 173 CA177 พริกชี้หู		
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย
ไม่มีรูป	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> น้ำหนักผล 2.6 กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 6.6 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.08 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียวเหลือง ผลสุก แดง ความสูงต้น 78 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 68 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 105 วัน	   ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 69 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 61 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.8 กรัม ความกว้างผล 1.3 เซนติเมตร ความยาวผล 6.5 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.95 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียวอ่อน ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 129 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอ (S) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capcisi</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทาน (R) ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด 14,809 (± 271) SHU เผ็ดปานกลาง ลักษณะเด่น : -


สกว 174 CA189 พริกชี้หนู			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> น้ำหนักผล 1.1 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 3.6 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.51 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 110 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 66 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 146 วัน		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก intermediate การเจริญเติบโตของทรงต้น intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 76 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 56 เซนติเมตร น้ำหนักผล 2.0 กรัม ความกว้างผล 1.0 เซนติเมตร ความยาวผล 5.5 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.74 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 129 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว ต้านทานมาก (HR) ผลแดง ต้านทานมาก (HR) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) ปริมาณความเผ็ด 22,594 (± 291) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -
		 	


สกว 175 CA198 พริกชี้หนู		
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> น้ำหนักผล 1.0 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 4.1 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.71 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 101 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 73 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 146 วัน	   ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 68 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 55 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.7 กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 6.3 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.18 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 129 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนใบ (C. cucurbitarum) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทาน (R) ผลแดง ต้านทาน (R) ปริมาณความเผ็ด 47,588 ($\pm 2,091$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -


สกว 176 CA218 พริกชี้หนู			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> น้ำหนักผล 1.8 กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 6.7 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.67 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 83 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 46 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 146 วัน	  	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก intermediate การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 55 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 49 เซนติเมตร น้ำหนักผล 2.2 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 8.5 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.19 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 129 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) ปริมาณความเผ็ด 23,633 (± 339) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -


สกว 177 CA224 พริกชี้หนู			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> น้ำหนักผล 2.7 กรัม ความกว้างผล 1.1 เซนติเมตร ความยาวผล 6.2 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.16 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 102 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 47 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 118 วัน	  	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 65 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 49 เซนติเมตร น้ำหนักผล 2.5 กรัม ความกว้างผล 1.0 เซนติเมตร ความยาวผล 6.9 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.45 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 129 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนใบ (C. cucurbitarum) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) C. capsici ผลเขียว อ่อนแอ (S) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) C. acutatum ผลเขียว ต้านทาน (R) ผลแดง ต้านทาน (R) ปริมาณความเผ็ด 43,540 (± 611) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -


สกว 178 CA225 พริกชี้หนู			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> น้ำหนักผล 1.0 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 4.1 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.77 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 84 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 42 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 146 วัน		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 56 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 52 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.7 กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 6.1 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.93 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 129 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอ (S) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง ต้านทาน (R) ปริมาณความเผ็ด 44,635 (± 694) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -
		 	


สกว 179 CA262 พริกขึ้นเหลี่ยม			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.เมือง จ.ยะลา ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> น้ำหนักผล 2.1 กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 6.6 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.24 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 73 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 66 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 105 วัน		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 54 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 52 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.4 กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 5.5 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.96 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียวอ่อน ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 129 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว ด้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ด้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด 39,492 ($\pm 1,964$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -
		 	


สกว 180 CA274 พริกขึ้นนก		
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - น้ำหนักผล 0.7 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 2.6 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.67 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดงส้ม ความสูงต้น 93 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 48 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 146 วัน	   27. CA274 พริกขึ้นนก
		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 110 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 80 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.6 กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 2.6 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.55 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีขาว ผลสุก สีแดงส้ม อายุเก็บเกี่ยว 145 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด 71,741 ($\pm 1,952$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -

สกว 181 CA275 พริกขึ้นเกษตร			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - น้ำหนักผล 1.8 กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 4.9 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.06 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 112 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 39 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 118 วัน		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 66 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 41 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.3 กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 4.9 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.82 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 129 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) ปริมาณความเผ็ด 13,847 (± 675) SHU เผ็ดปานกลาง ลักษณะเด่น : -
			


สกว 182 CA276 พริกขึ้นกษेत्र			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
ไม่มีรูป	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - น้ำหนักผล 0.6 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 2.9 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.45 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 119 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 38 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 146 วัน	  	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 86 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 54 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.7 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 4.4 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.72 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 136 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) ปริมาณความเผ็ด 31,045 ($\pm 1,221$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -


สกว 183 CA281 พริกขึ้นนก			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.เมือง จ.ชุมพร ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - น้ำหนักผล 0.5 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 3.5 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.45 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 103 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 40 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 146 วัน		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 72 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 48 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.5 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 4.4 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.96 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 129 วัน ความต้านทานโรค
		 	โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอ (S) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) ปริมาณความเผ็ด 62,525 (± 870) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -


สกว 184 CA283 พริกขึ้นก			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.กระบุรี จ.ระนอง ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> น้ำหนักผล 0.3 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 2.3 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.41 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดงส้ม ความสูงต้น 108 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 47 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 146 วัน		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเหลืองเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 122 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 57 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.3 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 2.3 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.65 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีส้ม อายุเก็บเกี่ยว 129 วัน ความต้านทานโรค โรคนูน (C. cucurbitarum) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอ (S) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอ (S) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว - ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด 138,335 ($\pm 2,827$) SHU เผ็ดสูงมาก ลักษณะเด่น : -
			


สกว 185 CA285 พริกสวน			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.กระบุรี จ.ระนอง ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> น้ำหนักผล 0.4 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 2.9 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.49 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 109 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 66 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 146 วัน	  	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 78 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 52 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.4 กรัม ความกว้างผล 0.4 เซนติเมตร ความยาวผล 6.8 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.41 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 129 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอ (S) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) ปริมาณความเผ็ด 63,602 ($\pm 1,463$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -


สกว 186 CA286 พริกชี้หนู			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> น้ำหนักผล 1.1 กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 3.2 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.00 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 113 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 38 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 118 วัน		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 78 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 37 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.1 กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 4.5 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.65 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 129 วัน ความต้านทานโรค โรคน้ำเน่า (C. cucurbitarum) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) ต้านทาน (R) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) C. capsici ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) C. acutatum ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง อ่อนแอ (S) ปริมาณความเผ็ด 32,557 (± 944) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -
			


สกว 187 CA291 พริกชี้หูสวน		
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.เมือง จ.ลพบุรี ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> น้ำหนักผล 0.3 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 2.2 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.36 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดงส้ม ความสูงต้น 84 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 73 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 146 วัน	  
		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเหลืองเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 97 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 63 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.3 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 2.2 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.40 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 129 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอ (S) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capcisi</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) ปริมาณความเผ็ด 98,096 ($\pm 2,089$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -

สกว 188 CA312 พริกชี้หนู			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - น้ำหนักผล 3.4 กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 8.7 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.26 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 102 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 74 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 107 วัน	  	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก pendant การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 71 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 45 เซนติเมตร น้ำหนักผล 3.0 กรัม ความกว้างผล 1.0 เซนติเมตร ความยาวผล 6.9 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.99 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 129 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนใบ (C. cucurbitarum) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว - ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด 23,343 (± 324) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -

สกว 189 CA316 พริกชี้หนู		
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - น้ำหนักผล 0.9 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 4.4 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.51 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 105 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 45 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 146 วัน	   ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 79 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 37 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.8 กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 6.5 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.97 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 129 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) ต้านทาน (R) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอ (S) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทานมาก (HR) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) ปริมาณความเผ็ด 34,157 ($\pm 1,186$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -


สกว 190 CA317 พริกชี้หูสวน			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - น้ำหนักผล 0.3 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 1.5 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.26 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 83 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 74 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 146 วัน		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 86 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 56 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.2 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 1.1 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.31 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 129 วัน ความต้านทานโรค โรคน้ำเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอ (S) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว - ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด 128,543 ($\pm 5,986$) SHU เผ็ดสูงมาก ลักษณะเด่น : -
		 	

สกว 191 CA318 พริกชี้หนู		
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ลักษณะทางพืชสวน ชนิด น้ำหนักผล 2.2 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 6.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.70 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 117 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 73 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 146 วัน	  
		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 136 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 75 เซนติเมตร น้ำหนักผล 2.4 กรัม ความกว้างผล 1.1 เซนติเมตร ความยาวผล 6.4 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.84 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 129 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) ต้านทานปานกลาง (MR) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอ (S) ผลแดง อ่อนแอ (S) ปริมาณความเผ็ด 41,421 ($\pm 1,462$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -


สกว 192 CA320 พริกจินดา			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
ไม่มีรูป	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - น้ำหนักผล 0.6 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 4.5 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.30 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 123 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 50 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 146 วัน	  	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงต้น erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 124 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 89 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.9 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 5.3 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.56 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 129 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) ต้านทาน (R) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) ปริมาณความเผ็ด 28,773 (± 483) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -

สกว 193 CA322 พริกชี้หนู			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - น้ำหนักผล 0.5 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 2.6 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.79 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดงส้ม ความสูงต้น 89 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 39 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 146 วัน	  	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 99 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 59 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.5 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 2.2 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.35 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 129 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนใบ (C. cucurbitarum) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) ต้านทานปานกลาง (MR) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง อ่อนแอ (S) ปริมาณความเผ็ด 86,386 ($\pm 1,717$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -


สกว 194 CA335 พริกชี้หนู		
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - น้ำหนักผล 0.4 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 2.4 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.36 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดงส้ม ความสูงต้น 123 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 50 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 146 วัน	
	เกิดการระบาดของโรคยอดเน่า	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - สีดอก - ตำแหน่งดอก - การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม - ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน - ผลสุก - อายุเก็บเกี่ยว - วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) - โรคไวรัส (TNRV) - โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capcisi</i> ผลเขียว - ผลแดง - <i>C. acutatum</i> ผลเขียว - ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด - ลักษณะเด่น : -

สกว 195 CA341 พริกชี้หูสวน			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
ไม่มีรูป	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - น้ำหนักผล 0.2 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 1.5 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.17 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 84 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 44 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 146 วัน	  	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเหลืองเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 111 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 68 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.2 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 1.4 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.35 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 129 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอ (S) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capcisi</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) ปริมาณความเผ็ด 145,642 ($\pm 4,315$) SHU เผ็ดสูงมาก ลักษณะเด่น : -

สกว 196 CA346 พริกจินดา			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - น้ำหนักผล 0.7 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 4.1 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.4 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 94 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 65 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 146 วัน		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 98 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 60 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.9 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 3.8 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.76 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 129 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) ต้านทาน (R) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอ (S) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอ (S) ผลแดง อ่อนแอ (S) ปริมาณความเผ็ด 19,473 (± 661) SHU เผ็ดปานกลาง ลักษณะเด่น : -
			
			


สกว 197 CA350 พริกกระเทียม		
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - น้ำหนักผล 0.5 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 3.2 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.52 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดงส้ม ความสูงต้น 100 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 50 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 146 วัน	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 114 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 72 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.5 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 2.6 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.57 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 145 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) ปริมาณความเผ็ด 143,408 (±377) SHU เผ็ดสูงมาก ลักษณะเด่น : -
	  	


สกว 198 CA353 พริกขึ้นก			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - น้ำหนักผล 0.6 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 3.9 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.59 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดงส้ม ความสูงต้น 100 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 50 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 146 วัน		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเหลืองเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 123 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 77 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.5 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 3.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.65 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 129 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) ปริมาณความเผ็ด 86,309 (± 609) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -
			

สกว 199 CA355 พริกกระเทียม			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - น้ำหนักผล 0.5 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 3.2 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.50 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 106 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 79 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 146 วัน		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเหลืองเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 119 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 75 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.5 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 2.4 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.59 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 129 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอ (S) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอ (S) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) ปริมาณความเผ็ด 129,957 (± 541) SHU เผ็ดสูงมาก ลักษณะเด่น : -
	 		


สกว 200 CA364 พริกหัวยี่สิบ			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : - ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - น้ำหนักผล 1.4 กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 4.4 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.84 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 103 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 65 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 113 วัน		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 69 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 49 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.1 กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 4.1 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.52 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 129 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) ต้านทาน (R) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอ (S) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) ปริมาณความเผ็ด 77,181 ($\pm 2,792$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -
		 	


สกว 201 CA368 พริกนกบางเลน			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : - ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - น้ำหนักผล 1.5 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 5.6 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.67 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 120 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 78 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 113 วัน		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 77 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 47 เซนติเมตร น้ำหนักผล 2.0 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 7.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.55 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 129 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) ต้านทาน (R) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทาน (R) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) ปริมาณความเผ็ด 24,088 (± 348) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -
		 	


สกว 202 CA369 พริกหัวเรืออุบล			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : จ.อุบลราชธานี ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - น้ำหนักผล 2.2 กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 6.3 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.39 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 97 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 87 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 113 วัน	  	งานวิจัย ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 73 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 53 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.7 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 5.4 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.70 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียวอ่อน ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 136 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) ต้านทาน (R) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอ (S) ผลแดง อ่อนแอ (S) ปริมาณความเผ็ด 37,253 ($\pm 1,162$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -

สกว 203 CA372 พริกชี้หูสวน			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : - ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - น้ำหนักผล 0.5 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 3.6 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.62 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดงส้ม ความสูงต้น 122 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 87 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 113 วัน	  	งานวิจัย ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเหลืองเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 101 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 53 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.4 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 2.3 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.37 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 129 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอปานกลาง (MS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง ต้านทานมาก (HR) ปริมาณความเผ็ด 115,908 ($\pm 1,632$) SHU เผ็ดสูงมาก ลักษณะเด่น : -

สกว 204 CA387 พริกชี้หูตอน			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : จ.อุดรธานี ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - น้ำหนักผล 1.8 กรัม ความกว้างผล 1.0 เซนติเมตร ความยาวผล 6.2 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.79 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 193 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 50 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 113 วัน		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเหลืองเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 137 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 56 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.8 กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 5.8 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.07 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 145 วัน ความต้านทานโรค
		  51.CA387 พริกชี้หูตอน	โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอปานกลาง (MS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง ต้านทาน (R) ปริมาณความเผ็ด 94,913 ($\pm 1,499$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -



สกว 205 CA394 พริกชี้หนูเมืองเพชรบุรี			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : จ.เพชรบุรี ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - น้ำหนักผล 0.3 กรัม ความกว้างผล 0.4 เซนติเมตร ความยาวผล 3.3 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.52 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดงส้ม ความสูงต้น 120 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 78 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 142 วัน		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเหลืองเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 126 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 79 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.3 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 2.8 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.48 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 145 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอ (S) โรคแอนแทรกคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) ปริมาณความเผ็ด 111,300 ($\pm 1,009$) SHU เผ็ดสูงมาก ลักษณะเด่น : -
		 	

สกว 206 CA397 พริกนกบ้านโป่ง			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : - ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - น้ำหนักผล 1.3 กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 5.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.59 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 152 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 103 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 113 วัน		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 61 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 33 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.9 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 4.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.47 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 129 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) ต้านทาน (R) โรคแอนแทรกคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอ (S) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว - ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) ปริมาณความเผ็ด 38,071 ($\pm 1,089$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -
		 	


สกว 207 CA398 พริกขี้หนูไทย			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา :- ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - น้ำหนักผล 1.2 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 4.4 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.54 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดงส้ม ความสูงต้น 123 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 75 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 113 วัน		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 74 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 56 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.1 กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 5.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.64 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 129 วัน ความต้านทานโรค
		 	โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) ต้านทานปานกลาง (MR) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทาน (R) ผลแดง ต้านทาน (R) ปริมาณความเผ็ด 29,667 (± 279) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น :-

สกว 208 CA399 พริกชี้หนูปิษณุโลก			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : จ.พิษณุโลก ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - น้ำหนักผล 1.1 กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 4.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.68 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 130 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 100 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 113 วัน		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 81 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 51 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.9 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 3.4 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.46 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 129 วัน ความต้านทานโรค
		 	โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) ต้านทานปานกลาง (MR) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอ (S) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) ปริมาณความเผ็ด 48,335 ($\pm 1,573$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -


สกว 209 CA848 พริกกะเหรี่ยง			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.แม่สลด ดอยมูเซอ จ.ตาก ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - น้ำหนักผล 2.8 กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 6.7 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.87 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 90 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 93 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 121 วัน		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 63 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 55 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.6 กรัม ความกว้างผล 1.0 เซนติเมตร ความยาวผล 5.7 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.96 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 129 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอปานกลาง (MS) โรคไวรัส (TNRV) ต้านทาน (R) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอ (S) ผลแดง ต้านทาน (R) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) ปริมาณความเผ็ด 18,362 (± 829) SHU เผ็ดปานกลาง ลักษณะเด่น : -
		 	

สกว 210 CA854 พริกชี้หนู			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : จ.ตราด ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - น้ำหนักผล 1.0 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 4.8 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.60 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 107 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 81 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 121 วัน		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 61 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 47 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.6 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 4.4 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.63 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 129 วัน ความต้านทานโรค
		 	โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) - โรคไวรัส (TNRV) ต้านทาน (R) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) ปริมาณความเผ็ด 19,868 (± 585) SHU เผ็ดปานกลาง ลักษณะเด่น : -

สกว 211 CA857 พริกขี้พลอย			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : - ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - น้ำหนักผล 7.6 กรัม ความกว้างผล 1.3 เซนติเมตร ความยาวผล 9.4 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.20 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 75 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 61 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก intermediate การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 52 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 48 เซนติเมตร น้ำหนักผล 3.4 กรัม ความกว้างผล 1.1 เซนติเมตร ความยาวผล 8.8 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.23 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 129 วัน ความต้านทานโรค
		 	โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอ (S) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง อ่อนแอ (S) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทาน (R) ผลแดง ต้านทาน (R) ปริมาณความเผ็ด 36,688 (± 543) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -

สกว 212 CA858 พริกขี้พลาย			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : จ.ขอนแก่น ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - น้ำหนักผล 1.2 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 5.4 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.62 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน ผลสุก แดง ความสูงต้น 97 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 56 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 121 วัน		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 70 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 50 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.9 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 4.7 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.57 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 129 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) ต้านทาน (R) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว - ผลแดง - <i>C. acutatum</i> ผลเขียว - ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด 40,888 (± 695) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -
		 	

สกว 213 CA859 พริกขี้หนู			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : จ.ขอนแก่น ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - น้ำหนักผล 1.0 กรัม ความกว้างผล 0.4 เซนติเมตร ความยาวผล 6.6 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.56 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน ผลสุก แดง ความสูงต้น 99 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 82 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก intermediate การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 66 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 53 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.8 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 12.9 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.59 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 129 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) ต้านทาน (R) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอ (S) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) ปริมาณความเผ็ด 93,245 ($\pm 1,584$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -
		 	


สกว 214 CA860 พริกขี้หนูสวน			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : จ.ขอนแก่น ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - น้ำหนักผล 0.8 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 3.3 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.56 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 84 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 44 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 121 วัน		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 87 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 84 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.6 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 3.6 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.63 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรกคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง ต้านทาน (R) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) ปริมาณความเผ็ด 79,954 ($\pm 2,544$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -
		 	


สกว 215 CA884 พริกชี้หนูเม็ดใหญ่			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
ไม่มีรูป	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : จ.กาญจนบุรี ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน - ผลสุก - ความสูงต้น - เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม - เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว - วัน	เมล็ดไม่งอก	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - สีดอก - ตำแหน่งดอก - การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม - ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน - ผลสุก - อายุเก็บเกี่ยว - วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) - โรคไวรัส (TNRV) - โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว - ผลแดง - <i>C. acutatum</i> ผลเขียว - ผลแดง - ปริมาณความเค็ม - ลักษณะเด่น : -

สกว 216 CA933 พริกชี้หนู			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - น้ำหนักผล 2.8 กรัม ความกว้างผล 1.1 เซนติเมตร ความยาวผล 7.5 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.55 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 126 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 73 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 124 วัน		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด annuum สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน - ผลสุก - อายุเก็บเกี่ยว - วัน ความต้านทานโรค โรคนูน (C. cucurbitarum) - โรคไวรัส (TNRV) - โรคแอนแทรกคโนส (Colletotrichum spp.) C. capsici ผลเขียว - ผลแดง - C. acutatum ผลเขียว - ผลแดง - ปริมาณความเ็นต์ - ลักษณะเด่น : -
		 เกิดการระบาดของเพลี้ยไฟทำให้ดอกหลุดร่วง และพริกไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม	

สกว 217 CA935 พริกชี้หนู			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - น้ำหนักผล 2.7 กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 6.4 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.89 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 95 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 58 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 136 วัน		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 88 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 116 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.0 กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 6.5 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.90 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรกคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอ (S) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS)
		 รูปที่บันทึกมีปัญหามากไม่สามารถเปิดไฟล์รูปได้	ปริมาณความเผ็ด - ลักษณะเด่น : -


สกว 218 CA943 พริกชี้หนู			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> น้ำหนักผล 1.6 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 7.2 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.56 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก ส้ม ความสูงต้น 137 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 93 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 133 วัน		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - สีดอก - ตำแหน่งดอก - การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม - ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน - ผลสุก - อายุเก็บเกี่ยว - วัน ความต้านทานโรค โรคนิ่วเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) - โรคไวรัส (TNRV) - โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว - ผลแดง - <i>C. acutatum</i> ผลเขียว - ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด - ลักษณะเด่น : -


สกว 219 CA945 พริกชี้หนู			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> น้ำหนักผล 1.3 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 5.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.54 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 143 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 143 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 148 วัน		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 93 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 138 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.0 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 3.9 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.71 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง - <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด - ลักษณะเด่น : -
		 	


สกว 220 CA976 พริกขี้หนู			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา :บ.เก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> น้ำหนักผล 14.4 กรัม ความกว้างผล 1.7 เซนติเมตร ความยาวผล 12.7 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.99 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 155 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 103 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 145 วัน		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก intermediate, erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 91 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 129 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.5 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 5.5 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.82 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียวเข้ม ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค โรคนิ่วเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) ปริมาณความเผ็ด 32,340 (± 433) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -
		 	


สกว 221 CA984 พริกชี้หนู			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.เมือง จ.ระยอง ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> น้ำหนักผล 1.5 กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 3.9 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.21 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เหลือง ผลสุก แดง ความสูงต้น 168 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 95 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 158 วัน		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเหลืองเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน - ผลสุก - อายุเก็บเกี่ยว - วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) - โรคไวรัส (TNRV) - โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว - ผลแดง - <i>C. acutatum</i> ผลเขียว - ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด - ลักษณะเด่น : -
		 เกิดการระบาดของเพลี้ยไฟทำให้ดอกหลุดร่วงและพริกไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม	

สกว 222 CA985 พริกชี้หนู			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศุภย์พิชต์ แหล่งที่มา : อ.เมือง จ.ระยอง ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เหลือง ผลสุก แดง ความสูงต้น 130 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 90 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 166 วัน	เมลิคไม่งอก	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - สีดอก - ตำแหน่งดอก - การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม - ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน - ผลสุก - อายุเก็บเกี่ยว - วัน ความต้านทานโรค โรคนอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) - โรคไวรัส (TNRV) - โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว - ผลแดง - <i>C. acutatum</i> ผลเขียว - ผลแดง - ปริมาณความเค็ม - ลักษณะเด่น : -


สกว 223 CA986 พริกชี้หนู			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> น้ำหนักผล 2.5 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 7.7 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.83 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 168 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 80 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 148 วัน		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 80 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 124 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.9 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 4.1 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.75 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนใบ (C. cucurbitarum) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอ (S) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว ต้านทาน (R) ผลแดง - <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอ (S) ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด 35,482 (± 568) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -
		 	


สกว 224 CA987 พริกชี้หนู			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.เมือง จ.สระแก้ว ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> น้ำหนักผล 1.7 กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 4.7 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.75 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน ผลสุก ความสูงต้น 90 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 100 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 145 วัน		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 90 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 76 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.0 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 2.8 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.66 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว
		 	ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) ต้านทานปานกลาง (MR) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว - ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว - ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) ปริมาณความเผ็ด 47,186 (± 472) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -

สกว 225 CA988 พริกชี้หูสวน			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : ต.วังดั่ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> น้ำหนักผล 1.0 กรัม ความกว้างผล 1.0 เซนติเมตร ความยาวผล 3.1 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.89 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 143 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 95 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 148 วัน		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเหลืองเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 89 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 113 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.5 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 2.7 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.73 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง - <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด 69,567 ($\pm 2,457$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -
		 	

สกว 226 CA1017 พริกห้วยสีทัน MG-21			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : จ.นครพนม ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> น้ำหนักผล 1.1 กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 3.1 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.75 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 123 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 55 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 133 วัน		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 98 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 97 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.5 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 2.3 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.53 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอ (S) ผลแดง อ่อนแอ (S) ปริมาณความเผ็ด 87,379 ($\pm 3,848$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -
		 	

สกว 227 CA1018 พริกห้วยสีทน MG-22			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : จ.นครพนม ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> น้ำหนักผล 0.9 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 3.1 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.72 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 133 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 55 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 138 วัน		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 66 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 94 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.7 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 1.7 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.53 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) ต้านทานปานกลาง (MR) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอ (S) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) ปริมาณความเผ็ด 94,901 ($\pm 4,582$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -
			


สกว 228 CA1143 พริกขี้			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
ไม่มีรูป	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> น้ำหนักผล 4.0 กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 10.8 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.50 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 133 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 85 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 132 วัน	  	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก intermediate การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 70 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 80 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.4 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 5.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.68 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) ต้านทานปานกลาง (MR) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง อ่อนแอ (S) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทาน (R) ผลแดง ต้านทาน (R) ปริมาณความเผ็ด 37,319 (± 308) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -


สกว 229 CA1161 พริกขึ้นก			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
ไม่มีรูป	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> น้ำหนักผล 3.5 กรัม ความกว้างผล 1.2 เซนติเมตร ความยาวผล 7.4 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.18 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 145 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 86 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 130 วัน	  	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 107 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 142 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.0 กรัม ความกว้างผล 1.2 เซนติเมตร ความยาวผล 7.4 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.18 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง - <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด 35,190 ($\pm 1,619$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -


สกว 230 CA1175 พริกป่า			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
ไม่มีรูป	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.บ้านนั้งस्ता จ.ยะลา ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 96 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 87 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 123 วัน	เมล็ดไม่งอก	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - สีดอก - ตำแหน่งดอก - การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม - ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน - ผลสุก - อายุเก็บเกี่ยว - วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) - โรคไวรัส (TNRV) - โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว - ผลแดง - <i>C. acutatum</i> ผลเขียว - ผลแดง - ปริมาณความเค็ม - ลักษณะเด่น : -


สกว 231 CA1176 พริกชี้หู			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
ไม่มีรูป	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.แกลง จ.จันทบุรี ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 103 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 79 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว - วัน	  	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 88 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 124 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.5 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 4.2 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.70 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 144 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) - โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด 44,132 ($\pm 1,509$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -




สกว 232 CA1259 พริกชี้หนูเม็ดใหญ่			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
ไม่มีรูป	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> น้ำหนักผล 2.7 กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 6.6 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.90 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 139 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 87 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 144 วัน		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 99 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 133 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.7 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 4.2 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.67 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) ต้านทานปานกลาง (MR) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอ (S) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง - <i>C. acutatum</i> ผลเขียว - ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด 50,491 ($\pm 2,324$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -
			
			


สกว 233 CA1260 พริกกะเหรียง			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
ไม่มีรูป	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 126 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 53 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 147 วัน	  	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 86 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 128 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.1 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 2.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.59 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียวขาว ผลสุก สีแดงส้ม อายุเก็บเกี่ยว 167 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) - โรคไวรัส (TNRV) - โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว - ผลแดง - <i>C. acutatum</i> ผลเขียว - ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด - ลักษณะเด่น : -


สกว 234 CA1261 พริกชี้หนู		
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย
ไม่มีรูป	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> น้ำหนักผล 0.3 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 2.1 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.36 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 117 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 51 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 144 วัน	   ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเหลืองเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 84 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 90 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.3 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 3.1 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.63 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 144 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) - โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง อ่อนแอ (S) ปริมาณความเผ็ด 154,145 (± 976) SHU เผ็ดสูงมาก ลักษณะเด่น : -


สกว 235 CA1263 พริกชี้หนู			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
ไม่มีรูป	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - น้ำหนักผล 0.5 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 3.1 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.59 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน ผลสุก ความสูงต้น 94 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 85 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว วัน		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 96 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 127 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.3 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 2.6 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.48 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) - โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) ปริมาณความเผ็ด 79,667 ($\pm 3,630$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -
	 		

สกว 236 CA1271 พริกชี้หนูเม็ดใหญ่			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
ไม่มีรูป	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> น้ำหนักผล 2.6 กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 7.4 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.10 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 102 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 74 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว วัน	  	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 91 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 133 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.7 กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 7.2 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.96 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียวเข้ม ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 144 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง - <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด 15,282 (± 433) SHU เผ็ดปานกลาง ลักษณะเด่น : -


สกว 237 CA1280 พริกชี้หนู			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.เมือง จ.พิจิตร ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> น้ำหนักผล 1.5 กรัม ความกว้างผล 0.9 เซนติเมตร ความยาวผล 6.8 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.56 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 143 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 86 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 144 วัน		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 92 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 100 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.9 กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 4.3 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.72 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) ต้านทานปานกลาง (MR) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) ปริมาณความเผ็ด 44,654 (± 751) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -
		 	


สกว 238 CA1282 พริกชี้หนู			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> น้ำหนักผล 5.6 กรัม ความกว้างผล 1.5 เซนติเมตร ความยาวผล 9.1 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.26 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 97 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 65 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 130 วัน		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก pendant การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 84 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 79 เซนติเมตร น้ำหนักผล 2.0 กรัม ความกว้างผล 1.1 เซนติเมตร ความยาวผล 5.4 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.71 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) - โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง - <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทานมาก (HR) ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด 26,747 (± 514) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -
		 	

สกว 239 CA1288 พริกชี้หนูเม็ดขาว		
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย
ไม่มีรูป	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : - ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 133 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 39 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 151 วัน	   ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเหลืองเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 83 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 107 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.0 กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 3.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.86 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 144 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง - <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด 214,678 ($\pm 5,706$) SHU เผ็ดสูงมาก ลักษณะเด่น : -

สกว 240 CA1290 พริกชี้หู			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.เมือง จ.น่าน ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> น้ำหนักผล 4.0 กรัม ความกว้างผล 1.2 เซนติเมตร ความยาวผล 7.4 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.22 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 86 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 76 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 130 วัน		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 99 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 103 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.2 กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 4.8 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.77 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) ต้านทานปานกลาง (MR) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอมาก (HS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอ (S) ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด 45,492 ($\pm 1,121$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -
		 	

สกว 241 CA1329 พริกขี้หนู			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : จ.ขอนแก่น ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - น้ำหนักผล 2.8 กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 5.5 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.30 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 102 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 59 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว วัน		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 57 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 87 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.0 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 3.4 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.72 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค
		 	โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอ (S) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) ปริมาณความเผ็ด 80,469 ($\pm 2,813$) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -

สกว 242 CA1338 พริกชี้หนู P#348			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : กรุงเทพมหานคร ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - น้ำหนักผล 2.5 กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 6.3 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.61 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 130 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 118 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว วัน		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 100 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 111 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.7 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 2.4 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.77 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค
		 	โรคนยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอ (S) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) ปริมาณความเผ็ด 33,869 (± 689) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -


สกว 243 CA1366 พริกหอม			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - น้ำหนักผล 1.6 กรัม ความกว้างผล 1.0 เซนติเมตร ความยาวผล 4.2 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.01 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 136 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 77 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว วัน		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเหลืองเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 103 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 120 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.5 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 2.6 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.65 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 144 วัน ความต้านทานโรค
		 	โรคนยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง - <i>C. acutatum</i> ผลเขียว ต้านทานปานกลาง (MR) ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด 152,841 ($\pm 3,732$) SHU เผ็ดสูงมาก ลักษณะเด่น : -


สกว 244 CA1372 พริกขึ้นก			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : จ.สระแก้ว ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - น้ำหนักผล 0.4 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 2.9 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.59 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 153 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 90 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว วัน	เมล็ดไม่ออก	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - สีดอก - ตำแหน่งดอก - การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม - ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน - ผลสุก - อายุเก็บเกี่ยว - วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) - โรคไวรัส (TNRV) - โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว - ผลแดง - <i>C. acutatum</i> ผลเขียว - ผลแดง - ปริมาณความเค็ม - ลักษณะเด่น : -


สกว 245 CA1381 พริกกะเหรียง			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี		ลักษณะทางพืชสวน
	ลักษณะทางพืชสวน		ชนิด <i>frutescens</i>
	ชนิด -		สีดอก สีเหลืองเขียว
น้ำหนักผล 1.7 กรัม	ตำแหน่งดอก erect	การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect	ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร
ความกว้างผล 1.0 เซนติเมตร	ความยาวผล 5.4 เซนติเมตร	ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร	น้ำหนักผล - กรัม
ความหนาเนื้อ 1.03 มิลลิเมตร	สีผล ผลอ่อน เขียว	ความกว้างผล - เซนติเมตร	ความยาวผล - เซนติเมตร
ผลสุก แดง	ความสูงต้น 158 เซนติเมตร	ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร	สีผล ผลอ่อน -
ความกว้างทรงพุ่ม 96 เซนติเมตร	อายุเก็บเกี่ยว วัน	ผลสุก -	อายุเก็บเกี่ยว - วัน
		ความต้านทานโรค	โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) -
			โรคไวรัส (TNRV) -
			โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.)
			<i>C. capsici</i> ผลเขียว -
			ผลแดง -
			<i>C. acutatum</i> ผลเขียว -
			ผลแดง -
			ปริมาณความเผ็ด -
			ลักษณะเด่น : -
		เกิดการระบาดของเพลี้ยไฟทำให้ดอกหลุดร่วงและพริกไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม	

สกว 246 CA1399 พริกชี้หู			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - น้ำหนักผล 1.6 กรัม ความกว้างผล 1.0 เซนติเมตร ความยาวผล 3.5 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.30 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 180 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 59 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว วัน	เมล็ดไม่ออก	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - สีดอก - ตำแหน่งดอก - การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม - ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน - ผลสุก - อายุเก็บเกี่ยว - วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) - โรคไวรัส (TNRV) - โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว - ผลแดง - <i>C. acutatum</i> ผลเขียว - ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด - ลักษณะเด่น : -

สกว 247 CA1412 พริกยอดสน			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : จ.นครราชสีมา ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> น้ำหนักผล 1.0 กรัม ความกว้างผล 4.3 เซนติเมตร ความยาวผล 5.8 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.62 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 130 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 74 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว วัน	เมล็ดไม่งอก	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - สีดอก - ตำแหน่งดอก - การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม - ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน - ผลสุก - อายุเก็บเกี่ยว - วัน ความต้านทานโรค โรคน้ำเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) - โรคไวรัส (TNRV) - โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว - ผลแดง - <i>C. acutatum</i> ผลเขียว - ผลแดง - ปริมาณความเค็ม - ลักษณะเด่น : -


สกว 248 CA1413 พริกอีสาน			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : จ.ศรีสะเกษ ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> น้ำหนักผล 2.1 กรัม ความกว้างผล 0.8 เซนติเมตร ความยาวผล 6.2 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.56 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 107 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 93 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 139 วัน		ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 82 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 94 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.9 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 4.3 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.73 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีขาว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค
		 	โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอ (S) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอ (S) ผลแดง อ่อนแอ (S) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) ปริมาณความเผ็ด 57,730 (± 685) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -

สกว 249 CA1435 พริกชี้หนูหอม		
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย
ไม่มีรูป	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.เมือง จ.ขอนแก่น ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> น้ำหนักผล 0.5 กรัม ความกว้างผล 0.5 เซนติเมตร ความยาวผล 2.9 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.86 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียว ผลสุก แดง ความสูงต้น 103 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 69 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว วัน	   ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 83 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 137 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.5 กรัม ความกว้างผล 0.6 เซนติเมตร ความยาวผล 2.6 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.66 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 144 วัน ความต้านทานโรค โรคยอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง - <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอ (S) ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด 96,501 (± 0) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -

สกว 250 CA1453 พริกสามเดือน			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
ไม่มีรูป	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - น้ำหนักผล 1.7 กรัม ความกว้างผล 6.0 เซนติเมตร ความยาวผล 6.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.56 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน เขียวเหลือง ผลสุก แดง ความสูงต้น 107 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 93 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 139 วัน	  	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม intermediate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 94 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 117 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.8 กรัม ความกว้างผล 0.7 เซนติเมตร ความยาวผล 4.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.76 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียวอ่อน ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค โรคนิ่วเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอ (S) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอปานกลาง (MS) ปริมาณความเผ็ด 35,967 (± 250) SHU เผ็ดมาก ลักษณะเด่น : -

สกว 251 CA1884 พริกยูยี		
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย
ไม่มีรูป	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : - ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน - ผลสุก - ความสูงต้น - เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม - เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว - วัน	   ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>annuum</i> สีดอก สีขาว ตำแหน่งดอก intermediate การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม prostrate ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 89 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก 90 เซนติเมตร น้ำหนักผล 4.8 กรัม ความกว้างผล 2.5 เซนติเมตร ความยาวผล 3.1 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.16 มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน สีเขียว ผลสุก สีแดง อายุเก็บเกี่ยว 134 วัน ความต้านทานโรค โรคนูนเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) อ่อนแอ (S) โรคไวรัส (TNRV) อ่อนแอมาก (HS) โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว อ่อนแอมาก (HS) ผลแดง อ่อนแอ (S) <i>C. acutatum</i> ผลเขียว อ่อนแอปานกลาง (MS) ผลแดง ต้านทานปานกลาง (MR) ปริมาณความเผ็ด 19,083 (± 573) SHU เผ็ดปานกลาง ลักษณะเด่น : -

สกว 252 CA1888 พริกชี้หูสวนกะเหรี่ยง			
เชื้อพันธุ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
ไม่มีรูป	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : - ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน - ผลสุก - ความสูงต้น - เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม - เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว - วัน	เมล็ดไม่งอก	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - สีดอก - ตำแหน่งดอก - การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม - ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน - ผลสุก - อายุเก็บเกี่ยว - วัน ความต้านทานโรค โรคนูน (C. cucurbitarum) - โรคไวรัส (TNRV) - โรคแอนแทรคโนส (Colletotrichum spp.) C. capsici ผลเขียว - ผลแดง - C. acutatum ผลเขียว - ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด - ลักษณะเด่น : -

สกว 253 CA1891 พริกเผ็ยง			
เชือพ่นฐ์พริกเก็บรวบรวม		งานวิจัย	
ไม่มีรูป	ผู้เก็บรวบรวม : ศูนย์พืชผักฯ แหล่งที่มา : - ลักษณะทางพืชสวน ชนิด - น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน - ผลสุก - ความสูงต้น - เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม - เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว - วัน	 	ลักษณะทางพืชสวน ชนิด <i>frutescens</i> สีดอก สีเหลืองเขียว ตำแหน่งดอก erect การเจริญเติบโตของทรงพุ่ม erect ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรก - เซนติเมตร น้ำหนักผล - กรัม ความกว้างผล - เซนติเมตร ความยาวผล - เซนติเมตร ความหนาเนื้อ - มิลลิเมตร สีผล ผลอ่อน - ผลสุก - อายุเก็บเกี่ยว - วัน ความต้านทานโรค โรคนอดเน่า (<i>C. cucurbitarum</i>) - โรคไวรัส (TNRV) - โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.) <i>C. capsici</i> ผลเขียว - ผลแดง - <i>C. acutatum</i> ผลเขียว - ผลแดง - ปริมาณความเผ็ด - ลักษณะเด่น : -
	เกิดการระบาดของเพลี้ยไฟทำให้ดอกหลุดร่วงและพริกไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม		

เอกสารอ้างอิง

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2547. มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ : พริก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 7 หน้า.

Bosland, P.W. and E.J. Votava. 2000. Peppers : Vegetable and Specie Capsicums. Biddles Ltd.,
Guilford and King's Lynn. UK. 204 pp.

Codex. 2011. Codex Standard for Chilli Peppers (Codex Stan 307-2011) 5 pp.

Scoville, W.L. 1912. Note on Capsicum. Journal of the American Pharmaceutical Association
1, 453

Weiss E.A., 2002. Specie Crops. CABI Publishing, New York. 411pp.